

SEMI

Oral Suspension (Drops) - Chewable Tablets



Composition:

Oral Suspension (Drops): Each 1 ml SEMI Oral Drops contains: Simethicone 40 mg.

Chewable Tablets: Each SEMI Chewable Tablet contains Simethicone 40 mg.

Mechanism of Action:

Simethicone is an anti-flatulence drug. It works by changing the elasticity of the surface of mucous bubbles in the digestive tract, which helps break up or collect gas bubbles, so that gas is more easily eliminated through belching or passing flatus.

Pharmacokinetics:

Simethicone is not absorbed from the gastrointestinal tract and does not interfere with stomach secretions or the absorption of nutrients. After oral administration, it is excreted unchanged in the feces.

Indications:

SEMI is used to relieve pain and discomfort caused by excess gases in the digestive tract in cases of flatulence and gas retention after surgery. It is also used to remove gases, air and foam from the digestive tract before endoscopic examination and before radiographic examination. It is also used in infants to relieve pains resulting from the formation of gases in the event of colic, by swallowing air.

Contraindications:

Hypersensitivity to the active ingredient or any of the components of the product.

Warnings & Precautions:

If symptoms worsen, consult a doctor.

Pregnancy & Lactation:

As Simethicone is not absorbed, SEMI is not expected to have any harmful effects on pregnant or breastfeeding. However, as with all medicines, caution should be exercised when using it during pregnancy or lactation.

Drug Interactions:

Levothyroxine may bind to simethicone, so the absorption of levothyroxine may be affected by the concomitant use in patients with thyroid disorders.

Side Effects:

Minor side effects such as nausea and constipation. In rare cases hypersensitivity reactions such as skin rash and itching, edema of the face and tongue, difficulty breathing have been reported.

Driving & Using Machines:

No effects on driving or using machines have been reported.

Dosage & Administration:

- SEMI is taken after meals and at bedtime.
- Chewable tablet should be chewed thoroughly before swallowing
- Oral drops are more suitable for children. They can be mixed with 30 ml of water, milk or other liquids before administration.

● Adults and children over 12 years old: 1-3 tablets, 4 times a day. So that the maximum daily dose does not exceed 480 mg, unless otherwise specified by the doctor.

● Children 2-12 years: 1 ml of suspension, 4 times a day as needed, not to exceed the maximum daily dose of 480 mg.

● Infants and children under 2 years: 0.5 ml of suspension, 4 times a day as needed, not to exceed the maximum daily dose of 240 mg.

Overdose:

No cases of overdose have been reported. In the event of intentional or accidental overdose, symptoms should be treated as they occur.

Storage:

Keep out of reach of children. Store below 25 °C.

Packaging:

Oral Suspension (Drops): Each SEMI carton box contains amber glass bottle of 30 ml.

Chewable Tablets: Each SEMI carton box contains 20 Chewable Tablets in two blister strips.

*A medication is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.
* Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.
*The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.
*Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICATIONS OUT OF REACH OF CHILDREN
Council of Arab Health Ministers, Union of Arab Pharmacists

Revapharmaceutical Industry - Syria



اسلامی

معلق فموي (نقط) - مضغوظات معدة للمضغ

التأثيرات الجانبية:

تأثيرات جانبية طفيفة مثل الغثيان والإمساك. في حالات نادرة تم الإبلاغ عن تفاعلات فرط الحساسية مثل الطفح الجلدي والحكة، وذمة في الوجه واللسان، صعوبة في التنفس.

القيادة واستخدام الآلات:

لم يتم الإبلاغ عن أية تأثيرات على القيادة أو استخدام الآلات.

الجرعة والاستعمال:

- يتم تناول سيمي بعد وجبات الطعام وعند النوم.
- يجب مضغ الأفراس القابلة للمضغ جيدا قبل البلع.
- النقط الفعوية مناسبة أكثر للأطفال، يمكن مزجها مع ٣٠ مل من الماء أو الحليب أو سوائل أخرى قبل الإعطاء.

- **البالغون والأطفال بعمر فوق ١٢ سنة:** ٢-١ مضغوطات، أربع مرات في اليوم. بحيث لا تتجاوز الجرعة اليومية القصوى ٤٨٠ ملغ، ما لم يحدد الطبيب غير ذلك.

- **الأطفال بعمر ٢-١٢ سنة:** ١ مل من المعلق، ٤ مرات في اليوم حسب الحاجة، بحيث لا تتجاوز الجرعة اليومية القصوى ٤٨٠ ملغ.

- الرضع والأطفال بعمر أقل من سنين: ٠,٥ مل
من المعلق، ٤ مرات في اليوم حسب الحاجة، بحيث
لا تتجاوز الجرعة اليومية القصوى ٢٤٠ ملغ.

فرط الجرعة:

لم يتم الإبلاغ عن أي حالات جرعة زائدة. في حالة تناول جرعة زائدة بشكل متعمد أو عرضي، يجب معالجة الأعراض عند ظهورها.

الحفظ:

يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. يُحفظ بدرجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية.

التَّعَبُّة:

معلق قموي (نقط): كل عبوة كرتونية سيمي تحتوي على عبوة زجاجية عاتمة سعة ٣٠ مل.

مضغوطات معدة للمضغ: كل عبوة كرتونية سيمي تحتوي على ٢٠ مضغطة معدة للمضغ ضمن شريطي بليستر.

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستعماله خلافاً لتعليمات يمرضك للخطر
اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلي
الذي صرفها لك ، فالطبيب والصيدلي هما اللذان يقرران في الدواء وينبغيه وحذروا
لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
لا تترك الأدوية بمقتضى أيدي الأطفال
محظون ورزاة الصحة العرب والحدح الصيدلانية العرب.

معلق فموي (نقط): كل ١ مل سيمي نقط فموية
تحتوي على سيمي تيكون ٤٠ ملغ.

مضغوطات معدة للمضغ: كل مضغوة سيمي معدة للمضغ تحتوي على سيمييتيكون ٤٠ ملغ.

آيَةُ التَّائِبِ:

السيمينتيكون هو دواء مضاد للنفخة. يعمل عن طريق تغيير مرونة سطح الفقاعات المخاطية في الجهاز الهضمي، مما يساعد في تكسير فقاعات الغاز أو تجميعها، وبهذا الشكل يتم التخلص من الغازات بسهولة أكبر من خلال التجشؤ أو تمرير غازات البطن.

الحرائك الدوائية:

لا يتم امتصاص السيميتيكون من الجهاز الهضمي ولا يتداخل مع إفرازات المعدة أو امتصاص العناصر الغذائية. بعد تناوله عن طريق الفم، يُطرح في البراز دون تغيير.

الاستطابات:

يستخدم سيمي للتخفيف من الألم والإنزعاج الناجم عن الغازات الزائدة في الجهاز الهضمي في حالات انتفاخ البطن واحتباس الغازات ما بعد العمل الجراحي. كما يستعمل للتخلص من الغازات والهواء والرغوة من الجهاز الهضمي قبل الفحص بالمنظار وقبل الفحص بالأشعة. كما يستخدم لدى الأطفال الرضع لتخفيف الآلام الناتجة عن تشكل الغازات في حال المغص، ابتلاع الهواء.

مضادات الاستطباب:

فرط الحساسية تجاه المادة الفعالة أو لأي من مكونات المستحضر.

التحذيرات والاحتياطات:

في حال ساءت الأعراض، يجب استشارة الطبيب.

الحمل والإرضاع:

نظراً لعدم امتصاص السميثيكون، فليس من المتوقع أن يكون لسيمي أية آثار ضارة على الحامل أو المرضع. ومع ذلك، كما هو الحال مع جميع الأدوية، يجب توخي الحذر عند استعماله خلال فترة الحمل أو الإرضاع.

التداخلات الدوائية:

قد يرتبط ليفوثيروكسين بالسيمييتيكون، لهذا قد يتأثر امتصاص الليفوثيروكسين عند الاستخدام المتزامن لدى مرضى اضطرابات الغدة الدرقية.