

VOMIDAL

Film Coated Tablets & Syrup



Composition:

Tablets: Each **VOMIDAL** Film Coated Tablet contains Ondansetron (as Hydrochloride Dihydrate) 8 mg.

Syrup: Each **VOMIDAL** 5ml of Syrup contains Ondansetron (as Hydrochloride Dihydrate) 4 mg.

Mechanism of Action:

VOMIDAL is a potent selective 5-HT₃ receptor antagonist. The effect of ondansetron in the treatment of nausea and vomiting caused by chemotherapy and radiotherapy cytotoxics results from its inhibition of 5-HT₃ receptors on neurons in both the peripheral and central nervous system.

Pharmacokinetic:

Following oral administration, Ondansetron is completely absorbed from the gastrointestinal tract and undergoes first pass metabolism (bioavailability is about 60%). Peak plasma concentrations are attained approximately 1.5 hours after an 8 mg dose. The protein binding of Ondansetron is 70-76%. Ondansetron is eliminated from the circulatory system predominantly by hepatic metabolism through multiple enzymatic pathways. Less than 5% of the absorbed dose is excreted in the urine unchanged.

Indications:

VOMIDAL is indicated for the management of:

- Cases of nausea and vomiting resulting from chemotherapy for cancer patients and radiotherapy.
- Post-Operative Nausea and Vomiting (PONV).

Contraindications:

- Hypersensitivity to the Ondansetron, to other selective 5-HT₃ receptor antagonists.
- Concomitant use with Apomorphine.

Warnings & Precautions:

- Hypersensitivity Reactions: Hypersensitivity reactions, including bronchospasm, have been reported in patients with hypersensitivity to other selective 5-HT₃ receptor antagonists.
- **VOMIDAL** should be used with caution in patients who may develop prolongation of QT.
- Hypokalemia and hypomagnesemia should be corrected prior to ondansetron administration.
- Pediatric patients receiving ondansetron with hepatotoxic chemotherapeutic agents should be monitored closely for impaired hepatic function.
- Patients who show signs of subacute intestinal obstruction should be monitored after administration of **VOMIDAL**.

Pregnancy & Lactation:

Pregnancy: Pregnancy Category B, special care should be taken during the first trimester of pregnancy.

Lactation: It is recommended that the mother does not breast-feed her baby while she is using ondansetron treatment.

Drug Interactions:

- Drugs that affect cytochrome P-450 enzymes: Ondansetron is metabolized by hepatic cytochrome P-450 enzymes, specific to drug metabolism.
- Inhibitors of these enzymes may affect the secretion of ondansetron, thereby altering the half-life of the drug. Based on the available data, it is not recommended to adjust the dose of ondansetron for patients taking these medicines.
- Caution should be exercised when ondansetron is co-administered with drugs that prolong the QT interval and/or cause electrolyte abnormalities.
- Serotonergic Drugs (e.g., SSRIs and SNRIs): Serotonin syndrome following the concomitant use of ondansetron and other serotonergic drugs have been reported.

- **Apomorphine:** Concomitant use with apomorphine is contraindicated.
- **Phenytoin, Carbamazepine and Rifampicin:** In patients treated with potent inducers of CYP3A4 (i.e. phenytoin), the oral clearance of ondansetron was increased and ondansetron blood concentrations were decreased.

- **Tramadol:** Ondansetron may reduce the analgesic effect of tramadol.

Side Effects:

Common: Headache, sensation of warmth or flushing, constipation.

Uncommon and Rare: Hypersensitivity reactions, Seizures, movement disorders, QT prolongation, hypotension, hiccups, asymptomatic increases in liver function tests.

Dosage & Administration:

Adults: 8mg taken 1 to 2 hours before chemotherapy or radiation treatment, followed by 8 mg every 12 hours for a maximum of 5 days to protect against delayed or prolonged emesis.

The recommended dose for oral administration is 8 mg twice daily.

Paediatric Population: Ondansetron Hydrochloride should be administered immediately before chemotherapy as a single intravenous dose of 0.15 mg/kg. The single intravenous dose must not exceed 8 mg. Two further intravenous doses may be given in 4-hourly intervals. Oral dosing can commence twelve hours later and may be continued for up to 5 days. The total dose over 24 hours (given as divided doses) must not exceed adult dose of 32 mg.

Weight-based dosing for Chemotherapy - Children aged >6 months and adolescents:

Weight	Day 1 (a,b)	Days 2-6 (b)
≤ 10 Kg	Up to 3 doses of 0.15mg/kg i.v every 4 hrs	2 mg syrup every 12 hrs
>10 Kg	Up to 3 doses of 0.15mg/kg i.v every 4 hrs	4 mg syrup or tablet every 12 hrs

a- The intravenous dose must not exceed 8mg.

b- The total dose over 24 hours (given as divided doses) must not exceed adult dose of 32 mg.

Post-operative nausea and vomiting (PONV) in adults: For oral administration: 16 mg one hour prior to anesthesia.

Patients with hepatic Impairment: Clearance of ondansetron hydrochloride is significantly reduced and serum half-life significantly prolonged. In such patients a total daily dose of 8mg should not be exceeded.

Overdose:

Symptoms: There is limited experience of ondansetron overdose. In the majority of cases, symptoms were similar to those already reported in patients receiving recommended doses. ECG monitoring is recommended in cases of overdose.

Treatment: There is no specific antidote for ondansetron, therefore symptomatic and supportive therapy should be given as appropriate.

Storage:

Store in a dry place at a temperature below 25°C and protect from light.

Packaging:

Tablets: Each **VOMIDAL** Carton Box contains 10 Film Coated Tablets in a blister strip.

Syrup: Each **VOMIDAL** Syrup Carton Box contains an Amber Glass Bottle of 100 ml.

- A medication is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.
- The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- KEEP THE MEDICATIONS OUT OF REACH OF CHILDREN
- Council of Arab Health Ministers, Union of Arab Pharmacies

Reva Pharmaceutical Industry - Syria

مضغوطات ملبسة بالفيلم - شراب

المضغوطات: كل مضغوظة فوميديال مليسة بالفيلم تحوي على أوندانسيترون (على شكل هيدرات) دي ٨ ملغ.

الشرايب: كل ٥ مل شراب فوميديال تحوي على أوندانسيترون (على شكل هيدروكلوريد دي هيدرات) ٤ ملغ.

أية التاثير :

فوميدال هو مضاد انتقائي قوي لمستقبلات HT-3.5. ينتج تأثير الأوندانسترون في معالجة الغثيان والقيء الناجم عن العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي السام للخلايا من خلال تثبيطه لمستقبلات HT-3.5 على الخلايا العصبية الموجودة في كل من الجهاز العصبي المحيطي والمركزي.

بعد تناوله عن طريق الفم، يتم امتصاص أوندانسيرون بشكل كامل من القناة الهضمية، ويخضع للإستقلاب بالمعروف الكبدى (١٥) (والتوافر الجوى هوالى ٦٠٪). يصل إلى تركيز الذروة البلاسمى بعد ١ ساعة تقريباً من تناول الجرعة مالمع. نسبة ارتباط أوندانسيرون بالبروتين هي ٩٠٪.٦٠٠ من التخصص للأوندانسيرون من الجهاز الدورانى فى الغالب عن طريق الإستقلاب الكبدى من خلال مسارات إنزيمية متعددة. أقل من ٥٪ من الجرعة المتصصة تظهر فى البول دون تغيير.

يستخدم فوميدال لتدبير:

- حالات الغثيان والقيء الناتجة عن المعالجة الكيميائية لمرضى السرطان، والمعالجة الإشعاعية.

- فرط الحساسية للأوندانسيرون أو لمناهضات مستقبلات 5-HT₃ الإنتقائية الأخرى.
- الاستخدام المتزامن مع الأبوبورفين.

التحذيرات والاحتياطات:

- تفاعلات فرط الحساسية: تم الإبلاغ عن تفاعلات فرط الحساسية ومنها التشنج القلبي في المرضى الذين أظهروا فرط الحساسية لمضادات مستقبلات 5-HT₂-
الانتقائية الأخرى.

يجب استخدام **فوميديال** بحذر عند المرضى الذين قد يصابون بإطالة QT.
يجب تصحيح نقص بوتاسيوم الدم ونقص مغنيزيوم الدم قبل إعطاء أوندانسيترون.
يجب مراقبة الأطفال الذين يتلقون أوندانسيترون مع عوامل العلاج الكيميائي
السامة للكبد عن كثب لضعف وظائف الكبد.

- يجب مراقبة المرضى الذين تظهر عليهم علامات إنسداد معوي تحت الحاد بعد إعطاء الفوميدال.

الحمل والإرضاع:

الحمل: التصنيف الحمل B، يجب توخي الحذر خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

الإرضاع: من المستحسن عدم إرضاع الأم لطفلها خلال المعالجة بالأوندانميترون.

الأدوية التي تؤثر على

يستقلب عبر إنزيمات الميتوكروم الكبدية الخاصة باستقلاب الأدوية، فإن مثبطات هذه الأنزيمات قد تؤثر على إخراج الأونداناسترون وبالتالي تغيير العمر النصفى للدواء، وبالإعتماد على البيانات المتوافرة لا يُستحسن تعديل جرعة الأونداناسترون للمرضى الذين يتناولون هذه الأدوية.

يجب توخي الحذر عند تناول الأوندانسيرون مع الأدوية التي تطيل فترة QT و/أو تسبب شذوذاً بكمياً بالقلب

عن مثلاًزمة السيروتونين بعد الإستخدام المزامن للأوندانسيرون مع الأدوية الأخرى، التي تزيد مستويات السيروتونين (مثل SSRIs و SNRIs): تم الإبلاغ

الأيوبروفين: يُعد الاستخدام المتزامن مع الونداناسيترون مضاداً للإستطباب. **فينيتونين**، كل بامازين، ريفاميسين: في المرضى الذين عولجوا بمحفّات قوية CYP3A4 (مثل الفينيتونين)، تمت زيادة التصفية القوية للونداناسيترون وانخفضت تركيزات الونداناسيترون في الدم.

الشائعة: الصداع، الإحساس بالحرارة أو الإحمرار، الإمساك.
الأقل شيوعاً والنادرة: تفاعلات فرط الحساسية، النوبات، اضطرابات الحركة،
تضيق QT، انخفاض ضغط الدم، الفواق، الزيادات في اختبارات وظائف الكبد
غير المتوقعة مع الأدوية.

البالغين: ٨ ملغ تؤخذ قبل المعالجة الكيميائية أو الإشعاعية بساعة أو ساعتين، تليها ١٢ ملغ كل ١٢ ساعة لمدة أقصاها ٥ أيام للحماية من النقيض المتأخر أو المطول.
الجرعة الموصى بها للإعطاء عن طريق الفم هي ٨ ملغ مرتين يوميا.
الأطفال:

يجب إعطاء أونانيسيترون هيدروكلوريد مباشرة قبل العلاج الكيميائي كجرعة وريدية واحدة من ١,٥ ملغ / كغ. يجب ألا تتجاوز الجرعة الوريدية الواحدة ٨ مل. يمكن إعطاء جرعتين أخريين في الوريد كل ٤ ساعات. يمكن أن تبدأ الجرعات الفموية بعد اثني عشر ساعة ويمكن أن تستمر لمدة تصل إلى ٥ أيام، ويجب ألا تتجاوز الجرعة الإجمالية خلال ٢٤ ساعة (تغطي كجرعاً مقسمة) جرعة البالغين بمقدار ٢٢ ملغ.

الجرعات المعتمدة

الأيام (٦-٢) b	اليوم الأول a,b	الوزن
٢ ملغ من الشراب كل ١٢ ساعة	حتى ٣ جرعات ٠,١٥ ملغ/كغ وريدي كل ٤ ساعات	أقل أو بوزن ١٠ كغ
٤ ملغ من الشراب أو المضغوطات كل ١٢ ساعة	حتى ٣ جرعات ٠,١٥ ملغ/كغ وريدي كل ٤ ساعات	أكثر من ١٠ كغ

a- يجب ألا تزيد الحدوة في الورد عن ٨ ملغ

b- يجب ألا تتجاوز الجرعة الإجمالية التي تزيد عن ٢٤ ساعة (تعطى كحركات مقسمة) جرعة البالغين ٣٢ ملغ.

علاج الغثاسان والقضاء بعد الجراحة (PONV)

طريق الفد: ١٦ ملغ قبل التخدير بساعة واحدة.

المرضى الذين يعانون من القصور الكلوي، يتخفف

بشكل كبير عند هؤلاء المرضى ويطول العمر النصفى بشكل ملحوظ. في مثل هؤلاء المرضى يجب عدم تجاوز جرعة ٨ مئة اجمالية في ٨ ملغ

فقط الحصة.

الإعراض: هناك معلومات محدودة لجرعة زائدة من الأوندانسيترون. في معظم الحالات، كانت الأعراض مماثلة لتلك التي تم الإبلاغ عنها بالفعل في المرضى الذين يتلقون الجرعات الموصى بها. يوصى بإجراء تخطيط

العلاج: لا يوجد ترياق محدد للأوندانسيترن، لذلك يجب إعطاء العلاج الداعم والمعالجة العرضية حسب الحاجة.

ش و ط الحفظ:

يحفظ في مكان جاف عند درجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية، بعيداً عن الضوء

التَّعْنَةُ.

المضغوطات: كل عبوة كرتونية فوميدال تحتوي على ١٠ مضغوطات ملبسة بالفيلم ضمن شريط بلاستيكي.

الشراب: كل عبوة كرتونية فوميدال شراب تحتوي على عبوة زجاجية عاتمة
سعة ١٠٠ مل.

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستعمله خلافا لتعليمات بعبءك للخطر
التي تنقلها وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي
الذي صرفها لك. فالحظيب والصيدلي هما الخياران في الدواء وينبغيه وضرره.
لا تكثر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
الأمراض الالتهابية تتطلبون أيدي الأطفال.
مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلة العرب.

انتاج شركة ريفيا للصناعات الدوائية - سوريا