

# Zinco Plus Capsules



## Composition:

Each Zinco Plus Capsule contains:

Ascorbic Acid (vitamin C) 400 mg.

Zinc (as sulfate) 50 mg.

## Pharmacological Properties & Mechanism of Action:

- Zinc is an essential element involved in many enzyme processes. Its severe deficiency causes skin lesion, alopecia, diarrhoea, increased susceptibility to infections and failure to thrive in children. Also, some clinical studies have shown that taking zinc supplements increases testosterone levels and sperm count in those patients who are low in zinc levels.

- Ascorbic acid is an important water-soluble vitamin and antioxidant. The human body can't make vitamin C, so a food source is necessary. Vitamin C is necessary for the incorporation of iron into ferritin. Vitamin C increases the phagocytic function of leucocytes; it possesses anti-inflammatory activity and promotes wound healing. Its deficiency can lead to scurvy and impaired collagen formation.

## Pharmacokinetics:

Zinc is poorly absorbed from the gastrointestinal tract. It is widely distributed throughout the body tissues. It is excreted in the faeces with traces appearing in the urine. Ascorbic acid is readily absorbed from the gastrointestinal tract and is widely distributed in the body tissues. Ascorbic acid in excess of the body's needs is rapidly eliminated in the urine and this elimination is usually accompanied by a mild diuresis.

## Indications:

- Treatment of vitamin C and zinc deficiency.
- Assists reduce convalescence and relieve symptoms of the common cold.
- Zinco Plus helps boost the immune system and wound healing.

## Contraindications:

Hypersensitivity to the active substances or to any of the excipients.

## Warnings & Precautions:

- Accumulation of zinc may occur in cases of renal failure.
- Vitamin C may interfere with test kits and meters measuring glucose levels, creatinine, uric acid, resulting in false results.

- Ascorbic acid should be given with caution to patients with kidneys, bladder and gallbladder stones.

## Pregnancy & Lactation:

The safety of Zinco Plus in pregnant and breast-feeding women has not been established. It can be used after consulting a doctor.

Vitamin C and Zinc are secreted into breast milk. This must be taken into consideration if the infant is receiving any other supplements.

## Driving & Using Machines:

Zinco Plus has no significant effects on the ability to drive and use machines.

## Drug Interactions:

### Zinc:

Zinc forms complexes with some antibiotics (such as tetracycline, quinolones, penicillamine) resulting in decreased absorption of both drugs. To reduce this interaction, you should avoid taking these medicines at the same time.

### Ascorbic Acid:

Desferrioxamine: Vitamin C may enhance tissue iron toxicity, especially in the heart, causing cardiac decompensation.

Cyclosporine: Vitamin C may reduce cyclosporine blood levels.

Warfarin: High doses of vitamin C may interfere with the effectiveness of warfarin.

## Side Effects:

Zinco Plus is well tolerated. In some cases, abdominal pain, nausea, vomiting and diarrhea may be observed. In rare cases, an allergic reaction may be observed.

## Dosage & Administration:

Adults and children over 12 years: One capsule daily, preferably taken one hour after meals. Do not exceed the stated dose. The capsule should be swallowed whole with water.

## Overdose:

There is no evidence that Zinco Plus can lead to an overdose when used as recommended.

Clinical signs and symptoms and consequences of overdose are highly diverse, dependent on an individual's susceptibility and surrounding circumstances.

General manifestations of overdose with vitamin C and/or zinc may include increase of gastrointestinal disturbances including diarrhea, nausea, and vomiting.

If such symptoms occur, the drug should be discontinued and a doctor should be consulted.

## Storage:

Keep out of reach of children. Store below 25 °C.

## Packaging:

Each Zinco Plus carton box contains 30 Capsules in three blister strips.

-A medication is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.  
-Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.  
-The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.  
-Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.  
**KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN**  
Council of Arab Health Ministers, Union of Arab Pharmacists

Reva Pharmaceutical Industry - Syria

ليس لـ زنكو بلس أي تأثيرات ملحوظة على القدرة على القيادة واستخدام الآلات.

**التداخلات الدوائية:**

**حمض الأسكوربيك:**  
 ديسفير وكسامين: قد يزيد فيتامين سي من سمية الحديد في الأنسجة، خاصة في القلب، مما يتسبب في عدم المعاوضة القلبية.

الوارفارين: قد تتداخل الجرعات العالية من فيتامين سي مع فعالية الوارفارين.

**الجرعة والاستعمال:**  
 للبالغون والأطفال فوق ١٢ سنة: كبسولة واحدة يومياً،  
 يفضل تناولها بعد الطعام بساعة. لا تتجاوز الجرعة المحددة.  
 يجب تناول الكبسولة كاملة مع الماء.

الأعراض العامة للجرعة الزائدة من فيتامين سي و/ أو الزنك قد تشمل زيادة اضطرابات الجهاز الهضمي بما في ذلك الإسهال، الغثيان والقيء.

في حالة حدوث مثل هذه الأعراض، يجب إيقاف الدواء واستشارة الطبيب.

كل عبوة كرتونية زنكو بلس تحتوي على ٣٠ كبسولة ضمن ثلاث أسطرطة بليستر.



ریفا فارما

كل كبسولة زنكو بلس تحتوي على:

### الخصائص الدوائية وآلية التأثير:

- حمض الأسكوربيك هو فيتامين مهم قابل للذوبان في الماء ومضاد للأكسدة. لا يمكن لجسم الإنسان أن يصنع فيتامين سي، لذا من الضروري وجود مصدر غذائي له. فيتامين

**الحراك الدوائية:**  
يُمتص الزنك بشكل سيئ من القناة الهضمية. ويتوزع بشكل

يُمتص حمض الأسكوربيك بسهولة من القناة الهضمية ويتوزع بشكل كبير في أنسجة الجسم. يتم التخلص من كمية حمض الأسكوربيك الزائدة عن حاجة الجسم بسرعة في البول وعادةً ما يكون هذا الإطراح مصحوباً بإدرار بولي خفيف.

- يساعد في تقليل مدة النقاهة ويخفف من حدة أعراض نزلات البرد.

مضادات الاستطباب:  
فرط الحساسية تجاه المواد الفعالة أو لأي من السواغات.

- قد يتداخل فيتامين سي مع أدوات الاختبار وأجهزة القياس التي تقيس مستويات الجلوكوز، الكرياتينين، حمض البول مما يؤدي إلى نتائج خاطئة.

**الحمل والإرضاع:**  
لم يتم إثبات سلامة زنكو بلس عند النساء الحوامل والمرضعات. يمكن استخدامه بعد استشارة الطبيب.

الدواء مستحضر بوتر على صحتك واستعماله خلافاً للتعليمات يرفعك عن عتبة الخطأ  
ينبغي وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المتخصص عليها وتعليمات الصيدلي  
التي صرفها لك ، فاطيبيب الصيدلي هي الخيارات في الدواء وينبغي وحذروا  
لا تكرر صرف الدواء ونوع وصفة  
لا تكرر الأدوية بمثلها أي الأخطار  
مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلة العرب

**إنتاج شركة ريفال للصناعات الدوائية - سوريا**