علامات تستدعي الفحص













- تنميل في القدمين
- جوع مستمر
- التهابات متكررة

انتبه: النوع الثاني قد لا تظهر له أعراض لسنوات، والفحص الدوري هو طريقك للاكتشاف المبكر.

اعرف أرقامك

مستويات السكر في الدم	طبيعي	ما قبل السكري	سكري
السكر الصائم بعد صيام 8 ساعات	أقل من 100	100 – 125	126 فأكثر
بعد الأكل بساعتين أو اختبار تحمّل الجلوكوز	أقل من 140	140 – 199	200 فأكثر
السكر التراكمي HbA1c متوسط آخر 2–3 أشهر	أقل من 5.7%	5.7 – 6.4%	6.5% فأكثر

ملغ/دل

هدف أغلب مرضى السكري: سكر تراكمي **أقل من 7%**

فحوصاتك الدورية

- **السكر التراكمي** — كل 3–6 أشهر
- **فحص العين** — سنويًا
- **وظائف الكلى** — سنويًا
- **فحص القدمين** — سنويًا وكل زيارة
- **ضغط الدم** — كل زيارة
- **الدهون في الدم** — سنويًا

كيف تقيس بشكل صحيح؟

1. اغسل يديك جيدًا وجففهما
2. إبرة جديدة لكل قياس
3. ضع قطرة الدم على الشريط
4. سجّل القراءة ووقتها

التصرّف الصحيح

عند انخفاض السكر

أقل من 70 ملغ/دل

تعرّق، رعشة، جوع شديد، صداع، ارتباك

قاعدة **15 × 15**: 15 غرامًا من سكر سريع، ثم انتظر 15 دقيقة وأعد القياس.

1. إن كان واعيًا: عصير أو عسل أو أقراص جلوكوز.
2. أعد القياس بعد 15 دقيقة، وكرّر إن بقي منخفضًا.
3. بعد التحسّن: وجبة خفيفة فيها نشويات وبروتين.

عند ارتفاع السكر

عطش شديد، تبول متكرر، جفاف، دوخة

1. قِس السكر في الدم، والكيتونات في البول إن أمكن.
2. اشرب الماء، وتجنّب السكريات والأكل الثقيل.
3. إذا تجاوز **300 ملغ/دل** مع غثيان أو قيء: إلى الطوارئ فورًا.

احمِ قدميك



- افحصهما يوميًا بحثًا عن أي جرح
- جففهما جيدًا بين الأصابع
- لا تمشِ حافيًا، وارتدِ حذاءً مريحًا

إذا فقد الوعي: **لا تعطه شيئًا بالفم** واتصل بالإسعاف **997**