

Report 3:

Report über die Mikrobiomzusammensetzung

SampleID: 1334473503

Sehr geehrter Herr XXX,

im Folgenden möchte ich Ihnen den Ergebnisbericht unserer Untersuchung Ihrer Stuhlprobe bezüglich der Zusammensetzung Ihres intestinalen Mikrobioms vorlegen.

****Patienteninformationen:****

Kategorie	Wert
-----------	------

--	--

Alter	65 Jahre
-------	----------

Geschlecht	männlich
------------	----------

Zusätzliche Information	Diabetes Typ 2
-------------------------	----------------

****Mikrobiomzusammensetzung:****

Phylum	Prozentanteil
--------	---------------

--	--

Bacteroidota	47,32%
--------------	--------

Firmicutes_A	39,81%
--------------	--------

Bakterien	1,95%
-----------	-------

Proteobakterien	3,78%
-----------------	-------

Verrucomicrobiota	2,26%
-------------------	-------

Firmicutes_D	1,25%
--------------	-------

Firmicutes_C	2,04%
Actinobacteriota	0,95%
Desulfobacterota_I	0,22%
Fusobakterien	0,17%
Cyanobakterien	0,25%
Methanobacteriota_A_1229	0,0%
Firmicutes_G	0,0%

Angesichts Ihrer Diagnose eines Diabetes Typ 2 möchten wir Sie darauf hinweisen, dass üblicherweise ein niedriges Vorkommen von *Akkermansia* bei dieser Erkrankung festgestellt wird. In Ihrer Mikrobiomanalyse konnten wir jedoch kein *Akkermansia*-Phylum identifizieren. Zur Korrektur dieses möglichen Missverhältnisses könnte gegebenenfalls eine Therapie mit Medikamenten wie Metformin in Frage kommen, da sie positive Auswirkungen auf das Mikrobiom haben kann. Allerdings können unsere Messmethoden nicht alle Bakterienarten quantitativ bestimmen, sodass wir eine weiterführende Untersuchung durch Spezialisten für Gastroenterologie empfehlen.

Die folgende Abbildung veranschaulicht den Unterschied zwischen Ihrem Mikrobiom und dem eines gesunden Spenders (Donors). Besonders auffallend ist das Fehlen von *Akkermansia*, ein erhöhtes Vorkommen von *Bacteroidota* und ein reduziertes Vorkommen von *Firmicutes_A*. Diese Aspekte verdienen besondere Beachtung und Nachprüfung.

Empfehlungen:

Um potenzielle Defizite in Ihrer Mikrobiombilanz zu behandeln, empfehlen wir zunächst, Ihre Ernährungsgewohnheiten unter Berücksichtigung präbiotischer Lebensmittel zu verbessern. Zeigen sich hierdurch keine vorteilhaften Ergebnisse oder liegen zusätzliche Komplikationen vor, stehen diverse therapeutische Optionen zur Verfügung, u. a. eine

angepasste Antibiotika-Behandlung oder probiotische Ergänzungsmittel. Zudem sind routinemäßige Kontrolluntersuchungen zur Entwicklung Ihres Mikrobioms angeraten.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben weiterzuhelfen und stehen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

[Ihr Name]

Medizinisches Diagnostiklabor

SampleID: 1334473503

