

# Algèbre linéaire

## Chapitre 2 Calcul matriciel


Master IASD

Tarik AMTOUT  
[tarik.amtout@gmail.com](mailto:tarik.amtout@gmail.com)

## 2.1 Addition, multiplication scalaire et multiplication de matrices

- $a_{ij}$ : l'élément de la matrice  $A$  dans la  $i$ -ème ligne et la  $j$ -ième colonne.

Pour une matrice carrée  $n \times n$ , la diagonale principale est:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$


### Définition

Deux matrices sont égales si elles sont de même taille et si leurs éléments correspondants sont égaux.

Ainsi  $A = B$  si  $a_{ij} = b_{ij} \quad \forall i, j$ .

# Addition de Matrices

Ch2\_

3

## Définition

Soient A et B des matrices de même taille.

Leur somme  $A + B$  est la matrice obtenue en additionnant les éléments correspondants de A et B.

La matrice  $A + B$  sera de la même taille que A et B. Si A et B ne sont pas de même taille, on ne peut pas les additionner, et on dit que la somme n'existe pas.

Si  $C = A + B$ , alors  $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad \forall i, j.$

# Exemple 1

Ch2

Soit  $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -6 \\ -3 & 1 & 8 \end{bmatrix}$ , et  $C = \begin{bmatrix} -5 & 4 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$ .

Déterminer  $A + B$  et  $A + C$ , si la somme existe

## Solution

$$\begin{aligned} (1) \quad A + B &= \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 5 & -6 \\ -3 & 1 & 8 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1+2 & 4+5 & 7-6 \\ 0-3 & -2+1 & 3+8 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 9 & 1 \\ -3 & -1 & 11 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

(2) Car  $A$  est une matrice de taille  $2 \times 3$  et  $C$  est une matrice  $2 \times 2$ , alors ne sont pas de même taille,  $A + C$  n'existe pas.

# Multiplication par un scalaire

Ch2\_

5

## Définition

Soit  $A$  une matrice et  $c$  un scalaire. Le multiple scalaire de  $A$  par  $c$ , noté  $cA$ , est la matrice obtenue en multipliant chaque élément de  $A$  par  $c$ . La matrice  $cA$  aura la même taille que  $A$ .

Si  $B = cA$ , alors  $b_{ij} = ca_{ij} \forall i, j$ .

## Exemple 2

$$\text{Let } A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 7 & -3 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$3A = \begin{bmatrix} 3 \times 1 & 3 \times (-2) & 3 \times 4 \\ 3 \times 7 & 3 \times (-3) & 3 \times 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -6 & 12 \\ 21 & -9 & 0 \end{bmatrix}.$$

Remarque que  $A$  et  $3A$  sont tous les deux  $2 \times 3$  matrices.

# Soustraction

Ch2\_

## Définition

Nous définissons maintenant la soustraction de matrices de manière à la rendre compatible avec l'addition, la multiplication scalaire et la négative. Soit  $A - B = A + (-1)B$

### Exemple 3

On suppose  $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & -2 \\ 3 & 6 & -5 \end{bmatrix}$  et  $B = \begin{bmatrix} 2 & 8 & -1 \\ 0 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ .

$$A - B = \begin{bmatrix} 5-2 & 0-8 & -2-(-1) \\ 3-0 & 6-4 & -5-6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -8 & -1 \\ 3 & 2 & -11 \end{bmatrix}.$$

# Multiplication des matrices

Ch2\_7

## Définition

Supposons que le nombre de colonnes d'une matrice A soit le même que le nombre de lignes d'une matrice B. Le produit AB existe alors.

Soit A une matrice  $m \times n$ , B une matrice  $n \times k$ ,

Le produit matriciel  $C=AB$  a pour élément

$$c_{ij} = \begin{bmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{i\underline{n}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{\underline{n}j} \end{bmatrix} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{i\underline{n}}b_{\underline{n}j}$$

C est une matrice  $m \times k$ .

Si le nombre de colonnes de A n'est pas égal au nombre de lignes B, on dit que le produit n'existe pas.

## Exemple 4

Ch2\_8

Let  $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 3 & -2 & 6 \end{bmatrix}$ , and  $C = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 5 \end{bmatrix}$ .

Déterminer  $AB$ ,  $BA$ , and  $AC$ .

**Solution.**

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 3 & -2 & 6 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} [1 \ 3] \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} & [1 \ 3] \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix} & [1 \ 3] \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix} \\ [2 \ 0] \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} & [2 \ 0] \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix} & [2 \ 0] \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (1 \times 5) + (3 \times 3) & (1 \times 0) + (3 \times (-2)) & (1 \times 1) + (3 \times 6) \\ (2 \times 5) + (0 \times 3) & (2 \times 0) + (0 \times (-2)) & (2 \times 1) + (0 \times 6) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 14 & -6 & 19 \\ 10 & 0 & 2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

$BA$  et  $AC$  n'existent pas. **Note.** En général,  $AB \neq BA$ .



## Exemple 5

Ch2\_9

Soit

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 0 \\ -3 & -2 \end{bmatrix} \text{ et } B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}. \text{ Déterminer } AB.$$

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 0 \\ -3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [2 \ 1] \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} & [2 \ 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} \\ [7 \ 0] \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} & [7 \ 0] \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} \\ [-3 \ -2] \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} & [-3 \ -2] \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -2+3 & 0+5 \\ -7+0 & 0+0 \\ 3-6 & 0-10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -7 & 0 \\ -3 & -10 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

## Exemple 6


$$\text{Soit } C = AB, A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \text{ et } B = \begin{bmatrix} -7 & 3 & 2 \\ 5 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ Déterminer } c_{23}.$$

$$c_{23} = [-3 \ 4] \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = (-3 \times 2) + (4 \times 1) = -2$$

# Taille de produits

Ch2\_

Si  $A$  est une matrice de taille  $m \times r$  et  $B$  est une matrice de taille  $r \times n$  alors  $AB$  sera de taille  $m \times n$



## Exemple 7

Si  $A$  est de taille  $5 \times 6$  et  $B$  de taille  $6 \times 7$ .

Donc  $AB$  existe et  $AB$  sera de taille  $5 \times 7$ .

# Matrices particulières

Ch2\_

## Définition

Une matrice nulle est une matrice dans laquelle tous les éléments sont des zéros.

Une matrice diagonale est une matrice carrée dans laquelle tous les éléments qui ne sont pas sur la diagonale principale sont des zéros.

Une matrice identité est une matrice diagonale dans laquelle chaque élément diagonal vaut 1.

$$O_{mn} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

# Théorème

Ch2

Soit une matrice  $A$  de taille  $m \times n$  et  $O_{mn}$  une matrice nulle de taille  $m \times n$ . Soit  $B$  une matrice carrée d'ordre  $n$ .  $O_n$  et  $I_n$  respectivement la matrice nulle et la matrice identité d'ordre  $n$ . Donc

$$A + O_{mn} = O_{mn} + A = A$$

$$BO_n = O_n B = O_n$$

$$BI_n = I_n B = B$$

## Exemple 8

Soit  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 4 & 5 & 8 \end{bmatrix}$  et  $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$ .

$$A + O_{23} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 4 & 5 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 4 & 5 & 8 \end{bmatrix} = A$$

$$BO_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = O_2$$

$$BI_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} = B$$

## 2.2 Propriétés algébriques des opérations matricielles

Ch2\_  
13

### ***Théorème***

Soit  $A$ ,  $B$  et  $C$  des matrices et  $a$ ,  $b$  et  $c$  des scalaires. Supposons que la taille des matrices soit telle que les opérations puissent être effectuées.

### **Propriétés de l'addition matricielle et de la multiplication scalaire**

1.  $A + B = B + A$  *Commutativité de l'addition*
2.  $A + (B + C) = (A + B) + C$  *Associativité de l'addition*
3.  $A + O = O + A = A$  *(Où  $O$  est la matrice nulle)*
4.  $c(A + B) = cA + cB$  *Distributivité de l'addition*
5.  $(a + b)C = aC + bC$  *Distributivité de l'addition*
6.  $(ab)C = a(bC)$

## ***Théorème***

Soit  $A$ ,  $B$  et  $C$  des matrices et  $a$ ,  $b$  et  $c$  des scalaires. Supposons que la taille des matrices soit telle que les opérations puissent être effectuées.

### **Properties of Matrix Multiplication**

1.  $A(BC) = (AB)C$       *Associativité de la multiplication*
2.  $A(B + C) = AB + AC$       *Distributivité de la multiplication*
3.  $(A + B)C = AC + BC$       *Distributivité de la multiplication*
4.  $AI_n = I_n A = A$       (*Où  $I_n$  est la matrice identité*)
5.  $c(AB) = (cA)B = A(cB)$

**Note:**  $AB \neq BA$  in general.      *Non commutative.*

En algèbre, nous savons que les lois suivantes s'appliquent.

- Si  $ab = ac$  et  $a \neq 0$  alors  $b = c$ .
- Si  $pq = 0$  alors  $p = 0$  ou  $q = 0$ .

Cependant, les résultats correspondants ne sont pas vrais pour les matrices.

- $AB = AC$  n'implique pas que  $B = C$ .
- $PQ = O$  n'implique pas que  $P = O$  or  $Q = O$ .

# Puissances de Matrices

Ch2\_

16

## Définition

Si  $A$  est une matrice carrée, alors

$$A^k = \underbrace{AA \cdots A}_{k \text{ fois}}$$

## Théorème

Si  $A$  est une matrice carrée  $n \times n$  et que  $r$  et  $s$  sont des entiers non négatifs, alors

1.  $A^r A^s = A^{r+s}$ .
2.  $(A^r)^s = A^{rs}$ .
3.  $A^0 = I_n$  (par définition)



## Exemple 12

Ch2\_  
17

Si  $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ , alors  $A^4$ .

**Solution**

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^4 = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & -10 \\ -5 & 6 \end{bmatrix}.$$

**Exemple 13** Simplifiez l'expression matricielle suivante.

$$A(A + 2B) + 3B(2A - B) - A^2 + 7B^2 - 5AB$$

**Solution**

$$\begin{aligned} & A(A + 2B) + 3B(2A - B) - A^2 + 7B^2 - 5AB \\ &= A^2 + 2AB + 6BA - 3B^2 - A^2 + 7B^2 - 5AB \\ &= \underline{-3AB + 6BA} + 4B^2 \end{aligned}$$

On ne peut pas additionner le deux matrices !

# Systemes d'equations lineaires

Ch2\_  
18

Un systeme de  $m$  equations lineaires a  $n$  variables comme suit

$$\begin{array}{cccc} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n & = & b_1 \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}$$

Soit

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \text{et} \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

On peut ecrire le systeme d'equations sous forme matricielle

$$\mathbf{AX} = \mathbf{B}$$

# Matrices idempotentes et nilpotentes

## Definition

(1) Une matrice carrée  $A$  est dite idempotente si  $A^2=A$ .

(2) Une matrice carrée  $A$  est dite nilpotente  
s'il existe un entier positif  $p$  tel que  $A^p=0$ .

Le plus petit entier  $p$  tel que  
 $A^p=0$  est appelé le degré de nilpotence de la matrice.

## Exemple 14

$$(1) A = \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, A^2 = \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = A.$$

$$(2) B = \begin{bmatrix} 3 & -9 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, B^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad \text{Deg de nilpotence est: 2}$$