وقاية

هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

المحتوى التوعوي:
التوعية بالحساسية

الفئة المستهدفة :

بنين ● بنات ●

المرحلة :
الابتدائية والمتوسطة والثانوية

تاريخ آخر تحديث: ٢٠٢٦,٩,٣ م

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

محتوى المادة التوعوية



- مقدمة
- ماهي الحساسية؟
- أنواع الحساسية
- حساسية الطعام
- الحساسية الموسمية
- حساسية الجلد
- حساسية الأدوية
- حساسية لدغات ولسعات الحشرات
- الحساسية المفرطة (التأق)

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

مقدمة

وقاية

هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

في هذا المحتوى سنتعرف على الحساسية، وأنواعها، والأعراض التي قد تظهر عند حدوثها، وكيف يمكن الوقاية منها.

كما سنتعلم ماذا نفعل عند ظهور أعراض الحساسية، وكيف نتصرف بسرعة عند حدوث حساسية شديدة لحماية أنفسنا وزملائنا.

وقـايـــة
هيئـة الصحـة العامـة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY



ما هي الحساسية؟

الحساسية هي استجابة زائدة من جهاز المناعة تجاه مادة معينة تسمى (مسبب الحساسية). وقد تكون هذه المادة غير ضارة لمعظم الناس، لكن جسم الشخص المصاب بالحساسية يتفاعل معها فتظهر عليه أعراض مختلفة. وقد تكون أعراض الحساسية خفيفة أو شديدة.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

أنواع الحساسية



حساسية الطعام



الحساسية الموسمية



حساسية الجلد



حساسية الادوية



حساسية من لدغات ولسعات الحشرات

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

حساسية الطعام



تحدث حساسية الطعام عندما يتفاعل جهاز المناعة مع نوع معين من الطعام. وقد تظهر الأعراض بعد تناول الطعام بفترة قصيرة، وتختلف شدتها من شخص إلى آخر.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

حساسية الطعام

ما الأعراض التي قد تظهر؟


قد تظهر بعض الأعراض، مثل:


- ألم أو انتفاخ في البطن
- القيء
- حكة أو طفح جلدي.
- تورم في اللسان أو الشفتين.
- صعوبة في التنفس
- الدوخة أو الإغماء



وفي بعض الحالات قد تحدث حساسية مفرطة (تأق)، وهي حالة طارئة تحتاج إلى تدخل سريع.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY







حساسية الطعام

ما هي الأطعمة الأكثر شيوعاً التي قد تسبب الحساسية؟

- الحليب.
- البيض.
- الفول السوداني والمكسرات.
- القمح.
- السمسم.
- الصويا.
- الأسماك ولمأكولات البحرية.

قد تسبب أطعمة أخرى الحساسية لدى بعض الأشخاص أيضًا.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

حساسية الطعام

كيف نحافظ على سلامة زملائنا؟

- لا تشارك الاطعمة الخاصة بك مع زملائك، لأن بعض الأطفال قد تكون لديهم حساسية تجاهها.
- لا تضغط على زميلك لتجربة طعام لا يرغب في تناوله.
- لا تستهِن بالحساسية أو تمزح بإعطاء شخص طعامًا يتحسس منه.
- إذا ظهرت على زميلك أعراض الحساسية بعد تناول الطعام، أخبر أحد المعلمين أو الموجه الصحي فورًا.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY



الحساسية الموسمية

هي رد فعل مناعي يحدث عندما يتفاعل الجسم مع بعض المواد الموجودة في البيئة، مثل حبوب اللقاح والغبار، وتزداد أعراضها في مواسم معينة من السنة.


وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

الحساسية الموسمية

ما الأعراض التي قد تظهر؟

قد تظهر أعراض مثل:


- العطاس المتكرر.
- سيلان أو انسداد الأنف.
- حكة في الأنف أو العينين.
- احمرار العينين وزيادة الدموع.
- الشعور بالتعب أو الصداع أحيانًا.



وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

الحساسية الموسمية

كيف أحمي نفسي ؟



- تجنب الأماكن التي تزداد فيها الأتربة والغبار قدر الإمكان.
- أغلق النوافذ عند زيادة الغبار أو حبوب اللقاح.
- اغسل اليدين والوجه بعد العودة من الخارج.
- استحم وغير ملابسك بعد بعد قضاء وقت طويل خارج المنزل.
- حافظ على نظافة المكان وتقليل تراكم الغبار.
- تجنب فرك العينين عند الشعور بالحكة.
- إذا كان لديك علاج موصوف للحساسية، استخدمه حسب توجيهات الطبيب وولي الأمر.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY



حساسية الجلد

قد تظهر حساسية الجلد عند ملامسة بعض المواد التي يتحسس منها الجلد، مثل بعض أنواع الصابون أو العطور أو مستحضرات التجميل أو المعادن. وتختلف المواد المسببة للحساسية من شخص إلى آخر.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

حساسية الجلد

ما الأعراض التي قد تظهر؟



قد تظهر الأعراض مثل:

- احمرار الجلد
- الحكة
- جفاف أو تقشر الجلد
- ظهور طفح جلدي أو حبوب
- تورم المنطقة المصابة

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

حساسية الجلد

كيف أحمي بشرتي ؟







- استخدم منتجات لطيفة ومناسبة للبشرة
- تجنب المنتجات التي تعرف أنها تسبب لك الحساسية أو التهيج.
- حافظ على ترطيب البشرة
- تجنب حك الجلد عند الشعور بالحكة
- اغسل الجلد بلطف وجففه دون فرك
- أخبر ولي أمرك أو الموجه الصحي إذا كانت الأعراض شديدة أو مستمرة.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY



حساسية الأدوية

حساسية الأدوية هي رد فعل تحسسي يحدث لدى بعض الأشخاص تجاه دواء معين.

وليست كل الأعراض التي تحدث بعد تناول الدواء حساسية، لذلك يجب إخبار الطبيب أو ولي الأمر عند ظهور أعراض غير معتادة.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

حساسية الأدوية

ما الأعراض التي قد تظهر؟



قد تظهر أعراض مثل:

- طفح جلدي أو حكة.
- بقع أو انتفاخات حمراء على الجلد.
- تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان.
- صعوبة في التنفس.

وقد تكون حساسية الدواء شديدة في بعض الحالات وتحتاج إلى مساعدة طبية عاجلة.


وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

حساسية الأدوية

كيف أحمي نفسي ؟

- لا تتناول أي دواء دون توجيه من ولي الأمر أو الطبيب.
- لا تتناول دواءً خاصًا بشخص آخر.
- إذا كان لديك حساسية معروفة من دواء معين، أخبر المدرسة بذلك.
- إذا ظهرت عليك أعراض غير معتادة بعد تناول دواء، أخبر ولي أمرك أو الموجه الصحي فورًا.
- احرص أنت وولي أمرك على معرفة اسم الدواء الذي سبب لك الحساسية.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY



حساسية لدغات ولسعات الحشرات

قد تحدث الحساسية لدى بعض الأشخاص بعد لدغة أو لسعة حشرة، مثل النحل أو الدبابير أو النمل وبعض الحشرات الأخرى.

وتختلف شدة الأعراض من شخص إلى آخر.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

حساسية لدغات ولسعات الحشرات



ما الأعراض التي قد تظهر؟

- احمرار وحكة في مكان اللدغة أو اللسعة.
- ألم أو تورم حول المكان.
- قد يكون التورم لدى بعض الأشخاص أكبر من المعتاد.

وإذا ظهرت صعوبة في التنفس، أو تورم في الوجه أو اللسان، أو دوخة أو إغماء، فيجب طلب المساعدة فورًا.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

حساسية لدغات ولسعات الحشرات

كيف أحمي نفسي ؟

- ارتدِ ملابس تغطي الذراعين والساقين عند التواجد في أماكن تكثر فيها الحشرات.
- استخدم طارد الحشرات المناسب عند الحاجة وبمساعدة ولي الأمر.
- ابتعد عن خلايا النحل أو أعشاش الحشرات.
- تجنب استخدام العطور القوية عند التواجد في الأماكن التي تكثر فيها الحشرات.
- لا تحاول ضرب أو إزعاج الحشرات الطائرة.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY



الحساسية المفرطة (التأق)

الحساسية المفرطة أو **التأق** هي **رد فعل تحسسي شديد وسريع قد يهدد الحياة**.
وقد تحدث بعد التعرض لبعض الأطعمة أو الأدوية أو لسعات الحشرات أو غيرها من مسببات الحساسية.
وتحتاج إلى تدخل سريع وفوري.

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

الحساسية المفرطة (التأق)

ما الأعراض التي قد تظهر؟

- تورم الشفاه، واللسان، والوجه، والعينين.
- تورم وضيق في الحلق.
- صعوبة في التنفس والتحدث.
- سرعة ضربات القلب.
- طفح جلدي مصاحب، مع قيء أو آلام في البطن.
- الدوخة، أو الإغماء، أو فقدان الوعي.



وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

الحساسية المفرطة (التأق)

ماذا أفعل إذا ظهرت هذه العلامات على إحدى زملائي ؟

- لا تترك زميلك وحده.
- يجب طلب الإسعاف فورًا؛ فالحساسية المفرطة حالة طارئة.
- إذا كان لدى زميلك قلم أدرينالين (إبينفرين) موصوف له، فيُستخدم فورًا وفق خطة الطوارئ بواسطة الشخص القادر أو المدرّب على استخدامه.
- لا تطلب من زميلك الوقوف أو المشي إذا كان يشعر بالدوخة أو الإعياء.

التصرف السريع قد ينقذ الحياة.



وقاية

هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

شكرا لحسن استماعكم