



TEMA 4 DERIVACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE FUNCIONES ESCALARES DE VARIAS VARIABLES.

4.1 Definición de funciones escalares de variable vectorial. Región de definición.



$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

$$A = A(b, h)$$



$$V = \pi r^2 h$$

$$V = V(r, h)$$



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$V = V(r, h)$$



$$V = \pi r^2 h + \frac{2}{3} \pi r^3$$

$$V = V(r, h)$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$A = 4 \pi r^2$$

$$A = \pi r^2 + 2 \pi r h + 2 \pi r^2$$



$$A = 3 \pi r^2 + 2 \pi r h$$

$$A = A(r, h)$$



Definición. Espacio numérico n-dimensional


El conjunto de todas las n-adas ordenadas de números reales se denomina espacio numérico n-dimensional y se denota por \mathbb{R}^n . Cada n-ada ordenada (x_1, x_2, \dots, x_n) se llama punto del espacio numérico n-dimensional.



Definición. Función real o escalar de variable vectorial.

Sea S un conjunto de n -adas ordenadas de números reales, $S \subset \mathbb{R}^n$. Si a cada n -ada ordenada \bar{x} en S le corresponde un único número real $f(\bar{x})$, se dice que f es una función escalar de variable vectorial. El conjunto S es el dominio de f y el correspondiente conjunto de valores $f(\bar{x})$ es el recorrido de f .

Notación: $f : S \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$
Esquemáticamente



Ejemplo:

$$f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$$

Dominio de la función.

$$9 - x^2 - y^2 \geq 0$$

$$-(-x^2 - y^2 \geq -9)$$

$$x^2 + y^2 \leq 9$$

P.P. (punto de prueba)


$(0, 0)$

$$0^2 + 0^2 \leq 9$$

$$0 \leq 9 \checkmark$$

Ecuación auxiliar:

$$x^2 + y^2 = 9$$



S - dominio de la función

$$S = \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 9 ; x, y \in \mathbb{R} \}$$

Recorrido de la función.

$$f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$$


$$f(x, y) = \sqrt{9 - (x^2 + y^2)}$$

$$f(0, 0) = 3$$

$$R = [0, 3]$$

$$f(3, 0) = 0 \quad f(0, 3) = 0$$

Esquemáticamente



$$f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$$

$$f(1, 1) = \sqrt{7}$$

vector escalar

función escalar
de variable
vectorial

Gráfica de la función.

C.D. $y = f(x)$

C.I. $z = f(x, y)$


$$f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$$

$$(z)^2 = (\sqrt{9 - x^2 - y^2})^2$$

$$z^2 = 9 - x^2 - y^2$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9$$


$$z = \pm \sqrt{9 - x^2 - y^2}$$



Concepto de región.

Definición

Se llama vecindad o entorno del punto $P_0(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ al conjunto de puntos que se encuentran en el interior de una circunferencia de radio δ y cuyo centro es (x_0, y_0) . Esto es, a todos los puntos (x, y) que satisfagan la desigualdad $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \delta^2$ a δ se le llama radio de la vecindad.



$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \delta^2$$

Vecindad o entorno de P_0

$$\delta = 0.01$$


$$0 < (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \delta^2$$

$$x = x_0$$

$$0 < 0 < \delta$$

$$y = y_0$$

P_0 - no pertenece a su vecindad



Entorno reducido de P_0

ó

vecindad agujereada de P_0

Notación: $\|\bar{x} - \bar{x}_0\| < \delta$ — vecindad de P_0

$$\bar{x} = (x, y)$$

$$\bar{x}_0 = (x_0, y_0)$$

$$\bar{x} - \bar{x}_0 = (x - x_0, y - y_0)$$

$$\|\bar{x} - \bar{x}_0\| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$$

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$$

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \delta^2$$

$0 < \|\bar{x} - \bar{x}_0\| < \delta$ entorno
reducido
o vecindad agujereada
de P_0

Definición

Al conjunto de puntos $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ que satisfacen la desigualdad $\|\bar{x} - \bar{x}_0\| < \delta$ se le denomina vecindad o entorno del punto $\bar{x}_0 = (x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0n}) \in \mathbb{R}^n$.



$$(x_1 - x_{01})^2 + (x_2 - x_{02})^2 + \dots + (x_n - x_{0n})^2 < \delta^2$$

Definición

Sean P un punto y S un subconjunto de \mathbb{R}^n .

- 1) P es un punto interior de S si todos los puntos de al menos una de sus vecindades, están contenidos en S .
- 2) P es un punto exterior de S si todos los puntos de al menos una de sus vecindades, no pertenecen a S .
- 3) P es un punto frontera de S si en cualquiera de sus vecindades existen puntos que pertenecen a S y puntos que no pertenecen a S .
- 4) P es un punto singular de S si todos los puntos de al menos una de sus vecindades, están contenidos en S con excepción del mismo punto.

En \mathbb{R}^2




Definición

Sea S un subconjunto de \mathbb{R}^n . Entonces:

- 1) S es cerrado si contiene puntos interiores y contiene a todos sus puntos frontera.
- 2) S es abierto si contiene puntos interiores y no contiene puntos frontera.
- 3) S es semiabierto o semicerrado si contiene puntos interiores y algunos puntos frontera.

Ejemplos:

$$1) S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1; x, y \in \mathbb{R}\}$$




$x^2 + y^2 = 1 \leftarrow$ Puntos
frontera

S es cerrado

$$S = \left\{ (x, y, z) \mid \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0; x, y, z \in \mathbb{R} \right\}$$

$x=0 \quad y=0 \quad z=0$




$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} = 1$$

Elipsoide

S es cerrado.


$$2) S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1; x, y \in \mathbb{R}\}$$



S es abierto

No hay puntos frontera

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 < 1; x, y, z \in \mathbb{R}\}$$




S - abierto

No hay puntos frontera: $x^2 + y^2 + z^2 = 1$

$$3) S = \left\{ (x, y) \mid \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} < 1, x \geq 0, y \geq 0, x, y \in \mathbb{R} \right\}$$


$x=0 \quad y=0$



S es semiabierto o semicerrado

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 < 4; x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

$$x=0, y=0, z=0$$




S es semiabierto o semicerrado.

Definición


Sean P y Q dos puntos arbitrarios de un conjunto $S \subset \mathbb{R}^n$. Si P y Q pueden ser unidos mediante un segmento de curva cuyos puntos pertenecen a S , se dice entonces que S es un conjunto conexo. Si además, dicho segmento es parte de una recta, entonces S se denomina convexo.



una sola
pieza
conexo



Conexo ✓
Convexo ✓




no es conexo.
no es convexo.

Definición


Un conjunto S en el plano o en el espacio es simplemente conexo si toda curva cerrada allí se puede reducir continuamente hasta convertirla en un punto contenido en S .

Ejemplos:





Simplemente
conexo


No tiene
hoyos




No debe
tener
túneles.



∅ "Dura zona
sin hueso"



simplemente
conexo




No es simplemente
conexo.

Definición

Una región es un conjunto conexo de puntos que puede ser cerrado, abierto o semicerrado.

Ejemplo:

$$R = \{(x, y) \mid y \geq x^2; x^2 + y^2 \leq 4; x, y \in \mathbb{R}\}$$




$$y = x^2 \text{ (E.A.)}$$

$$y \geq x^2$$

$$\text{P.P.: } (0, 2)$$

$$2 \geq 0^2 \checkmark$$





$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{E.A.}$$

$$x^2 + y^2 \leq 4$$

$$\text{P.P. : } (0,0)$$

$$0 \leq 4 \quad \checkmark$$



Conceptos de dominio y recorrido y la representación gráfica de éstos.


Ejemplos:

$$1) f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$$

$$y - x^2 \geq 0$$

$$y \geq x^2$$

S-dominio



$$S = \{(x, y) \mid y \geq x^2; x, y \in \mathbb{R}\}$$


$$R = [0, \infty)$$

$$2) f(x, y) = \frac{1}{xy}$$

$$f: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$xy \neq 0$$


$$x \neq 0, y \neq 0$$



$$S = \{(x, y) \mid x \neq 0, y \neq 0; x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$R = \mathbb{R} - \{0\}$$

$$3) f(x, y) = \operatorname{sen} xy$$




$$S = \mathbb{R}^2$$

$$R = [-1, 1]$$

$$4) f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$f: S \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$



$$S = \mathbb{R}^3$$

$$\mathbb{R} = [0, \infty)$$

$$5) \quad f(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$$


$$f: S \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$S = \mathbb{R}^3 - \{ (0, 0, 0) \}$$

$$R = \mathbb{R}^+$$

$$6) f(x, y, z) = xy \ln z$$

$$f: S \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$



$$S = \{ (x, y, z) \mid z > 0 ; x, y, z \in \mathbb{R} \}$$


$$\mathbb{R} = \mathbb{R}$$

$$7) f(x, y) = \ln(xy)$$

$$xy > 0$$

$$x > 0, y > 0$$

$$; \quad x < 0, y < 0$$



$$S = S_1 \cup S_2$$



$$S_1 = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0; x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$S_2 = \{(x, y) \mid x < 0, y < 0; x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$R = \mathbb{R}$$

$$8) f(x, y) = \sqrt{\sinh(2x + y)}$$

$$\sinh(2x + y) \geq 0 \rightarrow 2x + y \geq 0$$



$$S = \{(x, y) \mid 2x + y \geq 0; x, y, \in \mathbb{R}\}$$

$$R = [0, \infty)$$