


2.5.2 Funciones pares e impares

Criterio para funciones pares e impares


La función $y = f(x)$ es par si $f(-x) = f(x)$.

La función $y = f(x)$ es impar si $f(-x) = -f(x)$.



f - PAR

Es simétrica
con respecto al eje "y"




f - IMPAR

Es simétrica con
respecto al origen.

Ejemplos:

1) $f(x) = x^2$




Es par.

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$$

$$f(-x) = f(x)$$

2) $f(x) = x^3$



Es impar


$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$$

$$f(-x) = -f(x)$$


3) $f(x) = x^n$ donde n es un entero.

f es par si n es par, y es impar si n es impar.

```
> plot([x**3,x**(-5),x**11],x=-5..5,y=-5..5,color=[brown,blue,brown],thickness=2,discont=true);
```



```
plot([x**2,x**(-4),x**12],x=-5..5,y=-5..5,color=[red,green,ye  
llow],thickness=2,discont=true);
```



Propiedades de las funciones pares e impares

Productos y sumas de funciones con el mismo dominio obedecen las siguientes reglas:

$$(\text{par})(\text{par}) = (\text{impar})(\text{impar}) = \text{par}$$

$$\underline{(\text{par})(\text{impar})} = (\text{impar})(\text{par}) = \text{impar}$$

$$(\text{par}) \pm (\text{par}) = \text{par}$$

$$\text{impar} \pm \text{impar} = \text{impar}$$

$$f(x) - \text{par} \quad g(x) - \text{impar}$$

$$F(x) = f(x)g(x)$$

$$F(-x) = f(-x)g(-x) = [f(x)][-g(x)]$$

$$F(-x) = -f(x)g(x) = -F(x)$$


$$F(-x) = -F(x)$$

2.5.3 Funciones trigonométricas directas e inversas y su representación gráfica

Funciones periódicas

Una función f se dice que es periódica con periodo $p \neq 0$, si siempre que x esté en el dominio de f , entonces $x + p$ también está en el dominio de f , y se cumple que: $f(x + p) = f(x)$

$p=1$ periodo fundamental




Funciones circulares

$$f = \{(x, y) \mid x = \cos t, y = \sin t, t \in \mathbb{R}\} \text{ en forma paramétrica}$$

t -parámetro


$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}$$

$$\begin{aligned} + (x)^2 &= (\cos t)^2 \\ + (y)^2 &= (\sin t)^2 \\ \hline x^2 + y^2 &= 1 \end{aligned}$$



Dominio

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}$$



$$D_{\cos t} = \mathbb{R}$$

$$D_{\sin t} = \mathbb{R}$$


$$R = [-1, 1]$$

Periodicidad

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}$$

$$x = \cos(t + \underline{2\pi}) = \cos t$$


$$y = \sin(t + \underline{2\pi}) = \sin t$$



Periodo = 2π

Paridad

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}$$



$$\cos(-t) = -x = \cos t$$

$$\cos(-t) = \cos t$$

PAR



$$\sin(-t) = -y = -\sin t$$

$$\sin(-t) = -\sin t$$

IMPARE

GRÁFICAS

t grados	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
t radlans	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$2\frac{\pi}{3}$	$3\frac{\pi}{4}$	$5\frac{\pi}{6}$	π
sent	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
cost	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1



Identidades de cofunciones (fórmulas de reducción)

$$\cos t = \sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right)$$


$$\sin t = \cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right)$$

$$\begin{aligned}\sin(450^\circ) &= \cos(90^\circ - 150^\circ) = \\ &= \cos(-60^\circ) = \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \\ \sin(150^\circ) &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$


```
plot(sin(t),t,color=blue,thickness=2);
```

$$Y = \sin t$$

Es impar




```
plot(sin(t), t=0..2*Pi, color=blue, thickness=2);
```




```
plot(cos(t),t,color=blue,thickness=2);
```

$$y = \cos t$$

Es par




```
plot(cos(t), t=0..2*Pi, color=blue, thickness=2);
```





```
> restart;  
plot(tan(x), x=-2*Pi..2*Pi, y=-4..4, discont=true, color=blue, thickness=2);
```

$y = \tan x$
Es impar



```
> restart;
with(plots):
G1:=implicitplot([x=Pi/2,x=-Pi/2],x=-2..2,y=-10..10,color=[blue,blue]);
G2:=plot(tan(x),x=-Pi/2..Pi/2,y=-10..10,thickness=2,discont=true);
display(G1,G2);
```

Warning, the name changecoords has been redefined



```
> restart;  
plot(cot(x), x=-2*pi..2*pi, y=-4..4, discont=true, color=blue, thickness=2);
```

$$y = \cot x$$


es impar

$$f(x) = \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$f(-x) = \frac{\cos(-x)}{\sin(-x)} =$$


$$= \frac{\cos x}{-\sin x} = -\frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\cot(-x) = -\cot x$$




```
> restart;
with(plots):
s1:=implicitplot([x=0,x=Pi],x=-0.1..4,y=-5..5,color=[green,blue]);
s2:=plot(cot(x),x=0..Pi,y=-4..4,thickness=2,discont=true);
display(s1,s2);
```

Warning, the name changecoords has been redefined




```
> restart,  
plot(sec(x), x=-2*pi..2*pi, y=-4..4, discont=true, color=blue, thickness=2),
```

$y = \sec x$
Es par




```
> restart,
with(plots):
s1:=implicitplot([x=3*pi/2,x=pi/2,x=-pi/2],x=-2..5,y=-5..5,color=[blue,blue,blue],thickness=2);
s2:=plot(sec(x),x=-pi/2..3*pi/2,y=-5..5,thickness=2,discont=true);
display(s1,s2);
Warning, the name changecoords has been redefined
```

$$y = \sec x$$



```
> restart;  
plot(csc(x), x=-2*pi..2*pi, y=-4..4, discontin=true, color=blue, thickness=2);
```


$y = \csc x$
es impar



```
> restart;
with(plots):
e1:=implicitplot([x=0,x=Pi,x=2*Pi],x=0..8,y=-3..3,color=[blue,blue,green],thickness=2);
e2:=plot(cos(x),x=0..2*Pi,y=-3..3,thickness=2,discont=true);
display(e1,e2);
```

Warning, the name changecoords has been redefined

$$Y = \csc X$$




Ninguna de las seis funciones trigonométricas es inyectiva.


```
> restart;  
plot(arcsin(t), t=-1..1, color=blue, thickness=2);
```

$$y = \arcsin(t)$$


$$\arcsin x = \sin^{-1} x$$

$$\sin^{-1} x \neq \frac{1}{\sin x}$$




```
> restart;  
plot(arccos(t), t=-1..1, color=blue, thickness=2);
```

$$y = \arccos t$$




```
> restart,
plot([arctan(t), pi/2, -pi/2], t, color=[blue, red, red], thickness=2);
```

$$y = \arctan t$$





```
> restart,  
plot([arccot(t), 0, Pi], t=-10..10, y=-0.1..3.5, color=[blue, red, red], thickness=2),
```

$$y = \operatorname{arccot}(t)$$



Intervalo para obtener la secante inversa

$$\left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$$



Intervalo para obtener la cosecante inversa

$$\left(-\pi, -\frac{\pi}{2}\right] \cup \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$$

