

4.9.1. Concepto de gradiente. Operador nabra.

Definición

El gradiente de una función f (o derivada de f) con n variables independientes x_1, x_2, \dots, x_n

(denotado indistintamente con $gradf$, $\frac{df}{d\bar{x}}$ ó ∇f)

está dado por

$$gradf = \frac{df}{d\bar{x}} = \nabla f(\bar{x}) = \frac{\partial f}{\partial x_1} \bar{e}_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \bar{e}_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \bar{e}_n$$

En donde los vectores $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ son los vectores unitarios en las direcciones de los ejes x_1, x_2, \dots, x_n del espacio \mathbb{R}^n , respectivamente, y $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Para $n = 3$, $gradf = \nabla f = \frac{df}{d\vec{x}} = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{k}$
 $f(x, y, z)$

$$\nabla f = \left(\frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k} \right) f$$

$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k} \right)$ es el operador de

Hamilton llamado "nabla".

Ejemplos:

Obtenga el gradiente para las funciones

$$1) f(x, y) = x^2 + y^2, \quad \nabla f|_{(1,1)}$$

$$2) f(x, y, z) = 3^x \cosh y \ln z$$

$$1) f(x, y) = x^2 + y^2, \quad \nabla f|_{(1,1)}$$

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{j}$$

$$\nabla f = 2x \hat{i} + 2y \hat{j}$$

$$\nabla f|_{(1,1)} = 2(1) \hat{i} + 2(1) \hat{j}$$

$$\underline{\nabla f(1,1) = 2\hat{i} + 2\hat{j}}$$

$$2) f(x, y, z) = 3^x \cosh y \ln z$$

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{k}$$

$$\nabla f = (3^x \ln 3 \cosh y \ln z) \hat{i} + (3^x \sinh y \ln z) \hat{j} \\ + \left(\frac{3^x \cosh y}{z} \right) \hat{k}$$

Propiedades del gradiente

Suponga que f y g son funciones diferenciables de dos variables, entonces

$$1) \nabla(cf) = c\nabla f$$

$$2) \nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$$

$$3) \nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$$

$$4) \nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$$

4.9.2. Definición de derivada direccional

Definición


La derivada direccional de $z = f(x, y)$ en $A_0(x_0, y_0)$ en la dirección del vector unitario

$\bar{u} = \cos \theta \hat{i} + \text{sen} \theta \hat{j}$ es el número

$$\left(\frac{df}{ds}(x_0, y_0) \right)_{\bar{u}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + s \cos \theta, y_0 + s \text{sen} \theta) - f(x_0, y_0)}{s}$$

siempre que el límite exista.

4.9.3. Interpretación geométrica y aplicaciones.




Semirecta

$$P: \begin{cases} x = x_0 + S \cos \theta \\ y = y_0 + S \sin \theta \end{cases}$$


$$s \geq 0$$

T
(recta tangente
a C en P_0)



$$m_{\text{sec } P_0 Q} = ?$$

$$m_{\text{sec } P_0 Q} = \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0)}{S}$$



$$d_{A_0 B} = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} =$$

$$= \sqrt{(\cancel{x_0} + s \cos \theta - \cancel{x_0})^2 + (\cancel{y_0} + s \sin \theta - \cancel{y_0})^2}$$

$$= \sqrt{s^2} = |s| = s$$

$$s \geq 0$$

$$m_{\text{sec } P_0 Q} = \frac{f(x_0 + s \cos \theta, y_0 + s \sin \theta) - f(x_0, y_0)}{s}$$

$$\begin{aligned} \lim_{Q \rightarrow P_0} m_{\text{sec } P_0 Q} &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + s \cos \theta, y_0 + s \sin \theta) - f(x_0, y_0)}{s} \\ &= \left(\frac{df}{ds} \right)_{\bar{u}, P_0} \end{aligned}$$

$\left(\frac{df}{ds}\right)_{\bar{u}, P_0}$ — la pendiente de la recta tangente a C en el punto P_0 en la dirección del vector unitario \bar{u} .

Teorema

Si las derivadas parciales de $f(x, y)$ se definen en (x_0, y_0) , entonces la derivada direccional de f en la dirección de $\bar{u} = \cos\theta\hat{i} + \text{sen}\theta\hat{j}$ está dada

$$\text{por } \left(\frac{df}{ds} \right)_{\bar{u}, P_0} = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \bar{u}$$

$$\left(\frac{df}{ds}\right)_{\bar{u}} = \nabla f \cdot \bar{u}, \quad \nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right)$$

$$\bar{u} = \cos\theta \hat{i} + \sin\theta \hat{j}$$

$$\left(\frac{df}{ds}\right)_{\bar{u}} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right) \cdot (\cos\theta, \sin\theta)$$

$$\left(\frac{df}{ds}\right)_{\bar{u}} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos\theta + \frac{\partial f}{\partial y} \sin\theta$$

$$\left(\frac{df}{ds} \right)_{\bar{u}} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y} \operatorname{sen} \theta$$

$$\text{Si } \theta = 0 \quad , \quad \left(\frac{df}{ds} \right)_{\hat{i}} = \frac{\partial f}{\partial x}$$

$$\bar{u} = \hat{i}$$

$$\text{Si } \theta = \frac{\pi}{2} \quad , \quad \left(\frac{df}{ds} \right)_{\hat{j}} = \frac{\partial f}{\partial y}$$


$$\bar{u} = \hat{j}$$

¿En qué dirección crece la función más rápidamente?


¿En qué dirección es mayor $\left(\frac{df}{ds}\right)_{\bar{u}, P_0}$?

De algebra vectorial: $\bar{a} \cdot \bar{b} = \|\bar{a}\| \|\bar{b}\| \cos \theta$

$$\left(\frac{df}{ds}\right)_{\bar{u}, P_0} = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \bar{u}$$




$$\left(\frac{df}{ds}\right)_{\bar{u}, P_0} = \|\nabla f(x_0, y_0)\| \|\bar{u}\| \cos \theta$$



$$\left(\frac{df}{ds} \right)_{\bar{u}, P_0} = \|\nabla f(x_0, y_0)\| \|\bar{u}\| \cos \theta$$

$$\|\bar{u}\| = 1$$

$$\left(\frac{df}{ds} \right)_{\bar{u}, P_0} = \|\nabla f(x_0, y_0)\| \cos \theta, \quad \underline{0 \leq \theta \leq \pi}$$




$$\text{Si } \theta = 0, \quad \left(\frac{df}{ds} \right)_{\bar{u}, P_0} = \|\nabla f(x_0, y_0)\| \cos(0)$$

$$\left(\frac{df}{ds} \right)_{\bar{u}, P_0} = \|\nabla f(x_0, y_0)\|$$

Es el valor máximo


$$\nabla f(x_0, y_0) \parallel \bar{u}$$



$$\text{Si } \theta = \frac{\pi}{2}, \quad \left(\frac{df}{ds} \right)_{\bar{u}, P_0} = \left\| \nabla f(x_0, y_0) \right\| \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$\nabla f(x_0, y_0) \perp \bar{u}$$

f - constante




$$\text{Si } \theta = \pi, \quad \left(\frac{df}{ds} \right)_{\bar{u}, P_0} = \|\nabla f(x_0, y_0)\| \cos(\pi)$$

$$\left(\frac{df}{ds} \right)_{\bar{u}, P_0} = -\|\nabla f(x_0, y_0)\|$$

Es el valor mínimo

El $\nabla f(x_0, y_0)$ y \bar{u} tienen direcciones opuestas.



Teorema

Sea f diferenciable en el punto (x, y) .

1. Si $\nabla f(x, y) = \bar{0}$, entonces $\left(\frac{df}{ds}\right)_{\bar{u}} = 0$ para $\forall \bar{u}$.

2. La dirección de máximo crecimiento de f viene dada por $\nabla f(x, y)$. El valor máximo de

En la dirección del gradiente.
 $\left(\frac{df}{ds}\right)_{\bar{u}}$ es $\|\nabla f(x, y)\|$.

3. La dirección de mínimo crecimiento de f viene dada por $-\nabla f(x, y)$. El valor mínimo

de $\left(\frac{df}{ds}\right)_{\bar{u}}$ es $-\|\nabla f(x, y)\|$. *En la dirección opuesta del gradiente*


4. Cualquier dirección normal al gradiente, es una dirección de cero cambio de f .

Interpretación geométrica del gradiente.

Teorema. El gradiente es normal a las curvas de nivel.

Si f es diferenciable en (x_0, y_0) y $\nabla f(x_0, y_0) \neq \bar{0}$, entonces el gradiente $\nabla f(x_0, y_0)$ es normal a la curva de nivel que pasa por (x_0, y_0) .

$f(x, y) = k$
Curvas de nivel




La ecuación de la recta tangente a la curva de nivel en el punto (x_0, y_0) está dada por

$$\nabla f(x_0, y_0) \cdot (x - x_0, y - y_0) = 0.$$

Teorema. El gradiente es normal a las superficies de nivel.

Si f es diferenciable en (x_0, y_0, z_0) y $\nabla f(x_0, y_0, z_0) \neq \bar{0}$, entonces el gradiente $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$ es normal a la superficie de nivel que pasa por (x_0, y_0, z_0) .

$f(x, y, z) = k$
Superficies de nivel



Ejemplos:

Calcule la derivada direccional de la función

$$f(x, y) = \sqrt{2} x^2 \operatorname{sen} y \quad \text{en el punto } P_0 \left(1, \frac{\pi}{4} \right)$$

y en la dirección del vector que forma un ángulo de 60° con la dirección positiva del eje "x".

$$\left(\frac{df}{ds} \right)_{\bar{u}, P_0} = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \bar{u}$$

$$\left(\frac{df}{ds}\right)_{\bar{u}, P_0} = \nabla f\left(1, \frac{\pi}{4}\right) \cdot \bar{u}$$

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{j}$$

$$\nabla f = 2\sqrt{2} x \operatorname{sen} y \hat{i} + \sqrt{2} x^2 \cos y \hat{j}$$

$$\nabla f\left(1, \frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2} (1) \operatorname{sen} \frac{\pi}{4} \hat{i} + \sqrt{2} (1)^2 \cos \frac{\pi}{4} \hat{j}$$

$$\nabla f\left(1, \frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \hat{i} + \sqrt{2} \frac{\sqrt{2}}{2} \hat{j}$$

$$\nabla f\left(1, \frac{\pi}{4}\right) = 2 \hat{i} + \hat{j}$$

$$\bar{u} = \cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}$$

$$\theta = 60^\circ$$

$$\bar{u} = \cos 60^\circ \hat{i} + \sin 60^\circ \hat{j}$$

$$\bar{u} = \frac{1}{2} \hat{i} + \frac{\sqrt{3}}{2} \hat{j}$$



$$\left(\frac{df}{ds} \right)_{\bar{u}, P_0} = (2, 1) \cdot \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\left(\frac{df}{ds} \right)_{\bar{u}, P_0} = \frac{2 + \sqrt{3}}{2}$$

Ejemplo:

Encuentre la derivada direccional de

$$f(x, y, z) = 3^x + \operatorname{sen} hy + \ln z$$

en el punto $\overset{P_0}{(0, 0, 1)}$ y en la dirección del vector $\bar{a} = (3, 4, 5)$.

$$\left(\frac{df}{ds} \right)_{\bar{u}, P_0} = \nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot \bar{u}$$

$$\left(\frac{df}{ds} \right)_{\bar{u}, P_0} = \nabla f(0, 0, 1) \cdot \bar{u}$$

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{k}$$

$$\nabla f = 3^x \ln 3 \hat{i} + \cosh y \hat{j} + \frac{1}{z} \hat{k}$$

$$\nabla f(0,0,1) = \ln 3 \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$$

$$\bar{a} = (3, 4, 5)$$

$$\|\bar{a}\| = \sqrt{9+16+25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

$$\bar{u} = \frac{\bar{a}}{\|\bar{a}\|} = \left(\frac{3}{5\sqrt{2}}, \frac{4}{5\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\left(\frac{df}{ds}\right)_{\bar{u}, P_0} = (\ln 3, 1, 1) \cdot \left(\frac{3}{5\sqrt{2}}, \frac{4}{5\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\left(\frac{df}{ds}\right)_{\bar{u}, P_0} = \frac{3\ln 3}{5\sqrt{2}} + \frac{4}{5\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{3\ln 3 + 9}{5\sqrt{2}}$$

$$\underline{\left(\frac{df}{ds}\right)_{\bar{u}, P_0} = \frac{3\ln 3 + 9}{5\sqrt{2}}}$$

FIN DEL CURSO