

Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
Московский физико-технический институт (государственный
университет)

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау
Кафедра вычислительной физики конденсированного состояния и
живых систем
Лаборатория №1.6 теплофизических баз данных ОИВТ РАН

Выпускная квалификационная работа бакалавра
Квантово-механические расчеты и
термодинамические функции карбидов аргона

Автор:

Студент 203 группы
Щерба Александр Андреевич

Научный руководитель:

Доктор физико-математических наук
Мальцев Максим Александрович



Москва 2026

Abstract

Квантово-механические расчеты и термодинамические функции карбидов аргона

Иванов Иван Иванович

Были вычислены межатомные потенциалы для 21 низколежащего состояния иона ArC^+ , охватывающие оба предела диссоциации $\text{Ar}(^1\text{S}) - \text{C}^+(^2\text{P})$ и $\text{Ar}^+(^2\text{P}) - \text{C}(^3\text{P})$.

Расчеты были выполнены на уровне теории CASSCF/MRACPF2a с использованием базисных наборов aug-cc-pwCVnZ ($n=\text{T, Q}$) с последующей экстраполяцией к пределу CBS. На основе численно рассчитанных энергетических спектров были оценены зависящие от температуры термодинамические функции в диапазоне 298.15 – 20000 К. Также было оценено влияние включения возбужденных электронных состояний в термодинамические расчеты.

СТАТЬЯ

Abstract

Research and development of machine learning methods

Contents

1	Введение	4
1.1	Актуальность работы	4
1.2	Постановка задачи	4
1.3	Обзор литературы	4
2	Методы квантово-механического расчета	5
2.1	Теоретические основы квантово-химических расчетов	5
2.2	Метод самосогласованного поля в полном активном пространстве . . .	7
2.3	Многорференсный метод конфигурационного взаимодействия	9
2.4	Пакет Orca и получаемые результаты	11
3	Расчет термодинамических функций	13
3.1	Энергетический спектр состояний	13
3.2	Статистическая сумма и термодинамические потенциалы	14
3.3	Веб-приложение GasThermo для расчета ТД-потенциалов	16
4	Расчет термодинамических функций ArC^+	17
4.1	Результаты расчетов потенциальных кривых	17
4.2	Сравнение с предыдущими работами	18
4.3	Термодинамические функции	19
5	Расчет термодинамических функций ArC	22
5.1	Результаты расчета и сравнение потенциальных кривых	22
5.2	Термодинамические функции	22
6	Заключение	23
	Приложение	23

1 Введение

1.1 Актуальность работы

1.2 Постановка задачи

1.3 Обзор литературы

2 Методы квантово-механического расчета

2.1 Теоретические основы квантово-химических расчетов

Определить ППЭ, связь со уровнями энергии, молекулярные орбитали. Оправдать обоснованность подхода, ввести основные диаграммы, понятия о статистической и динамической корреляции.

Квантовая химия – раздел теоретической химии, в котором методами квантовой механики исследуется электронная структура молекулярной системы, информация о которой используется для определения структурных, химических и энергетических свойств. Задачей методов квантовой химии ставится нахождение волновой функции собственной к фиксированному гамильтониану системы, определяемой в стационарном уравнении Шредингера 2.1. Этот гамильтониан можно разбить на набор энергетических операторов, отвечающих отдельным элементам движения и взаимодействия в системе. В случае присутствия K атомов и N электронов мы также вводим координатное представление волновой функции, в котором появляется зависимость от координат атомов $\mathbf{R} = (\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_K)$, а также координат и спинов электронов $\mathbf{r} = (\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N)$, $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \dots, \sigma_N)$.

$$\begin{aligned}\hat{H}\psi &= E\psi, \quad \psi = \psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}, \boldsymbol{\sigma}) \\ \hat{T} + \hat{V} &= \hat{T}_n + \hat{T}_e + \hat{V}_{ne} + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{nn}\end{aligned}\tag{2.1}$$

Для систем, включающих в себя большое количество электронов, аналитическое определение волновой функции становится невозможным. Альтернативным способом расчета являются численные методы, основанные на нескольких базовых приближениях и позволяющие получать волновую функцию с точностью, достаточной для корректного определения интересующих нас свойств системы.

Первым является приближение Борна-Оппенгеймера [?], заключающиеся в разделении движения легких электронов и тяжелых ядер. Рассматривая систему, как единую движущуюся в пространстве конструкцию, можно сделать предположение о схожести порядков импульсов между электронами и ядрами. В то же время их массы отличаются минимум на три порядка, что дает основание рассматривать ядра неподвижными относительно электронов. Это выражается в выделении из полного гамильтониана электронной части и формирования соответствующего уравнения Шредингера 2.2, называемого электронным. Здесь набор координат атомов $\mathbf{R}$ становится фиксированным

параметром, варьируя который можно находить электронную структуры системы в различных положениях атомного остова. Получаемая при этом зависимость $E(\mathbf{R})$ называется поверхностью потенциальной энергии (ППЭ).

$$\begin{aligned}\hat{H}_e \psi_e(\mathbf{r}, \boldsymbol{\sigma} | \mathbf{R}) &= E_e(\mathbf{R}) \psi_e(\mathbf{r}, \boldsymbol{\sigma} | \mathbf{R}) \\ \hat{H} &= \hat{T}_e + \hat{V}_{ne} + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{nn}\end{aligned}\tag{2.2}$$

Таким образом задача сводится к расчету многоэлектронной волновой функции ψ_e (далее для краткости называемой электронной). Связь с полной волновой функцией ψ системы состоит в использовании полученных ψ_e в качестве ортонормированного базиса 2.3, где коэффициенты линейного разложения $\chi_k(\mathbf{R})$ получаются из уравнения ниже. Здесь энергия E соответствует уже полной энергии системы и не зависит от $\mathbf{R}$, то есть отражает уровни энергии системы, используемые при расчете статистической суммы.

$$\begin{aligned}\psi &= \sum_{k=0}^{\infty} \chi_k(\mathbf{R}) \psi_{e,k}(\mathbf{r} | \mathbf{R}) \\ \left[\hat{T}_n + E_m(\mathbf{R}) \right] \chi_m + \langle \psi_{e,m} | \hat{T}_n | \psi_{e,m} \rangle \chi_m &= E \chi_m\end{aligned}\tag{2.3}$$

Возвращаясь к электронному уравнению Шредингера, при раскрытии энергетических операторов мы получаем систему дифференциальных уравнений, решение которой возможно методом рядов Фурье. Выбор базиса для разложения электронной волновой функции ψ_e является предметом второго приближения.

В начале вводится набор функций молекулярных спин-орбиталей (МО) $\{\phi_i(\mathbf{r}_j, \sigma_j)\}_{i=1}^{i=M}$, где каждая отражает некую i -ю возможную область пространства, занимаемую j -м электроном. Для гибкости их определяют через линейные комбинации фиксированного набора атомных орбиталей $\chi_{e,k}$ с варьируемыми коэффициентами c_k (здесь $\chi_{e,k}$ обычно задается комбинацией гауссиан). Выбрав из M спин-орбиталей N занятых электронами, мы можем построить набор всевозможных конфигурационных функций состояний $\{\Phi_I\}$. Так как здесь Φ_I представляет собой некоторую конфигурацию системы (фиксированное распределение электронов по молекулярным орбиталям), то можно искать итоговую электронную волновую функцию в пространстве всех таких конфигураций 2.4. Для соблюдения принципа Паули, а также правильной спиновой и пространственной симметрии удобно строить Φ_I через линейные комбинации детерминантов Слейтера.

$$\psi_e = \sum_{k=1}^L C_I \Phi_I, \quad \Phi_I = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{K=\sigma(k_1, \dots, k_N)} (-1)^p \phi_{k_1}(1) \dots \phi_{k_N}(N) \quad (2.4)$$

Тут непонятно, как лучше определить детерминант Слейтера

Если будет мало текста, здесь можно расписать уже теорию SCF и CI

Таким образом нахождение электронной волновой функции ψ_e в методах квантовой химии сводится к численному нахождению коэффициентов c_k и C_I , определяющих ψ_e как собственную волновую функцию электронного гамильтониана $\hat{H}_e$. Оба набора коэффициентов разложения подбираются вариационным методом, основанном на минимизации энергии системы. Для дальнейшего анализа полное пространство полученных молекулярных орбиталей целесообразно разделить на три непересекающиеся группы в соответствии с их характером заселенности:

1. остовные (core) - орбитали внутренних электронных оболочек, которые остаются дважды занятыми во всех конфигурациях;
2. виртуальные (virtual) - свободные орбитали, заселенность которых в исходном пространстве равна нулю;
3. активные (active) - орбитали, заселенность которых варьируется от 0 до 2 как в рамках многоконфигурационного разложения, так и при изменении межъядерного расстояния R.

Основным отличием методов квантовой химии является размерность пространства конфигурационных функций состояний $\{\Phi_I\}$, над которым строится электронная волновая функция ψ_e . Приближения, используемые различными методами для уменьшения этой размерности влияют на точность и их вычислительную сложность. В данной работе для расчета ППЭ соединений ArC и ArC^+ используется сочетание методов самосогласованного поля в полном активном пространстве и многоконфигурационного взаимодействия, являющихся более вычислительно затратными. Такое решение продиктовано сложностью орбитальной структуры исследуемых молекул и сильным влиянием электронной корреляции. Правильный учет последней играет критическую роль в корректном определении глубины энергетических ям для связанных состояний обоих карбидов.

2.2 Метод самосогласованного поля в полном активном пространстве

Ввести понятие статической корреляции, как CASSCF ее учитывает, из статьи взять настройку CAS

Одним из активно используемых в работе алгоритмов квантовой химии является метод самосогласованного поля в полном активном пространстве (complete active space self consistent field, CASSCF), он затрагивает первый из двух видов электронной корреляции - статический. Основная проблема статической корреляции заключается в правильном определении энергии состояния с несколькими ведущими конфигурационными функциями Φ_I . Ввиду того, что алгоритмы Хартри-Фока, теории возмущений и связанных кластеров исходят из предположения о единственной ведущей Φ_0 (берется минимальная размерность пространства $\{\Phi_I\}$), точный расчет энергии упомянутых состояний этими методами не представляется возможным. В то же время CASSCF является одним из наименее вычислительно затратных методов, решающих данную проблему.

Для этого электронная волновая функция ψ_e рассчитывается в пространстве подпространстве конфигурационных функций $\{\Phi_I\}^{\text{act}}$, порождаемое всевозможными перестановками внутри активного пространства. Такое ограниченное расширение позволяет одновременно избежать проклятия размерности (экспоненциального увеличения возможных Φ_I при рассмотрении большего числа молекулярных орбиталей) и при этом получить наиболее важные результаты многодетерминантного подхода.

Помимо учета статической корреляции таким важным результатом также является возможность оптимизации энергии для нескольких состояний системы, ввиду возможности $\{\Phi_I\}^{\text{act}}$ одновременно включать в себя ведущие функции нескольких состояний. Еще одним преимуществом является подбор молекулярных орбиталей c_k с учетом нескольких состояний в алгоритме самосогласованного поля, что также является выделяющейся чертой метода CASSCF. Определив теоретическую базу многоконфигурационного подхода, перейдем к описанию конкретных вычислительных параметров расчета CASSCF, использованных в настоящей работе.

Для обоих молекул при оптимизации орбиталей CASSCF глубоколежащие C(1s), Ar(1s), Ar(2s) и Ar(2p) были заморожены, тогда как занятые орбитали C(2s), C(2p) и Ar(3p) были выбраны в качестве активных орбиталей. Полученное пространство молекулярных орбиталей обозначается как случай CAS(9,7), каждая МО маркируется согласно атомной орбитали с наибольшим процентным вкладом на пределе диссоциации. Отдельно для ArC в пространство активных орбиталей была дополнительно включена C(3s).

Также в рамках расчетов ионизированного карбида аргона возникает трудность из-за различных ионизированных атомов в двух пределах диссоциации, что приводит

к различной диффузности связанных с каждым пределом молекулярных орбиталей. Эта проблема проявляется через появление вкладов более и менее диффузных атомных орбиталей в составах активных МО. Таким образом, выбранные орбитали должны одновременно описывать две различные физические ситуации, дополнительно усиливая проблему "компромиссных орбиталей". Для иллюстрации этой проблемы ниже показан нормированный состав орбитали C(2p) в системе ArC^+ при 6.4 Å для различных схем усреднения по состояниям:

1. Включение состояний, отвечающих пределу диссоциации $\text{Ar} - \text{C}^+$: C(2p) $\sim$ 0.58 C(1p), 0.78 C(2p), 0.23 C(3p)
2. Включение состояний, отвечающих пределу диссоциации $\text{Ar}^+ - \text{C}$: C(2p) $\sim$ 0.51 C(1p), 0.73 C(2p), 0.45 C(3p)

Для решения данной проблемы применялась процедура усреднения по состояниям (state averaged CASSCF, SA-CASSCF) со специальной схемой задания весовых коэффициентов, обеспечивающей равноправный вклад каждого асимптотического предела. Суммарные веса двух пределов были выбраны равными, при этом веса состояний внутри каждого предела распределялись равномерно. Корректность использованных весов проверялась путем сопоставления рассчитанных чисел заселенности молекулярных орбиталей (МО) с значениями заселенностей, полученных путем усреднения конфигураций различных пределов диссоциации между собой.

В случае обоих молекул активное пространство выбиралось с учетом основных и возбужденных состояний, которые необходимо рассмотреть. Выбранная стратегия позволила получить молекулярные орбитали, в равной степени хорошо описывающие все состояния. Вычисленный методом SA-CASSCF набор конфигурационных функций состояний также является хорошим приближением, но не учитывает более высокоэнергичные конфигурации молекул. Для дальнейшего уточнения результатов над построенным SA-CASSCF пространством молекулярных орбиталей проводится расчет методом MRACPF2a.

2.3 Многоференсный метод конфигурационного взаимодействия

Ввести понятие динамической корреляции, как MRACPF2a ее учитывает, SIZE CONSISTENT!

Следующий метод позволяет учесть влияние динамической корреляции на точность результатов. Данный эффект отражает кулоновское отталкивание электронов при их

взаимном сближении, что приводит к появлению локального минимума амплитуды волновой функции вблизи нулевого межэлектронного расстояния. Для описания данного эффекта приходится вводить большое число возбужденных конфигураций, которые с одной стороны позволяют учесть столкновения электронов через их возбуждение, а с другой расширяют пространство $\{\Phi_I\}$ в достаточной мере для правильной аппроксимации волновой функции в области малого межэлектронного расстояния.

Соответствующий учету данного эффекта метод называется конфигурационным взаимодействием (configuration interaction, CI). Включение в расчет всевозможных возбужденных конфигурационных функций состояния влечет экспоненциальный рост вычислительных затрат, полученная таким образом волновая функция считается точной (над отдельно выделенным пространством молекулярных орбиталей), а соответствующий метод FullCI является эталонным. Однако для сохранения разумного времени расчета с получением достаточной точности обычно ограничиваются одно- и двух- кратными возбуждениями ограниченного набора $\{\Phi_I\}^{\text{act}}$, определяемыми в CASSCF. Упрощенная подобным образом схема является вариантом многоореференсного метода конфигурационного взаимодействия (multireference configuration interaction, MRCI(SD)).

В данной работе используется дополненный метод MRCI(SD), модифицированный специально для соблюдения размерной экстенсивности. Проблема состоит в несоответствии полной энергии системы на пределе диссоциации и суммы энергий ее отдельных частей, а причиной служит отсутствие учета более высоких возбуждений. В модифицированной версии для включения данного эффекта вводится измененная нормировка функционала энергии 2.5. После разделения волновой функции на референсную и корреляционную части ($\psi = \psi_0 + \psi_c$, $\langle \psi_0 | \psi_c \rangle = 0$) последняя дополнительно делится на элемент внутренних возбуждений активного пространства ψ_a и оставшихся ψ_l . В отличие от метода MRCI имеющего коэффициенты нормировки $g_a = g_l = 1$, модифицированный метод определяет $g_c = \frac{2}{n}$. Построенный таким образом нормировочный знаменатель позволяет эффективно учесть эффекты несвязанных кластеров (unlinked-cluster effects). Полученная схема называется мультиреференсным методом усредненного функционала связанных пар (Averaged Coupled-Pair Functional, MRACPF) [2].

$$E_c[\Psi_c] := \frac{\langle \Psi_0 + \Psi_c | \hat{H} - E_0 | \Psi_0 + \Psi_c \rangle}{1 + g_a \langle \Psi_a | \Psi_a \rangle + g_e \langle \Psi_e | \Psi_e \rangle} \quad (2.5)$$

Итоговая схема расчета ППЭ для молекул ArC и ArC⁺ включает в себя получение пространства молекулярных орбиталей и референсных конфигурационных функций

методом SA-CASSCF, на основе которых проводится учет динамической корреляции численно улучшенным методом MRACPF2a.

2.4 Пакет Orca и получаемые результаты

Что есть Orca, из статьи взять все описание расчета: scan, itter, набор состояний

Практическая реализация вышеописанных квантово-химических методов и расчет потенциальных кривых исследуемой системы выполнялись с использованием современного программного комплекса Orca 6.1.0-f.0 [1]. Данный пакет оптимизирован для проведения высокоуровневых многоконфигурационных расчетов SA-CASSCF и MRACPF2a. Вместе с тем, для анализа полученных результатов (извлечение, обработка и визуализация массивов данных квантово-химического вывода) был разработан собственный программный скрипт на языке Python. При написании также использовался пакет Orca Python Interpreter [?], созданный той же командой для удобного управления расчетом и обработки данных.

Реализации методов CASSCF и MRACPF2a, доступные в пакете Orca [1], использовались совместно с расширенными корреляционно-согласованными базисными наборами aug-ss-pwCVnZ ($n=T, Q$). Все результаты были экстраполированы к пределу полного базисного набора aug-ss-pwCV ∞ Z (CBS). Для использования пространственной симметрии в расчетах симметрия $C_{\infty v}$ линейных соединений ArC и ArC⁺ была сопоставлена с ее абелевой подгруппой C_{2v} . Такое представление дает неприводимые представления A_1 , A_2 и пару B_1/B_2 . Эти представления служат метками симметрии, которые классифицируют электронные волновые функции согласно их отклику на операции редуцированной группы симметрии. При корреляции $C_{\infty v} \rightarrow C_{2v}$ состояния Σ^+ и Σ^- соответствуют A_1 и A_2 соответственно, тогда как состояния Π коррелируют с парой B_1/B_2 , а состояния Δ — с парой A_1/A_2 .

Расчеты для ArC⁺ были выполнены на радиальной сетке, состоящей из 60 точек от 1.4 до 4.4 Å и 10 дополнительных точек от 4.4 до 6.4 Å. Итоговый набор состояний, разделенных по неприводимым представлениям, выглядит следующим образом; здесь целое число перед меткой неприводимого представления обозначает число состояний этой симметрии, включенных в расчет:

1. Ar($3s^2 3p^6$; 1S) – C($2s^2 2p^1$; 2P): $1A_1$, $1B_1$, $1B_2$ для дублета
2. Ar⁺($3s^2 3p^5$; 2P) – C($2s^2 2p^2$; 3P): $2A_1$, $3A_2$, $2B_1$, $2B_2$ для дублета и квартета

Аналогичные вычисления были проделаны для нейтральной молекулы ArC. Ввиду крайне слабой связанности этого соединения включение высоко возбужденных состояний является необходимым условием правильного определения термодинамических функций. В рамках SA-CASSCF/MRACPF2a расчета на сетке межъядерных расстояний, включающей 30 точек в диапазоне 1.4–3.4 Å и 4 точки в интервале 3.4–4.4 Å, было получено 18 состояний различных пределов диссоциации:

1. $\text{Ar} (^1S_g) - \text{C} (^3P_g; 2s^2 2p^2)$: $1A_2, 1B_1, 1B_2$ для триплета
2. $\text{Ar} (^1S_g) - \text{C} (^1D_g; 2s^2 2p^2)$: $2A_1, 1A_2, 1B_1, 1B_2$ для синглета
3. $\text{Ar} (^1S_g) - \text{C} (^1S_g; 2s^2 2p^2)$: $1A_1$ для синглета
4. $\text{Ar} (^1S_g) - \text{C} (^5S_u; 2s^1 2p^3)$: $1A_2$ для квинтета
5. $\text{Ar} (^1S_g) - \text{C} (^3P_u; 2s^2 2p^1 3s^1)$: $1A_1, 1B_1, 1B_2$ для триплета
6. $\text{Ar} (^1S_g) - \text{C} (^3D_u; 2s^2 2p^1 3d^1)$: $1A_1, 2A_2, 1B_1, 1B_2$ для триплета

Порядковый номер электронного состояния конкретной мультиплетности и пространственной симметрии (терма) будем обозначать цифрой в скобках, указываемой перед его символом. Несмотря на то, что лишь некоторые из этих состояний имеют потенциальные ямы, критически важные для последующего расчета термодинамических функций, включение всего набора состояний в процедуру усреднения необходимо. Такой подход позволяет предотвратить искусственное нарушение пространственной симметрии волновой функции и обеспечить корректные (физически адекватные) числа заселенности молекулярных орбиталей в активном пространстве

Все расчеты выполнялись в режиме сканирования поверхности потенциальной энергии в направлении уменьшения межъядерного расстояния. Молекулярные орбитали из ранее рассчитанной точки повторно использовались в качестве начального приближения. Такой подход позволяет избежать перестановки молекулярных орбиталей внутри активного пространства и упрощает использование данных неприводимых представлений для построения пространства активных орбиталей. Результаты, полученные с использованием базисных наборов aug-cc-pwCVnZ ($n=T, Q$), были поточечно экстраполированы к пределу CBS с использованием формулы Хельгакера ($\sim n^{-3}$) [3].

3 Расчет термодинамических функций

3.1 Энергетический спектр состояний

Расчет термодинамических функций проводится через стандартные уравнения статистической физики с включением стат. суммы, получение которой подразумевает наличие данных об уровнях энергии молекулы. Переход от полученных на квантово-механическом уровне потенциальных кривых к полному набору вращательно-колебательных уровней энергии данных молекулы в двухатомном уровне может быть проведен итерационным методом Нумерова [?]. Волновая функция ψ раскладывается на угловую части и радиальную, последняя находится из решения радиального уравнения Шредингера 3.6, включающего радиальную зависимость ППЭ $U(R)$. Высокоэффективным подходом к дискретизации данного дифференциального уравнения второго порядка является схема Нумерова.

$$\begin{aligned}\Psi &= R^{-1}P(R)Y_{JLM}(\Theta, \Phi, \phi) \\ \frac{d^2 P(r)}{dR^2} &= (U(R) - E)P(R)\end{aligned}\tag{3.6}$$

При использовании сетки h ($R_i = ih$), уравнение Шрёдингера преобразуется к системе трехточечных разностных уравнений вида 3.7 (h - постоянная Планка). Схема нахождения дискретных уровней энергии связанных состояний ($E < U(\infty)$) сводится к решению нелинейной задачи на собственные значения через процедуру сшивания. Выбрав начальное приближение для энергии E , проводят независимое численное интегрирование уравнения наружу от малых и внутрь от больших межъядерных расстояний, заканчивая процедуру в некоторой точки сшивания R_m . Процедура сходится до момента совпадения волновых функций $P_m^{\text{out}} = P_m^{\text{in}} = 1$. Поправка к пробному значению энергии $D(E) = E_{\text{new}} - E_{\text{old}}$ рассчитывается из выражения 3.8, завершая процедуру при достижении критерия сходимости $D(E) < \varepsilon$.

$$\begin{aligned}Y_{i+1} + Y_{i-1} - 2Y_i &= h^2 (U_i - E) P_i \\ Y_i &= P_i - \frac{h^2}{12} P_i^{(2)} = \left[1 - \frac{h^2}{12} (U_i - E) \right] P_i\end{aligned}\tag{3.7}$$

$$D(E) = \frac{(-Y_{m-1} + 2Y_m - Y_{m+1}) h^{-2} + (U_m - E) P_m}{\sum_{i=1}^n P_i^2}\tag{3.8}$$

Результатом работы алгоритма для некоторой заданной ППЭ является набор вращательно-колебательных уровней энергии, соответствующий данной потенциальной

кривой. Проводя данную процедуру независимо для всех полученных ППЭ соединений ArC и ArC^+ , мы можем получить набор значимых уровней энергии для данных молекул. В дальнейшем ввиду развития вычислительных технологий расчет статистической суммы прямым суммированием по полученному набору уровней не является проблемой.

Тут про метод Нумерова подергать со статей + программу LEVEL и BetaFIT

3.2 Статистическая сумма и термодинамические потенциалы

База с великой книги

Для начала введем несколько приближений, работая в которых мы рассчитываем приближенно описать термодинамические функции вещества в области анализатора масс спектрометра с индуктивно связанной плазмой. Плазма ArC и ArC^+ считается идеальным газом при атмосферном давлении, что в формулах отмечается знаком $^\circ$ после термодинамических функций. В области ионизации вещество равномерно распределено в объеме и выполняются условия локального термодинамического равновесия. Далее будет обсуждаться метод расчета статистической суммы Q , энтропии S° , прироста энтальпии $\Delta H^\circ = H^\circ(T) - H^\circ(0)$, изобарной теплоемкости C_p° , а также энергии Гиббса Φ° , определяемой следующим выражением:

$$\Phi^\circ(T) = S^\circ(T) - \frac{H^\circ(T) - H^\circ(0)}{T} \quad (3.9)$$

Ввиду разложения энергии состояний на части связанные с ее поступательным и внутримолекулярным движением можно ввести такое же разделение для статистической суммы и термодинамических функций. Получения полной функции производится путем перемножения в случае стат. суммы Q или сложения для термодинамических функций. Расчет поступательных частей Q , ΔH° , C_p° и Φ° не задействует данных о электронной конфигурации молекулы и следует напрямую из макроскопических свойств газа ???. Здесь k – постоянная Больцмана, R – универсальная газовая постоянная, h – постоянная Планка, P – давление газа, M – молярный вес газа, N – число молекул вещества.

$$\begin{aligned}
Q_{\text{tr}}(T) &= \left(\frac{2\pi M k T}{N h^2} \right)^{3/2} \frac{RT}{p}, \\
\frac{\Phi_{\text{tr}}^o(T)}{R} &= 2,5 \ln T + 1,5 \ln M - 3,66487 \\
\frac{[H^o(T) - H^o(0)]_{\text{tr}}}{RT} &= 2,5 \\
\frac{[C_p^o(T)]_{\text{tr}}}{R} &= 2,5
\end{aligned} \tag{3.10}$$

Внутренняя часть статистической суммы представляет собой сумму по полному набору вращательно-колебательных уровней энергии, каждый из которых определяется колебательным числом v , вращательным числом J и состоянием молекулы i . Также определив стат. вес $p(i, J) = (2J + 1)c$, где c является целым числом зависящим от типа молекулярного состояния i , можем представить внутреннюю часть стат. суммы и ее дополненных производные следующим образом:

$$\begin{aligned}
Q_{\text{int}} &= \sum_{v, J, i} p_{J, i} \exp \left(-\frac{\varepsilon_{v, J, i}}{kT} \right) \\
\bar{Q}_{\text{int}} &= T \frac{\partial Q_{\text{int}}}{\partial T} = \sum_{v, J, i} p_{J, i} \left(-\frac{\varepsilon_{v, J, i}}{kT} \right) \exp \left(-\frac{\varepsilon_{v, J, i}}{kT} \right) \\
\bar{\bar{Q}}_{\text{int}} &= T^2 \frac{\partial^2 Q_{\text{int}}}{\partial T^2} = \sum_{v, J, i} p_{J, i} \left(-\frac{\varepsilon_{v, J, i}}{kT} \right)^2 \exp \left(-\frac{\varepsilon_{v, J, i}}{kT} \right)
\end{aligned} \tag{3.11}$$

Нахождение температурной зависимости внутренних частей термодинамических функций сводится к применению стандартных выражений статистической физики 3.12. Энтропия S^o вычисляется из полученных термодинамических функций по выражению 3.13

$$\begin{aligned}
Q_{\text{int}} &= \sum_{v, J, i} p_{J, i} \exp \left(-\frac{\varepsilon_{v, J, i}}{kT} \right) \\
\bar{Q}_{\text{int}} &= T \frac{\partial Q_{\text{int}}}{\partial T} = \sum_{v, J, i} p_{J, i} \left(-\frac{\varepsilon_{v, J, i}}{kT} \right) \exp \left(-\frac{\varepsilon_{v, J, i}}{kT} \right) \\
\bar{\bar{Q}}_{\text{int}} &= T^2 \frac{\partial^2 Q_{\text{int}}}{\partial T^2} = \sum_{v, J, i} p_{J, i} \left(-\frac{\varepsilon_{v, J, i}}{kT} \right)^2 \exp \left(-\frac{\varepsilon_{v, J, i}}{kT} \right)
\end{aligned} \tag{3.12}$$

$$\frac{S^o(T)}{R} = \frac{\Phi^o(T)}{R} + \frac{H^o(T) - H^o(0)}{RT} \tag{3.13}$$

3.3 Веб-приложение GasThermo для расчета ТД-потенциалов

Зачем разработали, основные параметры и устройство приложения, картинки модулей LEVEL + ТД

Как было показано в предыдущей главе, при наличии данных о ППЭ связанных состояний двухатомной молекулы, полученных экспериментально или методами квантовой химии, расчет температурных зависимостей термодинамических функций может быть проведен в рамках единого алгоритма. Несмотря на присутствие в схеме объемных вычислений стат. суммы и ее дополненных производных прямым суммированием, развитие вычислительных возможностей современных компьютеров позволило преодолеть данный барьер, что способствовало развитию программ посвященных реализации данной вычислительной схемы.

Для дальнейшего совершенствования возможностей подобных программ, а также с целью воспользоваться преимуществами современных реляционных баз данных и архитектурной гибкости веб-пространства в рамках данной работы было разработано веб-приложение GasThermo [?] для расчета термодинамических функций двухатомных газов. С его помощью были получены приближенные ТД-потенциалы для AgC и AgC^+ в условиях масс спектрометрии с использованием индуктивно связанной плазмы. Далее рассмотрим реализацию их получения.

4 Расчет термодинамических функций ArC^+

Ctrl+C, Ctrl+V

4.1 Результаты расчетов потенциальных кривых

Межатомные потенциалы обоих пределов диссоциации показаны на Рисунке 1 с разделением по мультиплетности. Разность энергий 4.295 eV между двумя пределами и значительные потенциальные ямы возбужденных состояний указывают на заметное влияние на термодинамические функции при более высоких температурах. Также отметим, что потенциальные ямы двух наиболее высоких слабосвязанных состояний, $(1)^2\Delta$ и $(2)^2\Sigma^+$, возникают из-за избегаемых пересечений с состояниями из другого предела диссоциации.

Поведение каждого состояния определяется его доминирующей конфигурационной функцией состояния, которая коррелирует с определенной орбитальной заселенностью. В нескольких случаях имеются две ведущие конфигурации, взаимно симметричные относительно заселенностей орбиталей p_x и p_y . Краткий анализ этих заселенностей дает представление о происхождении поведения отдельных состояний. Отметим, что во всех случаях присутствует дважды занятая орбиталь C(2s), тогда как пары орбиталей p_x , p_y и p_z Ar и C сонаправлены.

Для первого предела диссоциации интерпретация является прямолинейной. Как отмечено в [7], молекулярное взаимодействие можно описать как притяжение электронного облака аргона ионизированным углеродом. Поэтому электронная плотность занятой орбитали C($2p_z$) в состоянии $^2\Sigma^+$ противодействует этому взаимодействию, тогда как заселение орбиталей C($2p_x$) и C($2p_y$) в состоянии $^2\Pi$ влияет на него слабее, приводя к более выраженной потенциальной яме. Аналогичная интерпретация может быть применена ко второму пределу: один отсутствующий электрон уменьшает экранирование заряда ядра аргона. В случаях с однократно занятой орбиталью Ar($3p_z$) взаимодействие между зарядом ядра аргона и электронной плотностью углерода является наиболее сильным. Поэтому результирующие состояния $(1)^4\Sigma^-$ и $(1)^4\Pi$ имеют наиболее глубокие потенциальные ямы. Для $(1)^4\Sigma^-$ этот эффект дополнительно усиливается пустой орбиталью C($2p_z$).

Другой интересный подслучай заселенности соответствует максимальному числу электронов на функциях p_z , с дважды занятой орбиталью Ar($3p_z$) и одним электроном на C($2p_z$). Различные перестройки оставшихся электронов формируют множество

энергетически близких состояний: 2^2A_1 , 2^2A_2 , 2^4A_1 и 2^4A_2 , за которыми близко следует оставшееся слабосвязанное состояние $(2)^2\Pi$. В этой нотации первое целое число обозначает номер состояния в рамках данной симметрии, тогда как верхний индекс обозначает спиновую мультиплетность. Каждое из этих состояний имеет мелкую яму приблизительно $800\text{--}1000\text{ cm}^{-1}$. Хотя окончательное физическое отнесение и точное обозначение этих состояний остаются сложными, их совокупное влияние на термодинамические функции не позволяет исключить их из обсуждения. Поэтому в этой работе мы обозначаем их согласно вырожденным или близлежащим парам, которые они образуют в интервале расстояний $2.5\text{--}5\text{ \AA}$, охватывающем область их потенциальных ям: $^4\Delta_1$ и $^4\Delta_2$, образованные парами A_1/A_2 , а также отдельные близлежащие пары $^2\Sigma^+/^2\Sigma^+$ и $^2\Sigma^-/^2\Sigma^-$. Для ясности эти состояния показаны отдельно на дополнительной панели Рисунка 1 и промаркированы согласно нашим обозначениям. При дальнейшем уменьшении межатомного расстояния три из этих состояний превращаются в отдельные состояния $(1)^2\Delta$ и $(2)^2\Sigma^+$ и образуют дополнительные ямы вследствие избегаемых пересечений.

4.2 Сравнение с предыдущими работами

В этом разделе мы сравниваем настоящие результаты с предыдущими теоретическими исследованиями и с экспериментальными данными из [8]. Спектроскопические постоянные D_e и r_e были получены из ЕМО-аппроксимации наших потенциальных кривых и затем использованы совместно с двумя низшими уровнями рассчитанного ровибронного спектра для получения ω_e , $\omega_e x_e$, B_e и α_e . Все параметры потенциалов приведены в Таблице 1 и отсортированы по состояниям.

Для трех низших состояний ArC^+ наши результаты показывают хорошее согласие по большинству параметров с потенциалом из [8], который был восстановлен инверсией данных рассеяния. Значение D_e немного выше, но все еще находится в пределах приведенной экспериментальной неопределенности 10%. Для потенциалов *ab initio* подробное сравнение предыдущих результатов было приведено в [7], где общей тенденцией было последовательное углубление ямы при использовании все более продвинутых методов. Поэтому настоящее сравнение мы ограничиваем результатами, полученными с использованием методов *coupled-cluster* и *configuration-interaction*. Общее согласие между имеющимися результатами снова очевидно.

Для второго предела диссоциации единственными доступными данными, которые




Figure 1: Кривые межатомных потенциалов ArC^+ без спин-орбитального и спин-спинового расщепления.

Сильно связанные состояния для ясности показаны сплошными подписанными линиями; остальные состояния показаны пунктиром. Дополнительная панель показывает слабосвязанные состояния $^2\Pi$, $^4\Delta_1$, $^4\Delta_2$, $^2\Sigma^+ / ^2\Sigma^+$ и $^2\Sigma^- / ^2\Sigma^-$.

мы нашли, являются расчеты POL-CI из [8] для состояний $(1)^4\Sigma^-$ и $(1)^4\Pi$, где использовался сжатый базис 7s5p1d для аргона и базис 5s3p1d для углерода. Как и ожидалось, расчеты на основе семейства aug-cc-pwCVnZ дают более глубокие ямы и другие спектроскопические постоянные. Мы также сообщаем о семи ранее не опубликованных потенциальных ямах: пяти, связанных со слабосвязанными парами $^2\Pi$, $^4\Delta_1$, $^4\Delta_2$, $^2\Sigma^+ / ^2\Sigma^+$ и $^2\Sigma^- / ^2\Sigma^-$ на больших расстояниях, и еще двух, связанных с теми же состояниями, образующими отдельные ямы избегаемых пересечений $(1)^2\Delta$ и $(2)^2\Sigma^+$ на меньших расстояниях.

4.3 Термодинамические функции

Для расчета термодинамических функций мы использовали кривые потенциальной энергии всех связанных состояний. Взаимодействие с программами обработки LEVEL

	r_e , Å	D_e , cm ⁻¹	T_e , cm ⁻¹	ω_e , cm ⁻¹	$\omega_e x_e$, cm ⁻¹	B_e , cm ⁻¹	α_e , cm ⁻¹	источник
$X^2\Pi$	2.017	8115.5	-	415.8	5.33	0.449	7.11	Настоящая работа
	1.995	7570.0		417.0	6.00	0.515	9.20	[8], Рассеяние
	1.996	7982.2		413.2	4.17	0.458	6.21	[7], RCCSD(T)/ ∞Z
	1.999	8024.9		413.1				[7], MRCI/QZ
	2.000	9520.0		485.0	6.50	0.511	8.30	[8], Pol-CI
	2.004	8100.0						[9], CCSD(T)/DZ
$(1)^2\Sigma^+$	3.030	870.2	7232.8	125.0	4.49	0.199	7.12	Настоящая работа
	2.997	1006.2		120.9				[7], MRCI
	3.009	901.5		115.8				[7], RCCSD(T)/ ∞Z
$(1)^4\Sigma^-$	1.721	20063.1	23196.4	730.8	6.65	0.617	7.13	Настоящая работа
	1.762	16502.8		777.00	9.10	0.644	8.80	[8], Pol-CI
$(1)^4\Pi$	2.443	4414.8	38430.1	296.9	4.99	0.306	5.75	Настоящая работа
	2.548	2855.2		234	5.00	0.315	7.60	[8], Pol-CI
4D_1	3.200	1011.5	41846.3	120.9	3.61	0.178	5.53	Настоящая работа
4D_2	3.326	996.0	41859.9	125.7	3.96	0.165	5.08	Настоящая работа
$^2\Sigma^+ / ^2\Sigma^+$	3.350	858.3	41924.5	89.5	2.33	0.163	4.95	Настоящая работа
$^2\Sigma^- / ^2\Sigma^-$	3.350	843.0	42012.5	88.2	2.31	0.163	4.98	Настоящая работа
$(2)^2\Pi$	3.734	702.9	42065.0	79.4	2.24	0.131	4.07	Настоящая работа
$(1)^2\Delta$	1.701	6242.1	46375.7	709.2	20.14	0.631	15.67	Настоящая работа
$(2)^2\Sigma^+$	1.711	1604.9	56806.1	753.5	88.45	0.624	33.81	Настоящая работа

Table 1: Спектроскопические постоянные потенциалов ArC^+

[6] и BetaFit [5] осуществлялось через разработанное в этой работе web-приложение.

Ровибронные энергетические спектры всех рассмотренных состояний были объединены для получения итоговых результатов, представленных сплошными линиями на Рисунке 2.

Мы также подчеркиваем важность включения энергетических уровней возбужденных состояний в температурную зависимость статистической суммы при высоких температурах. Чтобы проиллюстрировать этот момент, несколько дополнительных кривых термодинамических функций нанесены пунктирными линиями. Самая нижняя кривая соответствует случаю, в котором рассматривается только основное состояние, тогда как каждая следующая более высокая кривая включает энергетические уровни дополнительного возбужденного состояния в расчет статистической суммы. Самая высокая кривая соответствует включению всех рассмотренных связанных состояний.

График показывает, что при температурах выше 5000 K возбужденные состояния начинают играть существенную роль в корректном описании термодинамических потенциалов. Поскольку температура ИСР обычно не превышает 10000 K, графики

ограничены этим диапазоном. Кроме того, табличные данные для всех термодинамических функций в температурном диапазоне 298.15 – 20000 K представлены в Таблице 2 вместе с коэффициентами полиномиальной аппроксимации в Таблице 3. Эта аппроксимация используется стандартными информационными системами, такими как IVTANTHERMO [10, 11] и NIST [12], и записывается как ($X = T/10000$):

$$\begin{aligned}\Phi^\circ(T) &= \phi_1 + \phi_2 \ln X + \phi_3 X^{-2} + \phi_4 X^{-1} + \phi_5 X + \phi_6 X^2 + \phi_7 X^3; \\ C_p^\circ(T) &= \phi_2 + 2\phi_3 X^{-2} + 2\phi_5 X + 6\phi_6 X^2 + 12\phi_7 X^3.\end{aligned}\quad (4.14)$$




Figure 2: Термодинамические функции ArC^+ при 298.15 – 10000 K

Пунктирные линии представляют температурные зависимости, рассчитанные с различным числом учитываемых состояний, каждая из которых подписана последним состоянием, добавленным в набор. Самая нижняя пунктирная линия соответствует использованию только основного состояния, тогда как самая верхняя сплошная линия соответствует включению всех связанных состояний, доступных из расчетов CASSCF/MRACPF2a.

5 Расчет термодинамических функций ArC

5.1 Результаты расчета и сравнение потенциальных кривых

5.2 Термодинамические функции

Ctrl+C, Ctrl+V x2

6 Заключение

Межатомные потенциалы для двух пределов диссоциации были рассчитаны на уровне теории CASSCF/MRACPF2a. Спектроскопические постоянные, полученные для состояний $X^2\Pi$ и $(1)^2\Sigma^+$, хорошо согласуются с доступными теоретическими и экспериментальными результатами. Это указывает на то, что вновь полученные кривые для $(1)^2\Delta$ и $(2)^2\Sigma^+$, а также потенциальные ямы $^2\Sigma^+/^2\Sigma^+$, $^2\Sigma^-/^2\Sigma^-$, $^4\Delta_1$ и $^4\Delta_2$, определенные в диапазоне от 2.5 до 5 Å, были получены с аналогичной точностью.

С использованием этих данных были получены термодинамические функции для интервала 298.15 – 20000 К. Сравнение температурных зависимостей, рассчитанных с различным числом включенных состояний, указывает на значительное влияние высоковозбужденных состояний на результаты, особенно при более высоких температурах, типичных для масс-спектрометрии с ICP. Следовательно, точное определение термодинамических функций в температурном диапазоне 5000 – 6500 К требует включения спектров энергетических уровней по крайней мере четырех низколежащих состояний, тогда как расчеты при 6500 К и выше требуют всех 21 состояний двух пределов диссоциации ArC^+ .

Приложение

Здесь необходимо написать приложение, которое вы должны придумать самостоятельно.

References

- [1] *Neese, Frank*. The ORCA program system / Frank Neese. — Vol. 2, no. 1. — Pp. 73–78. <https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wcms.81>.
- [2] *Gdanitz, Robert J*. The averaged coupled-pair functional (ACPF): A size-extensive modification of MR CI(SD) / Robert J. Gdanitz, Reinhart Ahlrichs // *Chemical Physics Letters*. — 1988. — Vol. 143, no. 5. — Pp. 413–420.
- [3] Basis-set convergence of correlated calculations on water / Trygve Helgaker, Wim Klopper, Henrik Koch, Jozef Noga // *The Journal of Chemical Physics*. — 1997. — Vol. 106, no. 23. — Pp. 9639–9646.
- [4] Ab initio calculations of the interaction potentials and thermodynamic functions for ArN and ArN^+ / Maxim A. Maltsev, Svetlana A. Aksenova, Igor V. Morozov et al. — Vol. 44, no. 12. — Pp. 1189–1198. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcc.27078>.
- [5] *Le Roy, Robert J*. betaFIT: A computer program to fit pointwise potentials to selected analytic functions / Robert J. Le Roy, Asen Pashov. — Vol. 186. — Pp. 210–220. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022407316300966>.
- [6] *Le Roy, Robert J*. LEVEL: A computer program for solving the radial Schrödinger equation for bound and quasibound levels / Robert J. Le Roy. — Vol. 186. — Pp. 167–178. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022407316300978>.
- [7] Interactions of C^+ (2P_J) with rare gas atoms: incipient chemical interactions, potentials and transport coefficients / William D. Tuttle, Rebecca L. Thornton, Larry A. Viehland et al. — Vol. 376, no. 2115. — P. 20170156. <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2017.0156>.
- [8] The potential energy curves of ArC^+ / I. H. Hillier, M. F. Guest, A. Ding et al. — Vol. 70, no. 2. — Pp. 864–869. <https://pubs.aip.org/jcp/article/70/2/864/88906/The-potential-energy-curves-of-ArC>.
- [9] Binding energies and structures of $\text{C}+\text{Ar}$ ($n=1-5$), clusters from first principles / G.E. Froudakis, G.S. Fanourgakis, S.C. Farantos, S.S. Xantheas. — Vol.

- 294, no. 1. — Pp. 109–116. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0009261498008446>.
- [10] *Gurvich, L. V.* Thermodynamic properties of individual substances / L.V. Gurvich, I.V. Veyts, C.B. Alcock. — Hemisphere Publishing Corp., 1989. — Vol. 1. — Pp. 1–664.
- [11] *Belov, Gleb V.* IVTANTHERMO for Windows—database on thermodynamic properties and related software / Gleb V Belov, Vladimir S Iorish, Vladimir S Yungman // *Calphad*. — 1999. — Vol. 23, no. 2. — Pp. 173–180.
- [12] *Linstrom, Peter J.* The NIST Chemistry WebBook: A chemical data resource on the internet / Peter J Linstrom, William G Mallard // *J. Chem. Eng. Data*. — 2001. — Vol. 46, no. 5. — Pp. 1059–1063.
- [13] *Maltsev, MA.* Thermodynamic Properties of ArH^+ and ArH / MA Maltsev, IV Morozov, EL Osina // *High Temp*. — 2019. — Vol. 57, no. 3. — Pp. 335–337.
- [14] *Maltsev, MA.* Thermodynamic Functions of ArO and ArO^+ / MA Maltsev, IV Morozov, EL Osina // *High Temp*. — 2020. — Vol. 58, no. 2. — Pp. 184–189.
- [15] *Maltsev, MA.* Thermodynamic Properties of Ar_2^+ and Ar_2 Argon Dimers / MA Maltsev, IV Morozov, EL Osina // *High Temp*. — 2019. — Vol. 57, no. 1. — Pp. 37–40.
- [16] Thermodynamic Simulation of the Composition of the Major Background Ions in Low-Temperature (“Cold”) Inductively Coupled Plasma / A. A. Pupyshev, P. V. Zaitceva, M. Yu. Burylin et al. — Vol. 79, no. 8. — Pp. 1038–1048. <https://link.springer.com/10.1134/S1061934824700424>.
- [17] *Ivanic, Joseph.* Direct configuration interaction and multiconfigurational self-consistent-field method for multiple active spaces with variable occupations. I. Method / Joseph Ivanic. — Vol. 119, no. 18. — Pp. 9364–9376. <https://pubs.aip.org/jcp/article/119/18/9364/446614/Direct-configuration-interaction-and>.

T, K	C_P° , J/(mol·K)	Φ° , J/(mol·K)	S° , J/(mol·K)	ΔH° , 10^4 J/mol
300	36.10	198.8	231.3	0.98
400	36.91	208.3	241.8	1.34
500	37.41	215.9	250.1	1.71
600	37.79	222.2	257.0	2.09
700	38.14	227.6	262.8	2.47
800	38.49	232.3	268.0	2.85
900	38.88	236.6	272.6	3.24
1000	39.31	240.4	276.7	3.63
1200	40.18	247.1	284.0	4.42
1400	40.77	252.8	290.2	5.24
1600	40.80	257.8	295.7	6.05
1800	40.24	262.3	300.4	6.86
2000	39.20	266.3	304.6	7.66
3000	32.31	281.7	319.2	11.24
4000	27.62	292.2	327.7	14.20
5000	25.25	299.9	333.6	16.82
6000	24.17	305.9	338.1	19.29
7000	23.90	310.8	341.8	21.69
7500	23.98	312.9	343.4	22.88
8000	24.16	314.9	345.0	24.09
9000	24.75	318.4	347.9	26.53
10000	25.52	321.5	350.5	29.04
11000	26.35	324.2	353.0	31.64
12000	27.13	326.7	355.3	34.31
13000	27.83	329.0	357.5	37.06
14000	28.38	331.2	359.6	39.87
15000	28.79	333.1	361.6	42.73
16000	29.06	335.0	363.5	45.63
17000	29.20	336.7	365.2	48.54
18000	29.23	338.3	366.9	51.46
19000	29.15	339.9	368.5	54.36
20000	29.01	341.3	370.0	57.26

Table 2: Термодинамические функции ArC^+ для температурного диапазона 298.15 – 20000 K

T, K	ϕ_1	ϕ_2	ϕ_3	ϕ_4	ϕ_5	ϕ_6	ϕ_7
300.0 – 827.1	319.45	35.98	-0.0005	0.1617	29.46	-104.79	323.9026
827.1 – 1354.2	360.76	50.11	-0.0045	0.6896	-158.41	516.41	-767.5688
1354.2 – 2078.9	164.26	-32.49	0.0652	-4.6618	481.38	-725.81	521.5462
2078.9 – 3133.1	449.69	117.27	-0.2616	10.9288	-242.73	155.19	-53.6117
3133.1 – 4582.6	386.72	72.23	0.0037	3.1831	-112.42	61.40	-17.8078
4582.6 – 8404.0	342.02	34.45	0.3507	-4.9029	-23.98	9.57	-1.5889
8404.0 – 12093.6	330.88	7.65	1.4813	-17.2258	5.07	1.73	-0.4673
12093.6 – 18155.2	322.27	-33.53	4.1216	-40.5415	41.45	-6.31	0.4799
18155.2 – 20000.0	311.46	16.17	-3.4308	2.6726	12.73	-2.14	0.1570

Table 3: Полиномиальные коэффициенты для аппроксимации термодинамических функций ArC^+ в температурном диапазоне 298.15 – 20000 K