

상 분 학

상분벡터 계산과

그래프 작성법

정본 · 개정판

개요

상분학은 한 점에서 정의되는 기하 구조와, 그 점을 중심으로 생성되는 벡터 관계를 단계적으로 해석하는 기하·벡터 방법론이다.

접선, 법선, 투영, 회전, 벡터합 등 점에서 출발하는 기하 과정이 서로 연결되며, 그 결과 하나의 벡터 구조가 형성되는 과정을 도형 기반의 직관적 해석으로 탐구한다.

상분벡터는 접선·투영 구조에서 생성되는 직선 기하 성분과, 원·회전 구조에서 생성되는 회전 기하 성분이 결합된 이중 구조 벡터이다.

전제

직선·곡선 위의 한 점에서 벡터를 계산한다.

- 이하 구성은 퇴화하지 않는 일반 위치를 전제한다.

- 교점이 정의되지 않는 특수 경우는 별도 규칙으로 정의한다.

Z1 계산법

| 기본 설정

- 기울기 : a
- 원점 : $O(0, 0)$
- 접선 : $y = ax + b$
- 점 : $A(x, ax + b)$

| 기본 투영과 교점

- **A1** — 원점 O 에서 접선에 내린 수선의 발
- **A2** — 원점 O 에서 A 에서의 법선에 내린 수선의 발
- **A3a** — A 에서의 법선이 x 축과 만나는 점
 $A3a' = (A3a\text{의 } x\text{좌표}, A1\text{의 } y\text{좌표})$
- **A3b** — A 에서의 법선이 y 축과 만나는 점
 $A3b' = (A1\text{의 } x\text{좌표}, A3b\text{의 } y\text{좌표})$
- **A3c** — $A3a$ 에서의 수직선과 접선의 교점

- **A3d** — A3b에서의 수평선과 접선의 교점

| 원점 기준 수선의 발

- **A4a** — 직선 OA3c와 AA3a'의 교차점
- **A4b** — 직선 OA3d와 AA3b'의 교차점

| A6의 구성 (벡터합)

- **A5a** — A2를 지나며 직선 A1A2에 수직인 직선(1)과 A1A4a의 연장선과의 교점
- **A5b** — 직선(1)과 A1A4b의 연장선과의 교점

$$A1A6 = A1A5a + A1A5b$$

| 원(1)과 주요 점

- **원(1)** — 중심 A1, 반지름 $|A1A|$
- **A7** — 원점 O에서 A1 방향으로 뻗는 직선이 A1을 지나 원(1)과 만나는 점

- **A8** — 점 A를 지나며 벡터 OA에 수직인 직선과 원 (1)의 교점 중 A가 아닌 점
- **A9** — 선분 A7A8의 중점에서 $|A7A8|/2$ 만큼 수직 방향으로 떨어진 두 점 중 원(1) **내부**의 점
- **A9a** — 같은 두 점 중 원(1) **외부**의 점

|분기 기준 값

$$@ = |OA1| / |AA1|$$

A11 통합정의

A11 — A를 기준으로, AO가 AA10 쪽으로 도는 방향과 같은 방향으로 A10을 90도 회전하여 얻는 점.

$$|AA10| = |AA11|$$

- 세 분기($@ < 1$, $@ > 1$, $@ = 1$)에 모두 동일하게 적용한다.
- 기준벡터는 분기별로 나누지 않고 **AO 하나로 통일**한다.
- 회전은 거리를 보존하므로 $|AA10| = |AA11|$ 은 확인용 등식이며 추가 제약이 아니다.
- **회전 방향이 정의되지 않는 경우** — AO와 AA10이 같은 방향이거나 정반대(180도) 방향이면 도는 방향이 결정되지 않는다. 이때 A11은 별도 규칙으로

정의한다.

| 분기 1 : @ < 1

- 원(2) — 중심 A8, 반지름 |A8A9|
- A10 — A9를 지나며 AA9에 수직인 직선과 원(2)의 교점 중 A9가 아닌 점
- A10' — A10을 지나며 AA10에 수직인 직선과 AA9의 연장선과의 교점
- A11 — 통합정의에 따른다

| 분기 2 : @ > 1

- 원(2) — 중심 A9, 반지름 |A9A7|
- A10 — A7을 지나며 AA7에 수직인 직선과 원(2)의 교점 중 A7이 아닌 점
- A10' — A10을 지나며 AA10에 수직인 직선과 AA7의 연장선과의 교점

- **A11** — 통합정의에 따른다

| 분기 3 : @ = 1

부등식 조건

- $AX > A1X, AY < A1Y$

- $AX < A1X, AY > A1Y$

- $AX > A1X, AY > A1Y$

- $AX < A1X, AY < A1Y$

X는 직선 AA7 위에서 위 부등식 조건을 만족하도록 계산에 의해 선택되는 점이다.

$$A7 = A8 = A9 = A9a = A10 = A10'$$

- **A11** — 통합정의에 따른다. $A10 = A7$ 이므로

$$|AA10| = |AA11|$$

| 최종점 A12

$$AA12 = AA6 + AA11$$

특수 경우

1) $y = ax, A(x, ax)$ 인 경우 ($b = 0$)

$A1 = 0$ 이므로 $A7$ 이 정의되지 않는다. b 가 0에 오른 쪽·왼쪽에서 다가갈 때의 두 극한을 이등분한 방향($= AO$)을 취해 **$A11 = 0$** 으로 정의한다.

$$A12 = A \text{ (완전 자기귀결 구조)}$$

이는 규약에 의한 확장이며, $b = 0$ 에서 연속인 것은 아니다.

2) $A = A1$ 인 경우 (OA 가 접선에 수직, **$|AA1| = 0$**)

@ 가 정의되지 않고, 원(1)의 반지름이 0이 되어 $A7$ 이후의 점을 생성할 수 없다.

$$A11 \text{ 생성 불가} \rightarrow AA12 = AA6 \rightarrow A12 = A6$$

3) AO와 AA10이 평행한 경우

같은 방향 또는 정반대 방향이면 A11의 회전 방향이 결정되지 않는다. 별도 규칙으로 정의한다.

Z1 그래프 작성법

기본 설정

- 원점 $O = (0, 0)$ 표시
- 축비율 $1 : 1$
- 눈금 간격 1
- x 축, y 축을 표현 표시

기준 요소 표시

- 접선 $y = ax + b$ 작성
- 점 $A(x, ax + b)$ 표시
- 점 $A1$ 표시 (O 에서 접선에 내린 수선의 발)

원 표시

- 원(1) — 중심 $A1$, 반지름 $|A1A|$
- 원(2), $@ < 1$ — 중심 $A8$, 반지름 $|A8A9|$

- 원(2), $@ > 1$ — 중심 A9, 반지름 $|A9A7|$
- 원(2), $@ = 1$ — 정의되지 않는다

| 점 라벨 표시 규칙

표시할 점

O, A, A1, A2, A4a, A4b, A5a, A5b, A6, A7, A8,
A9, A9a, A10, A11, A12, A10'

표시하지 않는 점

A3a, A3a', A3b, A3b', A3c, A3d

| 좌표 표기 규칙

- 좌표값 표시는 A, A1, A12, A10' 만
- 소수점 이하 5자리
- 그래프 한쪽에 a, b, x, @ 값 표기

| 기본 연결선 (항상 표시)

OA, OA1, OA2, A1A2, A1A6, A1A7, AA2, AA6, AA9, AA10, AA11, AA12, A1A5a, A1A5b, A2A4a, A2A4b, A2A5a, A2A5b, A5aA6, A5bA6, A6A12, A11A12, A7A9, A7A9a, A8A9, A8A9a, A10A10', A10'A11

| @ 값에 따른 추가 연결선

- $@ < 1$ — AA8, A9A10, A9A10', OA8
- $@ > 1$ — AA7, A7A10, A7A10', OA7
- $@ = 1$ — $A7 = A8 = A9 = A9a = A10 = A10'$ 이므로 A10' 만 표시, 연결선은 AA10'

| 특수 경우의 그래프 표기

- $A = A1$ — "@값 없음 ($A = A1, |AA1| = 0$)", "A11 생성 불가 $\rightarrow AA12 = AA6 \rightarrow A12 = A6$ " 을 그래프에 명기하고, 원(1)·원(2) 및 A7 이후의 점과 연결

선은 생략한다.

Z2 계산법

| Z2의 정의

기준 직선이 수직선 또는 수평선인 경우.

- $x = k$
- $y = c$

점 A는 다음 네 가지 형태 중 하나

- $x = k$ 일 때 $A = (k, k_1)$
- $y = c$ 일 때 $A = (c_1, c)$
- $x = k$ 일 때 $A = (k, k)$
- $y = c$ 일 때 $A = (c, c)$

원점 $O = (0, 0)$

| A1 (항상 동일)

O에서 기준 직선에 내린 수선의 발

- $x = k \rightarrow A1 = (k, 0)$
- $y = c \rightarrow A1 = (0, c)$

| **A2 (A의 축 투영점)**

- $x = k, A = (k, k1) \rightarrow A2 = (0, k1)$
- $x = k, A = (k, k) \rightarrow A2 = (0, k)$
- $y = c, A = (c1, c) \rightarrow A2 = (c1, 0)$
- $y = c, A = (c, c) \rightarrow A2 = (c, 0)$

| **원(1)과 A6**

- **원(1)** — 중심 A1, 반지름 $|A1A|$
- **A6** — A2를 지나며 A1A2에 수직인 직선과 기준 직선의 수직/수평선과의 교점
 - $x = k \rightarrow$ 수직선
 - $y = c \rightarrow$ 수평선

@ 값 정의는 Z1과 동일하며, $@ < 1$, $@ > 1$, $@ = 1$

이후 단계도 Z1과 동일한 분기 규칙을 적용한다.

| A7 ~ A12 계산 (핵심 규칙)

Z2에서는 A7 이후의 계산을 Z1과 **완전히 동일한 방식**으로 수행한다.

A7, A8, A9, A9a, A10, A10', A11, A12 = 벡터합

- 단, 기준 직선만 다를 뿐이다.
- 회전, 원(2), 벡터합 규칙은 전부 Z1 그대로이다.
- A11 역시 통합정의(AO 기준 90도 회전)를 그대로 적용한다.

| Z2의 특수 귀결

$y = ax$ 는 기울기가 정의되는 일반 직선이므로 Z1에 속한다. 그에 따른 자기귀결($b = 0$ 일 때 $A12 = A$)은 Z1 특수 경우 1)에 정의되어 있으며, Z2에서는 따로 다루지 않는다.

Z2 그래프 작성법

기본 표시

- x축, y축, 원점 $O(0, 0)$
- 축비율 1 : 1
- 눈금 간격 1

기준 직선 및 점 표시

- 기준 직선 : $x = k$ 또는 $y = c$
- 점 : A, A1, A2, A6, A7, A8, A9, A9a, A10, A10', A11, A12

원 표시

- 원(1) — 중심 A1, 반지름 $|A1A|$
- 원(2), $@ < 1$ — 중심 A8
- 원(2), $@ > 1$ — 중심 A9

- 원(2), @ = 1 — 생략

| 기본 연결선

OA, A1A2, AA2, A2A6, AA6, A6A12, AA9, AA10, AA11, AA12, A7A9, A7A9a, A8A9, A8A9a, A11A12, A10A10', A11A10'


| @ 값에 따른 추가 연결선


- @ < 1 — AA8, A9A10, A9A10', OA8
- @ > 1 — AA7, A7A10, A7A10', OA7
- @ = 1 — A7 = A8 = A9 = A9a = A10 = A10' 이므로 A10' 만 표시, 연결선은 AA10'


| 좌표 · 표기 규칙

- 좌표 표시 : A, A1, A12, A10' 만
- 소수점 이하 5자리


- ## AA12의 각도 표시








Z1 Sangbun Vector Calculation (@ = 1 Special Case) **$a = -3/5, b = -6, x = 1.7647058824$**




Z2 Sangbun Vector Complete

$x=5$, $A=(5.0, -3.0)$, $@>1$


Square: A7-A9-A8-A9a




Z1 0000 000 (a=-3/5, b=-3, x=-6.5)




Z1 Sangbun Vector ($a=5/6$, $b=5$, $x=-0.6$) - A2 fixed






Sangbunhak Z1 ($a=3/5, b=6, x=3.5$)




Source: Sangbunhak Z1 (formal spec by Kim Sangbok) + ChatGPT session computation | $a=3/5, b=6, x=3.5$


Z1 Sangbun Vector ($a=-5/6, b=-5, x=6.5$)




Z1 Sangbun Vector - Full Graph (@ branch auto)




상분막 - Z1 (a=1/2, b=3, A=A1)
 @값 없음 → A11 생성 불가 → AA12 = AA6 → A12 = A6






Trefoil Knot - FULL Z1 Sangbun Vector Field
($xy + yz + zx$ planes synthesis - Complete A1~A12 Algorithm)
Length: Avg=6.613, Max=24.995, Min=2.000, Std=6.132

— Curve




Helix - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis - Complete A1~A12 Algorithm)
Length: Avg=48.284, Max=738.063, Min=1.572, Std=158.618




Torus Knot (3,2) - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis - Complete A1~A12 Algorithm)
Length: Avg=13.481, Max=53.528, Min=3.082, Std=14.580

— Curve




Spherical Spiral - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis - Complete A1~A12)
Avg=3.990, Max=12.331, Min=0.000, Std=3.807

— Curve



Viviani's Curve - FULL Z1 Sangbun Vector Field
($xy + yz + zx$ planes synthesis)
Avg=7.908, Max=16.872, Min=1.659, Std=4.699



Cylindrical Helix (Elliptical) - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis)
Avg=11.464, Max=31.773, Min=2.879, Std=6.831

— Curve







Figure-8 Knot - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis)
Avg=17.275, Max=55.083, Min=3.644, Std=14.582




Cinquefoil Knot (5,2) - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis)
Avg=17.566, Max=133.092, Min=2.062, Std=31.914




Lissajous Curve 3D - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis)
Avg=15.001, Max=62.077, Min=0.000, Std=20.516



Cinquefoil Knot (5,2) - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis)
Avg=17.566, Max=133.092, Min=2.062, Std=31.914



Robot Arm 3D Path with Sangbun Vector Analysis
(Color: Red=Slow, Green=Fast)



Velocity Profile Based on Sangbun Vector Analysis

