

Алгебра и геометрия
 Индивидуальное домашнее задание №1

Задание 1. Даны вектора $a = (9, -4, -7)$, $b = (5, -10, 7)$, $c = (-9, 10, -9)$. Найти вектор x , перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 38$.

Решение. $\vec{x} = t \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = t \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 9 & -4 & -7 \\ 5 & -10 & 7 \end{vmatrix} = t \cdot (\vec{i}(-28-70) - \vec{j}(63+35) + \vec{k}(-90+20)) = t \cdot (-98\vec{i} - 98\vec{j} - 70\vec{k})$

$$\begin{aligned} \vec{x} &= (-98t, -98t, -70t) \\ (x, c) &= 98t \cdot 9 - 98t \cdot 10 + 70t \cdot 9 = 882t - 980t + 630t = 532t \\ 532t &= 38 \\ t &= \frac{1}{14} \end{aligned}$$

Ответ: $\vec{x} = (-7, -7, -5)$

Задание 2. Даны вектора $a = (2, -4, -3)$, $b = (-2, 10, 10)$, $c = (-3, -1, 1)$. Найти вектор x перпендикулярный a и b такой, что $(x, c) = 28$.

Решение. $x = t \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = t \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -4 & -3 \\ -2 & 10 & 10 \end{vmatrix} = t \cdot (\vec{i} \cdot (-40+30) + \vec{j} \cdot (6-20) + \vec{k} \cdot (20-8)) = t \cdot (-10\vec{i} - 14\vec{j} + 12\vec{k})$

$$\begin{aligned} \vec{x} &= (-10t, -14t, 12t) \\ (x, c) &= 10t \cdot 3 + 14t \cdot 1 + 12t \cdot 1 = 30t + 14t + 12t = 56t \\ 56t &= 28 \\ t &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Ответ: $\vec{x} = (-5, -7, 6)$

Задание 3. Найти площадь треугольника с вершинами $A(9, -3, -6)$, $B(9, -9, -7)$, $C(8, 7, -5)$.

Решение. $AB(0, -6, -1), AC(-1, 10, 1)$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}|$$

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -6 & -1 \\ -1 & 10 & 1 \end{vmatrix} = (-6+10)\vec{i} + \vec{j} - 6\vec{k} = 4\vec{i} + \vec{j} - 6\vec{k}$$

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = (4, 1, -6)$$

$$|\vec{AB} \times \vec{AC}| = \sqrt{16+1+36} = \sqrt{53}$$

Ответ: $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \sqrt{53}$

Задание 4. При каком значении λ прямые $l_1 : \frac{x-4}{1} = \frac{y-4}{0} = \frac{z-9}{3} = t_1$ и $l_2 : \frac{x-2}{1} = \frac{y-5}{1} = \frac{z-\lambda}{-1} = t_2$ пересекаются? Найти точку пересечения.

Решение. Уравнения в параметрической форме:

$$\begin{cases} x = 4 + t_1 \\ y = 4 \\ z = 9 + 3t_1 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x = 2 + t_2 \\ y = 5 + t_2 \\ z = \lambda - t_2 \end{cases}$$

Найдем t_1 и t_2 из первых двух уравнений систем:

$$\begin{cases} 4 + t_1 = 2 + t_2 \\ 4 = 5 + t_2 \end{cases} \quad \begin{cases} 4 + t_1 = 2 + t_2 \\ t_2 = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} t_1 = -3 \\ t_2 = -1 \end{cases}$$

Подставим t_1 и t_2 в третье уравнение:

$$9 + 3t_1 = \lambda - t_2$$

$$9 - 9 = \lambda + 1$$

Найдем точку пересечения:

$$A(x, y, z)$$

$$x = 4 + t_1 = 1$$

$$y = 4$$

$$z = 9 - 3t_1 = 0$$

Ответ: $A(1, 4, 0)$

Задание 5. Написать уравнение плоскости, проходящей через точку $(1, 2, -2)$ параллельно прямым $l_1 : \frac{x+1}{5} = \frac{y-4}{-4} = \frac{z-8}{2} = t_1$ и $l_2 : \frac{x-2}{1} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z-1}{1} = t_2$.

Решение. Направляющие векторы:

$$\vec{n}_1 : (5, -4, 2)$$

$$\vec{n}_2 : (1, -1, 1)$$

Нормаль плоскости:

$$\vec{n} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 5 & -4 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -2\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k}$$

$$\vec{n} = (-2, -3, -1)$$

Каноническое уравнение плоскости имеет вид $Ax + By + Cz + D = 0$

$$-2x - 3y - 1z + D = 0 \text{ при } (x, y, z) = (1, 2, -2)$$

$$-2 - 6 + 2 + D = 0$$

$$D = 6$$

Таким образом, плоскость задается уравнением $-2x - 3y - z + 6 = 0$

Ответ: $-2x - 3y - z + 6 = 0$