

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : RATRAPAGE 2018

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3,50 pts)

On rappelle que $(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire de zéro la matrice nulle $\theta = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et d'unité la matrice $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et que $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel de dimension 4.

Pour tout couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose $M(x, y) = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix}$. On considère l'ensemble $E = \{M(x, y) / (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$

1 - **Montrons que E est un sous-groupe du groupe $(M_2(\mathbb{R}), +)$.**

On a $\theta = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in E$, alors $E \neq \emptyset$

Soit $M(x, y) \in E$ et $M(x', y') \in E$

On a $M(x, y) - M(x', y') = \begin{pmatrix} x - x' & y - y' \\ 0 & x - x' \end{pmatrix}$; (car $x - x' \in \mathbb{R}$ et $y - y' \in \mathbb{R}$)

D'où E est un sous-groupe du groupe $(M_2(\mathbb{R}), +)$.

2 - a) **Montrons que E est un sous-espace de l'espace vectoriel $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$**

On a $E \neq \emptyset$

Soit $M(x, y) \in E$ et $M(x', y') \in E$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

On a :

$$\begin{aligned} \alpha M(x, y) + \beta M(x', y') &= \alpha \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} x' & y' \\ 0 & x' \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha x + \beta x' & \alpha y + \beta y' \\ 0 & \alpha x + \beta x' \end{pmatrix} \\ &= M(\alpha x + \beta x', \alpha y + \beta y') \in E \end{aligned}$$

Car $(\alpha x + \beta x') \in \mathbb{R}$ et $(\alpha y + \beta y') \in \mathbb{R}$.

D'où E est un sous-espace de l'espace vectoriel $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$

b) **Montrons que l'espace vectoriel réel $(E, +, \cdot)$ est de dimension 2**

Soit $M(x, y) \in E$

On a

$$\begin{aligned} M(x, y) &= \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix} \\ &= x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= x.M(1, 0) + y.M(0, 1) \end{aligned}$$

Alors $(M(1, 0); M(0, 1))$ est une famille génératrice de E

— **Montrons que $(M(1, 0); M(0, 1))$ est une famille libre**

Soit $(\alpha; \beta) \in \mathbb{R}^2$

$$\text{On a : } \alpha M(1, 0) + \beta M(0, 1) = \theta \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc $\alpha = \beta = 0$

Alors $(M(1, 0); M(0, 1))$ est une famille libre

D'où : $(M(1, 0); M(0, 1))$ est une base de l'espace vectoriel réel $(E, +, \cdot)$

Ainsi $\dim E = 2$

3 - a) **Montrons que E est une partie stable pour la loi $\times$**

Soit $M(x, y) \in E$ et $M(x', y') \in E$

On a

$$\begin{aligned} M(x, y) \times M(x', y') &= \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x' & y' \\ 0 & x' \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} xx' & xy' + x'y \\ 0 & xx' \end{pmatrix} \\ &= M(xx', xy' + x'y) \in E \quad \text{car} \quad (xx' \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad xy' + x'y \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

D'où : E est une partie stable pour la loi $\times$

b) **Montrons que $(E, +, \times)$ est un anneau commutatif.**

- On a $(E, +)$ est un groupe commutatif car $(E, +, \cdot)$ est un espace vectoriel.
- Et on a $(M_2(\mathbb{R}), +)$ est un anneau et E est une partie stable par la loi " $\times$ ", alors la loi " $\times$ " est associative et distributive par rapport à "+" dans E
- Soit $M(x, y)$ et $M(x', y')$ deux éléments de E

On a

$$\begin{aligned} M(x, y) \times M(x', y') &= M(xx', xy' + yx') \\ &= M(x'x, x'y + y'x) \\ &= M(x', y') \times M(x, y) \end{aligned}$$

Alors la loi "×" est commutative dans E

D'où $(E, +, \times)$ est un anneau commutatif.

4 - On définit dans $M_2(\mathbb{R})$ la loi de composition interne $\top$ par :

$$\begin{aligned} &(\forall M(x, y) \in M_2(\mathbb{R})) (\forall M(x', y') \in M_2(\mathbb{R})) \\ &M(x, y) \top M(x', y') = M(x, y) \times M(x', y') - M(y, 0) \times M(y', 0) \end{aligned}$$

Soit φ l'application de $\mathbb{C}^*$ vers E définie par :

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{C}^* &\mapsto E \\ x + iy &\mapsto M(x, y) \end{aligned}$$

a) Montrons que E est une partie stable pour la loi $\top$

Soit $M(x, y)$ et $M(x', y')$ deux éléments de E

On a $M(x, y) \top M(x', y') = M(x, y) \times M(x', y') - M(y, 0) \times M(y', 0)$

et $M(x, y) \times M(x', y') \in E$ et $M(y, 0) \times M(y', 0) \in E$

car d'après la question 3 - a) E est une partie stable pour la loi $\times$

et $(M(x, y) \times M(x', y') - M(y, 0) \times M(y', 0)) \in E$ car $(E, +)$ est un groupe

D'où E est une partie stable pour la loi $\top$

b) Montrons que φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(E, \top)$

Soient $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ deux nombres complexes non nuls

On a $\varphi((x + iy) \times (x' + iy')) = \varphi(xx' - yy' + i(xy' + x'y)) = M(xx' - yy', xy' + x'y)$

On a

$$\begin{aligned} \varphi((z) \top (z')) &= M((x + iy) \top M(x' + iy')) \\ &= M(x, y) \times M(x', y') - M(y, 0) \times M(y', 0) \\ &= M(xx', xy' + yx') - M(yy', 0) \\ &= M(xx' - yy', xy' + yx') \\ &= \varphi(z \times z') \end{aligned}$$

D'où φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(E, \top)$

c) On pose : $E^* = E - \{\theta\}$. Montrons que $(E^*, \top)$ est un groupe commutatif.

On a

$$M(x, y) \in \varphi(\mathbb{C}^*) \Leftrightarrow \exists (a + ib) \in \mathbb{C}^*; \varphi(a + ib) = M(x, y)$$

$$\Leftrightarrow \exists (a + ib) \in \mathbb{C}^*; M(a, b) = M(x, y)$$

$$\Leftrightarrow \exists (a + ib) \in \mathbb{C}^*; a = x \text{ et } b = y$$

$$\Leftrightarrow M(x, y) \in E^*$$

Alors $\varphi(\mathbb{C}^*) = E^*$

et puisque φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(E^*, \top)$ et $(\mathbb{C}^*, \times)$ est un groupe commutatif

D'où $(E^*, \top)$ est un groupe commutatif.

5 - a) **Montrons que la loi $\top$ est distributive par rapport à la loi $+$ dans E**

On considère trois matrices $M(x, y)$ et $M(x', y')$ et $M(x'', y'')$ de E

On a

$$M(x, y) \top (M(x', y') + M(x'', y'')) = M(x, y) \top M(x' + x'', y' + y'')$$

$$= M(x(x' + x'') - y(y' + y''); x(y' + y'') + y'(x' + x''))$$

$$= M(xx' + xx'' - yy' - yy''; xy' + xy'' + yx' + yx'')$$

et on a

$$M(x, y) \top M(x', y') + M(x, y) \top M(x'', y'') = M(xx' - yy'; xy' + x'y) + M(xx'' - yy''; xy'' + x''y)$$

$$= M(xx' + xx'' - yy' - yy''; xy' + xy'' + yx' + yx'')$$

$$\text{donc } M(x, y) \top (M(x', y') + M(x'', y'')) = M(x, y) \top M(x', y') + M(x, y) \top M(x'', y'')$$

D'où la loi $\top$ est distributive par rapport à la loi $+$ dans E

b) **Montrons que $(E, +, \top)$ est un corps commutatif.**

- On a $(E, +)$ est un groupe abélien
- et d'après la question 4)c) on a $(E^*, \top)$ est groupe
- et d'après la question 5)a, la loi $\top$ est distributive par rapport à la loi $+$ dans E

D'où $(E, +, \top)$ est un corps commutatif.

Exercice 2 : (3 pts)

1 - **Pour tout nombre complexe $Z \in \mathbb{C} - \{i\}$ on pose : $h(z) = i \left(\frac{z - 2i}{z - i} \right)$.**

a) **Vérifions que : $h(z) = z \Leftrightarrow z^2 - 2iz - 2 = 0$**

$$\text{On a } h(z) = z \Leftrightarrow i \left(\frac{z-2i}{z-i} \right) = z$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{z-2i}{z-i} \right) = \frac{z}{i}$$

$$\Leftrightarrow i(z-2i) = z(z-i)$$

$$\Leftrightarrow iz + 2 = z^2 - iz$$

$$\Leftrightarrow z^2 - 2iz - 2 = 0$$

d'où $h(z) = z \Leftrightarrow z^2 - 2iz - 2 = 0$

b) Résolvons dans $\mathbb{C}$ l'équation : $(E) : z^2 - 2iz - 2 = 0$

On a $\Delta = (-2i)^2 - 4 \times (1) \times (-2) = 4$

alors les solutions de l'équation (E) sont : $z_1 = \frac{-(-2i) - \sqrt{4}}{2 \times 1} = i - 1$ et $z_2 = i + 1$

2 - Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé directe $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ On note a et b les deux solutions de l'équation (E) tel que : $\text{Re}(a) = 1$ Et pour tout $Z \in \mathbb{C} - \{i, a, b\}$ On considère les points $M(z), M'(h(z)), A(a)$ et $B(b)$

a) Montrons que : $\left(\frac{h(z) - a}{h(z) - b} \right) = - \left(\frac{z - a}{z - b} \right)$

$$\begin{aligned} \text{On a } \left(\frac{h(z) - a}{h(z) - b} \right) &= \frac{i \left(\frac{z-2i}{z-i} \right) - a}{i \left(\frac{z-2i}{z-i} \right) - b} \\ &= \frac{z - 2i + i(1+i)(z-i)}{z - 2i + i(-1+i)(z-i)} \\ &= \frac{z - i}{z - 2i + i(-1+i)(z-i)} \\ &= \frac{z - i}{z - 2i - (i+1)(z-i)} \\ &= \frac{iz - i + 1}{-iz - i - 1} \\ &= - \left(\frac{z + \frac{1}{i} - \frac{i}{i}}{z + \frac{i}{i} + \frac{1}{i}} \right) \\ &= - \left(\frac{z - a}{z - b} \right) \end{aligned}$$

b) En déduire que : $\left(\overline{M'B}, \overline{M'A} \right) \equiv \pi + \left(\overline{MB}, \overline{MA} \right) [2\pi]$.

$$\begin{aligned}
\text{On a} \quad (\overrightarrow{M'B}, \overrightarrow{M'A}) &\equiv \arg \left(\frac{z_A - z_{M'}}{z_B - z_{M'}} \right) [2\pi] \\
&\equiv \arg \left(\frac{a - h(z)}{b - h(z)} \right) [2\pi] \\
&\equiv \arg \left(-\frac{z - a}{z - b} \right) [2\pi] \\
&\equiv \pi + \arg \left(\frac{a - z}{b - z} \right) [2\pi] \\
&\equiv \pi + (\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}) [2\pi]
\end{aligned}$$

0.5 pt **3 - a) Montrons que si M et A et B sont alignés alors M, A, B et M' sont alignés.**

$$\begin{aligned}
&\text{Si } A, B \text{ et } M \text{ sont colinéaires alors } (\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}) \equiv 0[\pi] \\
&\Rightarrow (\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}) \equiv 0[2\pi] \text{ ou } (\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}) \equiv \pi[2\pi] \\
&\Rightarrow (\overrightarrow{M'B}, \overrightarrow{M'A}) \equiv \pi[2\pi] \text{ ou } (\overrightarrow{M'B}, \overrightarrow{M'A}) \equiv 2\pi[2\pi] \quad \text{car } (\overrightarrow{M'B}, \overrightarrow{M'A}) \equiv \pi + (\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}) [2\pi] \\
&\Rightarrow (\overrightarrow{M'B}, \overrightarrow{M'A}) \equiv \pi[2\pi] \text{ ou } (\overrightarrow{M'B}, \overrightarrow{M'A}) \equiv 0[2\pi] \\
&\Rightarrow (\overrightarrow{M'B}, \overrightarrow{M'A}) \equiv 0[\pi]
\end{aligned}$$

donc A, B et M' sont colinéaires.

d'où si M et A et B sont alignés alors M, A, B et M' sont alignés.

0.5 pt **b) Montrons que si M, A et B ne sont pas alignés alors M, A, B et M' sont cocycliques.**

$$\begin{aligned}
\text{On a} \quad \left(\frac{h(z) - a}{h(z) - b} \right) &= - \left(\frac{z - a}{z - b} \right) \\
\Rightarrow \left(\frac{h(z) - a}{h(z) - b} \right) \times \left(\frac{z - b}{z - a} \right) &= -1 \\
\Rightarrow \left(\frac{a - h(z)}{b - h(z)} \right) \times \left(\frac{b - z}{a - z} \right) &= -1 \\
\Rightarrow \left(\frac{z_A - z_{M'}}{z_B - z_{M'}} \right) \times \left(\frac{z_B - z_M}{z_A - z_M} \right) &\in \mathbb{R}
\end{aligned}$$

Alors les points A, B, M et M' sont alignés ou cocycliques.

et puisqu'on a supposé que M, A et B ne sont pas alignés

Alors A, B, M et M' sont cocycliques.

Exercice 3 : (3 pts)

On lance 10 fois de suite une pièce de monnaie parfaitement équilibrée.

On désigne par X la variable aléatoire égale à la fréquence d'apparition de la face "pile". (c'est-à-dire le nombre de fois d'apparition de la face "pile" divisé par 10)

1 - a) Déterminons les valeurs prise par X :

Pour le lancer d'une pièce de monnaie équilibrée et non truquée, l'univers des possibilités est $\Omega = \{ P, F \}$

L'expérience en question consiste à répéter le lancer 10 fois. Le résultat (d'obtenir Pile)

est représenté par une variable aléatoire de la loi de Bernoulli de paramètre $p(\text{Pile})=p(\text{Face})=1/2$
 La variable aléatoire X en question associe à chaque événement la fréquence d'apparition de Pile dans une série de 10 lancers.
 Ainsi les valeurs possibles de X sont $\frac{0}{10}; \frac{1}{10}; \dots; \frac{10}{10}$
 Autrement dit : $X(\Omega) = \{ \frac{i}{10} | 0 \leq i \leq 10 \}$

b) Déterminons la probabilité de l'événement $[X = \frac{1}{2}]$:

L'événement, $[X = \frac{1}{2}]$ ou plutôt $[X = \frac{5}{10}]$, donne une information sur l'obtention de (Pile) exactement 5 fois dans une épreuve de 10 lancers indépendants. Alors la probabilité de vérification de l'événement $[X = \frac{5}{10}]$ se calcule ainsi :

$$P[X = \frac{5}{10}] = C_{10}^5 \cdot (\frac{1}{2})^5 \cdot (1 - \frac{1}{2})^5 = \frac{63}{256}$$

2 - La probabilité de l'évènement : $[X \geq \frac{9}{10}]$:

$$\begin{aligned} \text{On a : } P[X \geq \frac{9}{10}] &= P[X = \frac{9}{10} \text{ ou } X = \frac{10}{10}] \\ &= P[X = \frac{9}{10}] + P[X = \frac{10}{10}] \\ &= C_{10}^1 \cdot (\frac{1}{2})^9 \cdot (1 - \frac{1}{2})^1 + C_{10}^{10} \cdot (\frac{1}{2})^{10} \cdot (1 - \frac{1}{2})^0 \\ &= \frac{11}{1024} \end{aligned}$$

Donc $P[X \geq \frac{9}{10}] = \frac{11}{1024}$

Exercice 4 : Problème (11 pts)

Soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par : $\begin{cases} f(x) = \sqrt{x}(\ln x)^2; & x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$

On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1 - a) Montrons que f est continue à droite en 0.

On a :

$$\begin{aligned} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \sqrt{x}(\ln x)^2 \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(4x^{\frac{1}{4}} \ln \left(x^{\frac{1}{4}} \right) \right)^2 \\ &= \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} 16(t \ln(t))^2 \text{ (en posant : } t = x^{\frac{1}{4}} \text{)} \\ &= 16 \times 0^2 = 0 = f(0) \end{aligned}$$

Donc f est continue à droite en 0

b) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ interprétons graphiquement le résultat obtenu.

0.75 pt

On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}(\ln x)^2 = +\infty$

Car $(\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}(\ln x)^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(4 \ln(x^{\frac{1}{4}}))^2}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(4 \ln(x^{\frac{1}{4}}))^2}{(x^{\frac{1}{4}})^2} = 16 \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln t}{t}\right)^2 = 16 \times 0^2 = 0 \end{aligned}$$

Donc admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses (OX) au voisinage de $+\infty$.

2 - a) Étudions la dérivabilité de f à droite en 0, puis interprétons graphiquement le résultat obtenus.

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{(4 \ln(x^{\frac{1}{4}}))^2}{x} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{(4 \ln(x^{\frac{1}{4}}))^2}{(x^{\frac{1}{4}})^2} \\ &= \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} 16(t \ln(t))^2 \text{ (en posant : } t = x^{\frac{1}{4}}) \\ &= 16 \times (-\infty)^2 = +\infty. \end{aligned}$$

Donc f n'est pas dérivable à droite en 0

Alors la courbe admet une demi tangente verticale dirigée vers le haut à droite du point d'abscisse 0.

0.75 pt

b) Montrons que f est dérivable sur $]0, +\infty[$ puis calculons $f'(x)$ pour $x > 0$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme étant le produit de deux fonctions dérivables sur $]0, +\infty[$

Soit $x > 0$:

On a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= (\sqrt{x}(\ln x)^2)' \\ &= (\sqrt{x})'(\ln x)^2 + ((\ln x)^2)' \sqrt{x} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}}(\ln x)^2 + 2 \cdot \frac{1}{x} \cdot \ln x \cdot \sqrt{x} \\ &= \frac{(4 + \ln x)\ln x}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

0.75 pt

c) Étudions les variations de f sur $[0, +\infty[$

Soit $x > 0$

3 - Pour tout réel $x \geq 0$, on pose $F(x) = \int_x^1 f(t)dt$

a) Montrons que la fonction F est dérivable sur l'intervalle $[0, +\infty[$.

On sait que f est continue sur $[0, +\infty[$ et puisque $1 \in [0, +\infty[$ alors elle admet une seule primitive G sur $[0, +\infty[$ tels que :
$$\begin{cases} \forall x \in [0, +\infty[: G(x) = \int_1^x f(t)dt; G(0) = 0 \\ \forall x \in [0, +\infty[: G'(x) = f(x) \end{cases}$$

$$\text{Donc : } F(x) = \int_x^1 f(t)dt = - \int_1^x f(t)dt = -G(x)$$

et comme G est dérivable sur $[0, +\infty[$ alors F est aussi dérivable sur $[0, +\infty[$, et on a :

$$F'(x) = -G'(x) = -f(x) = -\sqrt{x}(\ln x)^2$$

b) Calculons $F'(x)$ pour $x \geq 0$:

Et déduisons le sens de variation de F sur l'intervalle $[0, +\infty[$.

$$\text{On a : } \forall x \in [0, +\infty[: F'(x) = -\sqrt{x}(\ln x)^2 < 0$$

Donc : F est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$.

4 - a) En utilisant la méthode d'intégration par parties, calculons $\int_a^1 \sqrt{t}(\ln t)dt$ pour tout $x > 0$.

On a :

$$\begin{aligned} \int_x^1 \sqrt{t}(\ln t)dt &= \int_x^1 t^{\frac{1}{2}}(\ln t)dt \\ &= \left[\left(\frac{1}{\frac{1}{2}+1} \right) t^{\frac{1}{2}+1} \cdot \ln t \right]_x^1 - \int_x^1 \frac{2}{3} \cdot t^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{t} dt \\ &= \left[\frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \cdot \ln t \right]_x^1 - \int_x^1 \frac{2}{3} \cdot t^{\frac{1}{2}} dt \\ &= -\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \cdot \ln x - \frac{2}{3} \left[\frac{2}{3} \cdot t^{\frac{3}{2}} \right]_x^1 \\ &= -\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \cdot \ln x - \frac{2}{3} \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{3} \cdot x^{\frac{3}{2}} \right) \\ &= -\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \cdot \ln x - \frac{4}{9} + \frac{4}{9} \cdot x^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

b) Montrons que pour tout $x > 0$

$$F(x) = -\frac{2}{3}x\sqrt{x}(\ln x)^2 + \frac{8}{9}x\sqrt{x}\ln x - \frac{16}{27}x\sqrt{x} + \frac{16}{27}$$

On a :

$$\begin{aligned}
 F(x) &= \int_x^1 f(t)dt = \int_x^1 \sqrt{t}(\ln t)^2 dt \\
 &= \left[\frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \cdot (\ln t)^2 \right]_x^1 - \int_x^1 \frac{2}{3} \cdot t^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{2 \ln t}{t} dt \\
 &= \left[\frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \cdot (\ln t)^2 \right]_x^1 - \frac{4}{3} \int_x^1 t^{\frac{1}{2}} \cdot \ln t dt \\
 &= -\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \cdot (\ln x)^2 - \frac{4}{3} \int_x^1 t^{\frac{1}{2}} \cdot \ln t dt \\
 &= -\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \cdot (\ln x)^2 - \frac{4}{3} \left(-\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \cdot \ln x - \frac{4}{9} + \frac{4}{9} \cdot x^{\frac{3}{2}} \right) \\
 &= -\frac{2}{3} x\sqrt{x}(\ln x)^2 + \frac{8}{9} x\sqrt{x} \ln x - \frac{16}{27} x\sqrt{x} + \frac{16}{27}
 \end{aligned}$$

- c) Dédudisons en m^2 , l'aire du domaine limite par la courbe (C) et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = 1$ et $y = 0$.

On a : $\forall x \geq 0; f(x) \geq 0$

Donc :

$$\begin{aligned}
 A &= \int_0^1 f(t)dt(u.a) \\
 &= F(0) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} F(x) \\
 &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(-\frac{2}{3} x\sqrt{x}(\ln x)^2 + \frac{8}{9} x\sqrt{x} \ln x - \frac{16}{27} x\sqrt{x} + \frac{16}{27} \right) \\
 &= \frac{16}{27}(u.a) \\
 &= \frac{16}{27} \times 2 \times 2m^2 \\
 &= \frac{64}{27}m^2
 \end{aligned}$$

1 pt

5 - Pour tout entier naturel n non nul, on pose $u_n = \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x)dx$.

- a) Montrons que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est bornée et strictement monotone.

On a : $u_n = \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x)dx = F\left(\frac{1}{n}\right)$

et on a :

$$\begin{aligned}
 n \geq 1 &\Rightarrow 0 \leq \frac{1}{n} \leq 1 \\
 &\Rightarrow F(0) \leq F\left(\frac{1}{n}\right) \leq F(0) \\
 &\Rightarrow 0 \leq F\left(\frac{1}{n}\right) \leq \frac{16}{27}
 \end{aligned}$$

Donc la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est bornée.

D'autre part, on a :

$$n \geq 0 \Rightarrow n + 1 > 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$$

$$\Rightarrow F\left(\frac{1}{n+1}\right) < F\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$\Rightarrow u_{n+1} > u_n$$

D'où la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est strictement décroissante.

b) Montrons que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est convergente puis calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$:

On a $(u_n)_{n \geq 1}$ est une suite croissante et majorée par $\frac{16}{27}$ donc elle est convergente vers une limite réelle l telle que :

$$l = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} F\left(\frac{1}{n}\right) = F(0) = \frac{16}{27}$$

FIN