

うつ病の見分け方

仕事を失ったり、大切な人とけんかをしたり、つらい状況に直面したりすると、人は悲しさや孤独、不安を感じることがあります。しかし、うつ病は単に「悲しい」と感じるだけのものではありません。年齢に関係なく誰にでも起こりうる病気で、ベッドから起き上がることや仕事、人と交流することなど、日常生活に支障をきたすことがあります。強い悲しみや絶望感、怒りなどに圧倒されることで、普段の生活を送ることや、これまで楽しめていたことを楽しむのが難しくなることがあります。

これらのサインに気づいていますか？



行動

- ☐ エネルギー不足
- ☐ 意欲の低下
- ☐ 社会的な活動からの引きこもり
- ☐ 集中力の低下
- ☐ いら立ちやすくなる、または落ち込みやすくなる
- ☐ 睡眠の問題
- ☐ 落ち着きがなくなる、またはじっと座ってられない
- ☐ 身だしなみや衛生管理の低下（シャワーを浴びる、歯を磨くなどのセルフケアをする気力がなくなる）
- ☐ 生産性の急な変化（成績の低下や、仕事・友人に対する興味の喪失など）
- ☐ 食欲の変化



感情

- ☐ 悲しみ
- ☐ 怒り
- ☐ 罪悪感
- ☐ 絶望感
- ☐ こうした感情を抱いていることに対する恥ずかしさ
- ☐ 虚しさを感じたり、何も感じられなくなったりする状態

症状が2週間以上続いていますか？

もしそうであれば、医療機関に相談することをおすすめします。覚えておいてください。ニューヨーク州では、ほとんどの保険プランがメンタルヘルスおよび物質使用障害に対する保障を提供する必要があり、その保障は身体的な健康状態に対する保障と同等であることが求められています。



思考

- ☐ 自尊心の低下
- ☐ 自殺についての考え
- ☐ 自分を傷つける、または自傷行為（リストカットなど）について考えること
- ☐ 考えや言葉をうまくまとめることが難しい

誰がうつ病になりますか？

- 女性は男性の約2倍、うつ病になる可能性があります。
- およそ10人に1人が、一生のうちにうつ病を経験するといわれています。
- うつ病の最初の発症は、一般的に20歳から30歳の間に起こることが多いです。

うつ病の原因は何ですか？

- うつ病やそれに似た精神的な不調の家族歴があること。
- 貧困、失業、社会的孤立、その他のストレスの多い生活上の出来事。
- 人種、肌の色、または宗教に基づく差別。
- 「モデル・マイノリティ神話」によって課される非現実的な期待。
- 薬物やアルコールの常習的な使用。