

辨識憂鬱症

失去工作、與摯愛發生爭吵，或面對困難時期，都可能讓人感到悲傷、孤單或焦慮。然而，憂鬱症不只是感到悲傷而已。它是一種醫療狀況，可能影響任何年齡的人，並干擾日常活動，例如起床、工作或與他人社交。強烈的悲傷、絕望或憤怒，可能讓人難以正常運作或享受平常的活動。

你是否注意到以下任何徵兆？



行為

- ☐ 精力不足
- ☐ 動力低落
- ☐ 從社交活動中退縮
- ☐ 注意力不集中
- ☐ 更容易感到沮喪或生氣
- ☐ 睡眠問題
- ☐ 坐立不安或難以安靜坐著
- ☐ 個人衛生下降
(不願意洗澡、刷牙或進行自我照顧)
- ☐ 生產力突然改變
(成績下降、對工作或與朋友見面失去興趣)
- ☐ 食慾改變



感受

- ☐ 悲傷
- ☐ 憤怒
- ☐ 內疚
- ☐ 絕望
- ☐ 對自己有這些情緒感到羞愧
- ☐ 感到空虛或完全沒有任何感覺



想法

- ☐ 自尊心低落
- ☐ 有自殺的想法
- ☐ 思考傷害自己或自我割傷
- ☐ 難以整理或表達自己的想法或言語

你的症狀是否已持續超過兩週？

如果是，建議尋求醫療協助。

請記住，在紐約，大多數保險計劃必須為心理健康和物質使用障礙提供保障，並確保此類保障與身體健康狀況的保障相當。

誰會罹患憂鬱症？

- 女性罹患憂鬱症的可能性是男性的兩倍。
- 大約每 10 人中就有 1 人在其一生中會經歷憂鬱症。
- 憂鬱症的首次發作通常發生在 20 至 30 歲之間。

憂鬱症的成因是什麼？

- 家族中有憂鬱症或類似疾病的病史
- 貧困、失業、社會孤立以及其他壓力重大的生活事件
- 基於種族、膚色或宗教的歧視
- 由「模範少數族裔迷思」所帶來的不切實際的期望
- 經常使用毒品或酒精