

Guia da Sessão de Avaliação

Maria Silva

Apoia a observação prática durante a sessão presencial. Use como guia rápido offline; introduza os valores na app a seguir.

Use a aplicação como fonte principal. Use este PDF apenas como apoio e introduza os resultados na app depois.

Material necessário

- ☐ Espelho
- ☐ Fita métrica (se incluir antropometria)
- ☐ Cadeira / parede / ~2 m de chão livre
- ☐ Cronómetro ou telemóvel
- ☐ Câmara (opcional, para rever vídeo)

Segurança — pare imediatamente se:

- Dor aguda ou a piorar (especialmente articular).
- Tonturas ou pré-síncope.
- Dor no peito ou pressão torácica.
- Falta de ar desproporcional ao esforço.
- Sintomas neurológicos (dormência, fraqueza, alterações de visão).
- Inchaço súbito ou agudo.
- Sintomas após trauma recente.

Procure avaliação clínica qualificada se os sintomas persistirem ou forem involgares.

Não constitui diagnóstico nem aptidão médica.

Checklist prático por secção

SECÇÃO	OBSERVAR	REGISTAR	PARE / MODIFIQUE SE	CAMPO NA APP
Antropometria	Cintura, anca, % gordura (se tiver método).	cm e % com 1 casa decimal.	Dor à palpação ou desconforto invulgar.	anthro_block.*
Mobilidade	6 regiões: ombro, anca, tornozelo, torácica, punho, joelho.	Score 1–5 por região (ver cartões).	Dor aguda em qualquer amplitude.	ext_mob_*
Postura	Postura em pé; assimetrias visíveis, lado dominante.	Notas curtas em texto.	Dor na posição neutra de pé.	standing_posture_notes / known_imbalances / dominant_side
Avaliação de movimento	6 padrões: agachamento, hinge, push, pull, carry, lunge.	Critérios cumpridos / capacidade.	Compensação dolorosa ou perda de controlo.	{padrão}_form_criteria / _capacity
Performance / cardio	FC repouso, Cooper ou Rockport (se aplicável).	bpm, distância (m) ou tempo (min:seg).	Sintomas cardiovasculares — ver pág. 1.	resting_heart_rate / ext_cardio_test

Os cartões nas páginas seguintes detalham cada teste suportado pela aplicação.

Antropometria

CINTURA (CM)

Mede no ponto mais estreito acima da anca, expira.

ANCA (CM)

Mede na parte mais larga das nádegas.

MÉTODO DE % GORDURA

Lipocalibrador, bioimpedância, DEXA, etc.

Mobilidade (1–5)

shoulder

hip

ankle

thoracic

wrist

knee

Postura & alinhamento

NOTAS DE POSTURA EM PÉ

DESEQUILÍBRIOS CONHECIDOS

LADO DOMINANTE

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Avaliação de movimento

Marque os critérios cumpridos. Anote a capacidade observada nos espaços. Pare se houver dor.

Agachamento

☐ Calcanhares no chão durante todo o movimento

☐ Joelhos alinhados com os pés (sem valgus dinâmico)

☐ Tronco vertical, sem flexão lombar excessiva

☐ Profundidade: prega da anca igual ou abaixo do joelho

☐ Sem butt wink na fase final

CAPACIDADE

Reps até falha (peso corporal)

1RM (kg)

Hip hinge

☐ Movimento iniciado pela anca, não pelo joelho

☐ Coluna neutra (sem rounding lombar)

☐ Tensão visível nos isquiotibiais

☐ Descida controlada (3+ segundos)

☐ Bloqueio de glúteos no topo

CAPACIDADE

KB swings em 60s

RDL 1RM (kg)

Empurrar (overhead)

☐ Bloqueio completo dos cotovelos no topo

☐ Sem flare das costelas (caixa torácica neutra)

☐ Pescoço neutro, sem extensão cervical

☐ Rotação superior da escápula visível

☐ Sem inclinação lateral compensatória

CAPACIDADE

Flexões estritas até falha

Shoulder press 1RM (kg)

Puxar

☐ Amplitude completa (peito à barra ou linha horizontal)

☐ Retração escapular visível no topo

☐ Sem kipping ou impulso

☐ Pescoço neutro, sem extensão

☐ Excêntrica controlada (2+ segundos)

CAPACIDADE

Dead hang (segundos)

Pull-ups (reps)

Carregar

☐ Costelas alinhadas com a anca (rib stack)

☐ Coluna neutra durante toda a marcha

☐ Marcha estável e simétrica

☐ Estabilidade de preensão (sem deslizar)

☐ Sem queda contralateral da anca

CAPACIDADE

Carga (kg)

Distância (m)

Lunge

☐ Tronco vertical durante todo o movimento

☐ Joelho da frente alinhado com o pé

☐ Descida controlada

☐ Estabilidade de anca em apoio unipodal

☐ Simetria entre lado esquerdo e direito

CAPACIDADE

Walking lunge reps por lado

Bulgarian split squat 1RM (kg)

Cardio & performance

FC repouso (bpm)

Ao acordar, ainda na cama. Conte 60s no pulso ou pescoço. Idealmente média de 3 manhãs.

RHR (BPM)

Cooper 12 min (m)

DISTÂNCIA (M)

Rockport 1 milha (min:seg)

Caminhe 1 milha (1.6 km) o mais rápido possível, sem correr. Meça pulso 15s × 4 imediatamente após.

TEMPO (MIN:SEG)

FC PÓS-CAMINHADA (BPM)

O cálculo de VO₂máx é feito automaticamente pela app — basta introduzir os valores.