

Задача 5.2 по вычислительной математике

Требуется найти численное решение одной из представленных задач Коши с помощью метода Эйлера, используя шаг $h = 0.5$:

1. $\frac{dy}{dt} = \alpha e^{\beta(t-y)}, y(0) = 1, t \in [0; 1];$
2. $\frac{dy}{dt} = \alpha \sin(\beta y), y(0) = 1, t \in [0; 1];$

где $\alpha \in \mathcal{A} = \{1, 0.5, 2\}, \beta \in \mathcal{B} = \{0.5, 3, 1, 2\}.$

Дополнительно требуется найти точное решение указанной задачи Коши, продемонстрировать графики численного и точного решения на одной координатной плоскости, а также сравнить полученные абсолютные погрешности вычислений с верхней границей глобальной погрешности метода Эйлера.

В расчетах использовать: уравнение с номером $q = (N \bmod 2) + 1$, а также параметры с индексами: $id_{\mathcal{A}}[\alpha], id_{\mathcal{B}}[\beta]$.

Вычислим значения индексов необходимых элементов для варианта №5:

$$\begin{aligned} q &= (N \bmod 2) + 1 = 5 \bmod 2 + 1 = 1 + 1 = 2, \\ id_{\mathcal{A}}[\alpha] &= (N \bmod |S|) + 1 = (5 \bmod 3) + 1 = 3, \\ id_{\mathcal{B}}[\beta] &= (N \bmod |S|) + 1 = (5 \bmod 4) + 1 = 2, \end{aligned}$$

где N - номер варианта по списку, $|S|$ - мощность множества.

Выбрав элементы с необходимыми индексами окончательно получим, что найти численное решение требуется следующей задачи Коши:

$$\frac{dy}{dt} = 2 \sin(3y), y(0) = 1, t \in [0; 1]$$

Решение:

Из лекций нам известна формулировка метода Эйлера:

$$\begin{aligned}\omega_0 &= \alpha, \\ \omega_{i+1} &= \omega_i + hf(t_i, \omega_i), \quad i = 0, 1, \dots, m-1,\end{aligned}$$

где $\omega_i \approx y(t_i)$, $m = \frac{b-a}{h}$, $f(t_i, \omega_i) = \alpha \sin(\beta \omega_i)$.

Так как f не зависит от t , в дальнейшем в функцию достаточно будет передавать только ω_i . Также $m = \frac{1-0}{0.5} = 2$.

Для нахождения значений f от ω_i реализуем функцию на языке программирования Python ([листинг 1](#)).

Листинг 1. Функция, возвращающая значение f от переданного ω_i

```
def f(omega: float) -> float:
    return alpha * np.sin(beta * omega)
```

Также разработаем функцию, которая реализует метод Эйлера ([листинг 2](#)).

Листинг 2. Реализация метода Эйлера

```
def time_integrate(omega_0, a, b, h):
    m = int((b - a) / h)
    omega = np.zeros(m + 1)
    t = np.linspace(a, b, m+1)

    omega[0] = omega_0
    for i in range(m):
        omega[i+1] = omega[i] + h * f(omega[i])

    return t, omega
```

Аналитическое решение данной задачи Коши:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= 2 \sin(3y) \Rightarrow \frac{dy}{2 \sin(3y)} = dt \Rightarrow \int \frac{dy}{2 \sin(3y)} = \int dt \Rightarrow \\ \left[\int \frac{du}{\sin u} = \ln \left| \tan \left(\frac{u}{2} \right) \right| + C \right] &\Rightarrow \frac{1}{2} \ln \left| \tan \left(\frac{3y}{2} \right) \right| + C_1 = t + C_2 \Rightarrow \\ \left[C_3 = C_1 + C_2 \right] &\Rightarrow \frac{1}{2} \ln \left| \tan \left(\frac{3y}{2} \right) \right| = t + C_3 \Rightarrow \left[C = 2C_3 \right] \Rightarrow \\ \tan \left(\frac{3y}{2} \right) &= e^{2t+C} \Rightarrow \frac{3y}{2} = \arctan e^{2t+C} \Rightarrow y = \frac{2 \arctan e^{2t+C}}{3}\end{aligned}$$

При подстановке начального условия $y(0) = 1$ получается:

$$1 = \frac{2}{3} \arctan e^C \Rightarrow \frac{3}{2} = \arctan e^C \Rightarrow \tan \frac{3}{2} = e^C \Rightarrow C = \ln \tan \frac{3}{2} \Rightarrow C \approx 2.64628$$

из чего следует:

$$y = \frac{2}{3} \arctan e^{2t + \ln \tan \frac{3}{2}}$$

Для нахождения значений функции $y(t)$ разработаем две функции на языке программирования Python: первая реализует нахождение значения функции $y(t)$ от переданного t , вторая вычисляет значения функции $y(t)$ на заданном отрезке (листинг 3).

Листинг 3. Нахождение значений функции

```
def y_solution(t):  
    return (2 / 3) * np.arctan(np.exp(2*t + np.log(np.tan(3/2))))  
  
def accurate(points):  
    t = np.linspace(a, b, points)  
    y = np.zeros(len(t))  
  
    y[0] = y_0  
    for i in range(len(t)):  
        y[i] = y_solution(t[i])  
  
    return t, y
```

Построим графики аналитического и численного решения задачи Коши при заданном $h = 0.5$ (рис. 1).




Рис. 1. Решение задачи Коши. Синяя линия - аналитическое решение, красная - численное решение методом Эйлера

Из лекционного материала нам известно, что абсолютная погрешность приближенного значения a^* есть величина $\Delta(a^*)$ такая, что $\Delta(a^*) = |a - a^*|$, где a - точное значение.

Для нахождения абсолютных погрешностей реализуем функцию на языке Python (листинг 4).

Листинг 4. Нахождение абсолютных погрешностей

```
def abs_dev():
    m = int((b - a) / h)
    _, y_euler = time_integrate(y_0, a, b, h)
    _, y_accurate = accurate(m+1)

    deviations = np.absolute(y_accurate - y_euler)
    return deviations
```

Результатом работы функции стал список абсолютных погрешностей во всех точках $\Delta(\omega_i)$: [0, 0.1113105, 0.17773331].

Теорема о верхней границе глобальной погрешности метода Эйлера, как известно из лекций, формулируется следующим образом:

Пусть функция $f(t_y)$ является липшиц-непрерывной в $D = \{(t_y) \mid t \in [a; b], y \in \mathbb{R}\}$ с константой Липшица L . Пусть существует такое $M > 0$, что $|y''(t)| < M$ для любого $t \in [a; b]$, где $y(t)$ является единственным решением задачи Коши $y' = f(t, y)$, $y(a) = \alpha$. Тогда для последовательности $\{\omega_i\}_{i=0}^m$, сгенерированной методом Эйлера, верно следующее неравенство:

$$|y(t_i) - \omega_i| \leq \frac{hM}{2L}(e^{L(t_i-a)} - 1), \quad i = 0, 1, \dots, m,$$

где $h = \frac{b-a}{m}$

Так как $|y''(t)| < M$, то для определения M необходимо найти вторую производную $y''(t)$. Для нахождения первой и второй производной использовался математический калькулятор WolframAlpha.

$$y' = \frac{4e^{2x} \tan\left(\frac{3}{2}\right)}{3 + 3e^{4x} \tan^2\left(\frac{3}{2}\right)},$$

$$y'' = -\frac{8e^{2x} \tan\left(\frac{3}{2}\right) (-1 + e^{4x} \tan^2\left(\frac{3}{2}\right))}{3 \left(1 + e^{4x} \tan^2\left(\frac{3}{2}\right)\right)^2}$$

График функции второй производной был построен с помощью графического калькулятора Desmos ([рис. 2](#)).




Рис. 2. График значений второй производной

Из рисунка 2 очевидно, что наибольшее по модулю значение на отрезке $[0;1]$ вторая производная принимает в точке 0, и равна в этой точке -0.19 (с учетом округления). Тогда разумно взять $M = 0.20$, и для такого M будет гарантировано $|y''(t)| < M$.

Теперь необходимо найти константу Липшица $L = \max(|y'(t)|)$. Функция первой производной была также построена с помощью графического калькулятора Desmos (рис. 3).




Рис. 3. График значений первой производной

Из рисунка 3 очевидно, что наибольшее значение на отрезке $[0; 1]$ первая производная принимает в точке 0, и равна в этой точке 0.094 (с учетом округления). Тогда разумно взять $L = 0.094$.

Для нахождения границ глобальных погрешностей реализуем функцию на языке программирования Python (листинг 5).

Листинг 5. Нахождение границ глобальных погрешностей

```
def euler_upper_limit():
    M = 0.20
    L = 0.094

    m = int((b - a) / h)
    t = np.linspace(a, b, m + 1)
    return [(h*M)/(2*L)*(math.exp(L*(t[i]-a)) - 1) for i in range(m+1)]
```

Полученные верхние границы глобальной погрешности метода Эйлера: $[0.0, 0.0255968, 0.0524253]$.

Сравним полученные значения абсолютных погрешностей с верхней границей глобальной погрешности метода Эйлера (таблица 1).

ω_i	ω_1	ω_2	ω_3
Абсолютная погрешность	0	0.11131059	0.17773331
Верхняя граница глобальной погрешности	0	0.02431697	0.04980413

Таблица 1. Сравнение погрешностей для $h = 0.5$

В качестве эксперимента уменьшим шаг с 0.5 до 0.1 (рис. 4) и рассмотрим значения погрешностей для данной ситуации (таблица 2).




Рис. 4. Решение задачи Коши. Синяя линия - аналитическое решение, красная - численное решение методом Эйлера

ω_i	ω_1	ω_2	ω_3	ω_4	ω_5	...	ω_9	ω_{10}	ω_{11}
Абс.	0	0.0196	0.0240	0.0228	0.0200	...	0.0095	0.0078	0.0063
Глоб.	0	0.0009	0.0019	0.0028	0.0038	...	0.0078	0.0089	0.0099

Таблица 2. Сравнение погрешностей для $h = 0.1$