

$$(4) N_i^1 = \left( \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i} \right) N_i^0(t) + \left( \frac{t_{i+2} - t}{t_{i+2} - t_{i+1}} \right) N_{i+1}^0(t)$$

$$= \left( \frac{t-1}{1+1-1} \right) N_1^0(t) + \left( \frac{1+2-t}{1+2-1-1} \right) N_{1+1}^0(t)$$

$$= (t-1) N_1^0(t) + (2+1-t) N_{1+1}^0(t)$$

Smallest reasonable number of nodes for first order spline is 2 so

$$N_0^1(t) = t N_0^0 + (2-t) N_1^0(t)$$

$$= \begin{cases} t, & t \in [0, 1[ \\ 2-t, & t \in [1, 2[ \end{cases} \quad \text{1st order spline}$$

$$N_1^1(t) = (t-1) N_1^0(t) + (2+1-t) N_2^0(t)$$

$$= \begin{cases} t-1, & t \in [1, 2[ \\ 3-t, & t \in [2, 3[ \end{cases}$$

$$N_2^1(t) = (t-2) N_2^0(t) + (2+2-t) N_3^0(t)$$

$$= \begin{cases} t-2, & t \in [2, 3[ \\ 4-t, & t \in [3, 4[ \end{cases}$$



$$(4) \quad N_i^2(t) = \left( \frac{t-t_i}{t_{i+2}-t_i} \right) N_i'(t) + \left( \frac{t_{i+3}-t}{t_{i+2}-t_{i+1}} \right) N_{i+1}'(t)$$

$$= \left( \frac{t-t_i}{t_{i+2}-t_i} \right) \left[ \left( \frac{t-t_i}{t_{i+1}-t_i} \right) N_i^0 + \left( \frac{t_{i+2}-t}{t_{i+2}-t_{i+1}} \right) N_{i+1}^0 \right] +$$

$$+ \left( \frac{t_{i+3}-t}{t_{i+2}-t_{i+1}} \right) \left[ \left( \frac{t-t_{i+1}}{t_{i+2}-t_{i+1}} \right) N_{i+1}^0 + \left( \frac{t_{i+3}-t}{t_{i+3}-t_{i+2}} \right) N_{i+2}^0 \right]$$

$$= \frac{(t-t_i)^2}{(t_{i+2}-t_i)(t_{i+1}-t_i)} N_i^0 + \frac{(t-t_i)(t_{i+2}-t)}{(t_{i+2}-t_i)(t_{i+1}-t_i)} N_{i+1}^0 +$$

$$+ \frac{(t_{i+3}-t)(t-t_{i+1})}{(t_{i+2}-t_{i+1})^2} N_{i+1}^0 + \frac{(t_{i+3}-t)^2}{(t_{i+2}-t_{i+1})(t_{i+3}-t_{i+2})} N_{i+2}^0$$

$$N_0^2(t) = \frac{t^2}{(2-0)(1-0)} N_0^0 + \frac{t(2-t)}{(2-0)(2-1)} N_1^0 + \frac{(3-t)(t-1)}{(2-1)^2} N_{i+1}^0 +$$

$$+ \frac{(3-t)^2}{(2-1)(3-2)} N_2^0$$

$$= \frac{t^2}{2} N_0^0 + \left( t - \frac{t^2}{2} + 3t - \frac{t^2}{2} - 3 - t \right) N_1^0 + \left( \frac{9}{2} - 3t + \frac{t^2}{2} \right) N_2^0$$

$$= \frac{t^2}{2} N_0^0 + (-t^2 + 3t - 3) N_1^0 + \left( \frac{t^2}{2} - 3t + \frac{9}{2} \right) N_2^0$$

$$= \begin{cases} \frac{t^2}{2} & t \in [0, 1] \\ -t^2 + 3t - 3 & t \in [1, 2] \\ \frac{t^2}{2} - 3t + \frac{9}{2} & t \in [2, 3] \end{cases}$$

2nd order spline



④

$$N_0^3 = \frac{x}{3} N_0^2 + \frac{4-x}{4-1} N_1^2$$

$$= \frac{x}{3} \cdot \left( \frac{x}{2} N_0^1(t) + \frac{3-x}{3-1} N_1^1 \right) + \frac{4-x}{3} \left( \frac{x-1}{2-1} N_1^1 + \frac{4-x}{3} N_2^1 \right)$$

$$= \frac{x^2}{6} \left( \frac{x}{1} N_0^0(t) + \frac{2-x}{2-1} N_1^0(t) \right) + \frac{3x-x^2}{6} \left( \frac{x-1}{2-1} N_1^0 + \frac{3-x}{3-2} N_2^0 \right) +$$

$$+ \frac{4x-4-x^2+x}{6} \left( \frac{x-1}{2-1} N_0^0(t) + \frac{3-x}{3-2} N_2^0(t) \right) +$$

$$+ \frac{16-8x+x^2}{9} \left( \frac{x-2}{3-2} N_2^0 + \frac{4-x}{4-3} N_3^0(t) \right)$$

$$= \frac{x^3}{6} N_0^0 + \frac{2x^2-x^3}{6} N_1^0 + \frac{3x^2-3x-x^3+x^2}{6} N_1^0 + \frac{9x-7x^2-3x^2+x^3}{6} N_2^0 +$$

$$+ \frac{4x^2-4x-x^3+x^2-3x+4+x^2-x}{6} N_0^0 + \frac{12x-4x^2-12+4x-3x^2+x^3+3x-x^2}{6} N_2^0 +$$

$$+ \frac{16x-8x^2+x^3-32+16x-2x^2}{9} N_2^0 + \frac{64-16x-32x+8x^2+4x^2-x^3}{9} N_3^0$$

$$= \left( \frac{x^3}{6} - \frac{x^3}{6} + x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{4}{6} \right) N_0^0 + \left( -\frac{x^3}{6} + \frac{2}{3}x^2 - \frac{1}{2}x \right) N_1^0 +$$

$$+ \left( \frac{x^3}{6} - x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{x^3}{6} - \frac{7}{6}x^2 + \frac{19}{6}x - 2 + \frac{x^3}{9} - \frac{10}{9}x^2 + \frac{32}{9}x - \frac{32}{9} \right) N_2^0 +$$

$$+ \left( -\frac{x^3}{9} + \frac{4}{9}x^2 - \frac{16}{9}x + \frac{64}{9} \right) N_3^0$$

$$= \begin{cases} x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{4}{6} & x \in [0, 1[ \\ -\frac{x^3}{6} + \frac{2}{3}x^2 - \frac{1}{2}x & x \in [1, 2[ \\ \frac{4}{9}x^3 - \frac{59}{18}x^2 + \frac{74}{9}x - 2 & x \in [2, 4[ \\ -\frac{x^3}{9} + \frac{4}{9}x^2 - \frac{16}{9}x + \frac{64}{9} & x \in [4, 5[ \end{cases}$$