



Caramujo-Africano: identificação, riscos e controle

Relatório técnico-científico sobre a espécie exótica invasora
Achatina fulica no Brasil

Data: julho de 2026

Local: Inajá, Paraná — Brasil

Elaboração: Zo Computer · Ecossistema de Agentes de Aleksandro

Versão: 1.0

Sumário

❖ 1. Resumo Executivo

❖ 2. Introdução

- ❖ 2.1 O que é o caramujo-africano
- ❖ 2.2 Origem geográfica e introdução no Brasil
- ❖ 2.3 Por que é uma espécie exótica invasora

❖ 3. Identificação

- ❖ 3.1 Características morfológicas
- ❖ 3.2 Diferenças entre caramujo-africano e espécies nativas

❖ 4. Ciclo de Vida e Reprodução

❖ 5. Distribuição e Presença no Brasil

❖ 6. Riscos à Saúde

- ❖ 6.1 Angiostrongilíase
- ❖ 6.2 Outros riscos
- ❖ 6.3 Formas de transmissão e prevenção

❖ 7. Impactos Ambientais e Econômicos

❖ 8. Prevenção e Controle

- ❖ 8.1 Medidas preventivas
- ❖ 8.2 Procedimento de coleta e descarte
- ❖ 8.3 Métodos recomendados e não recomendados

❖ 9. O que Não Fazer

❖ 10. Mitos e Verdades

❖ 11. Plano de Ação

- ❖ 11.1 Passo a passo para moradores
- ❖ 11.2 Para escolas e instituições públicas
- ❖ 11.3 Lista de verificação para inspeção de terrenos

- ❖ **12. Conclusão**
- ❖ **13. Perguntas Frequentes**
- ❖ **14. Referências**

1. RESUMO EXECUTIVO

O caramujo-africano (*Achatina fulica*) é uma das cem piores espécies exóticas invasoras do mundo, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Introduzido no Brasil na década de 1980 como alternativa comercial ao escargot, o molusco estabeleceu-se em praticamente todos os estados brasileiros, causando preocupações de ordem ambiental, sanitária e econômica.

Este relatório apresenta uma análise abrangente baseada em fontes oficiais — Ministério da Saúde, Fiocruz, Secretarias Estaduais de Saúde, IBAMA, ICMBio, universidades e literatura científica revisada por pares. São abordados os aspectos de identificação, ciclo de vida, riscos à saúde, impactos ambientais, prevenção, controle e descarte seguro, com linguagem acessível ao público geral e rigor técnico.

Atualização: julho de 2026.

O que você precisa saber

- ❖ **Identifique corretamente:** o caramujo-africano tem concha alongada, pontiaguda, com faixas escuras e mais de 5 giros. Não o confunda com caramujos nativos brasileiros.
- ❖ **Risco sanitário:** pode hospedar vermes que causam angiostrongilíase (meningite eosinofílica e angiostrongilíase abdominal). Casos humanos no Brasil são raros, mas existem.
- ❖ **Nunca toque com as mãos nuas:** use luvas ou sacos plásticos para coletar.
- ❖ **Não use sal ou venenos:** o método correto é coleta manual, imersão em água sanitária e enterrio com cal virgem.
- ❖ **Não mate caramujos nativos:** espécies do gênero *Megalobulimus* são protegidas e importantes para o equilíbrio ecológico.
- ❖ **Comunique à vigilância sanitária** do seu município em caso de infestações.

2. INTRODUÇÃO

2.1 O que é o caramujo-africano

O caramujo-africano, também conhecido como caramujo-gigante-africano, é um molusco gastrópode terrestre da família Achatinidae. Seu nome científico é *Achatina fulica* (Bowdich, 1822), embora classificações mais recentes o tratem como *Lissachatina fulica*. É um dos maiores caramujos terrestres do mundo, podendo atingir até 20 cm de comprimento e 400 gramas (Secretaria da Saúde do Paraná, 2024; Norma Técnica SMS-SP, 2019).

2.2 Origem geográfica e introdução no Brasil

Nativa da África Oriental (regiões da Tanzânia, Quênia, Somália e Moçambique), a espécie foi introduzida em diversos países ao redor do mundo, principalmente para consumo humano ou como animal de estimação. Está presente em mais de 50 países, especialmente em regiões tropicais e subtropicais (Fischer & Costa, 2010).

No Brasil, a introdução ocorreu no final da década de 1980, mais precisamente em 1988, durante uma feira agropecuária em Curitiba, Paraná. Criadores apresentaram o molusco como uma alternativa econômica ao escargot europeu (*Helix aspersa*), por ser maior, mais rústico e de crescimento mais rápido. A iniciativa, no entanto, foi um fracasso comercial. Sem predadores naturais e com alta capacidade reprodutiva, os animais escaparam do cativeiro ou foram deliberadamente soltos, estabelecendo populações em todo o território nacional (Panorama do Caramujo Gigante Africano no Paraná; Fischer & Costa, 2010; Fiocruz, 2007).

Atenção

A introdução do caramujo-africano no Brasil é um exemplo clássico de como a introdução deliberada de espécies exóticas sem estudos de impacto ambiental pode gerar consequências ecológicas e sanitárias de longa duração.

2.3 Por que é considerado uma espécie exótica invasora

A *Achatina fulica* consta na lista das "100 Worst Invasive Alien Species" da IUCN (Lowe et al., 2004). É considerada invasora porque:

- ◆ **Alta capacidade reprodutiva:** hermafrodita, produz centenas de ovos por postura;
- ◆ **Amplitude ecológica:** adapta-se a diversos ambientes urbanos, rurais e naturais;
- ◆ **Ausência de predadores naturais** no Brasil;
- ◆ **Competição com espécies nativas** por alimento e habitat;
- ◆ **Potencial vetor de doenças** (angiostrongilíase);
- ◆ **Danos à agricultura** e a hortas domésticas.

3. IDENTIFICAÇÃO

3.1 Características morfológicas

A identificação correta é o primeiro passo para o manejo adequado. A tabela abaixo resume as principais características do caramujo-africano.

Tabela 1 — Características de identificação do caramujo-africano (*Achatina fulica*)

CARACTERÍSTICA	DESCRIÇÃO
Nome científico	<i>Achatina fulica</i> Bowdich, 1822 (syn. <i>Lissachatina fulica</i>)
Tamanho da concha	Até 20 cm de comprimento (média 10–15 cm)
Forma da concha	Alongada, cônica, pontiaguda na extremidade, com 7 a 9 giros
Coloração da concha	Marrom escuro com faixas longitudinais mais claras (creme ou amareladas)
Corpo (parte mole)	Marrom-acinzentado, textura úmida e rugosa
Peso	Até 400 gramas
Abertura da concha	Ovalada, borda afiada e fina
Hábitos	Noturno e crepuscular. Durante o dia, abriga-se em locais úmidos e sombreados
Alimentação	Fitófaga generalista — folhas, frutos, hortaliças, fungos, líquens, cascas de árvores e até pequenos animais mortos
Comportamento em estiagem	Entra em estivação: sela a abertura da concha com película de muco seco (epifragma) e permanece inativo por semanas ou meses

Fontes: Secretaria da Saúde do Paraná; Norma Técnica SMS-SP (2019); ICMBio — Boletim Informativo (2024); Secretaria de Saúde de Goiás — Nota Técnica 006/2013.



Figura 1 — Caramujo-africano (*Achatina fulica*). Observe a concha alongada, cônica, com faixas marrons e creme. Fonte: Zootecnia Brasil (imagem de divulgação).

3.2 Diferenças entre caramujo-africano e espécies nativas brasileiras

No Brasil, existem caramujos nativos do gênero *Megalobulimus* (conhecidos como "caramujo-do-mato" ou "aruá-do-mato") que são frequentemente confundidos com o caramujo-africano e mortos por engano. Essa confusão é uma preocupação de biólogos e conservacionistas, pois essas espécies nativas desempenham papéis ecológicos importantes na reciclagem de nutrientes e na dispersão de sementes (G1 — Terra da Gente, 2025; Fischer & Costa, 2010).

⚠ Atenção: não mate caramujos nativos!

Espécies nativas do gênero *Megalobulimus*, *Orthalicus*, *Drymaeus*, *Thaumatococcus* e *Mirinaba* não oferecem os mesmos riscos à saúde que o caramujo-africano. Matá-los por engano prejudica a biodiversidade local.

Tabela 2 — Caramujo-africano versus espécies nativas brasileiras

CARACTERÍSTICA	CARAMUJO-AFRICANO (<i>ACHATINA FULICA</i>)	CARAMUJO NATIVO (<i>MEGALOBULIMUS SPP.</i>)
Forma da concha	Alongada, pontiaguda, mais de 7 giros	Bojuda, "gorda", menos giros (4-5)

CARACTERÍSTICA	CARAMUJO-AFRICANO (<i>ACHATINA FULICA</i>)	CARAMUJO NATIVO (<i>MEGALOBULIMUS SPP.</i>)
Coloração	Marrom escuro com listras creme	Marrom-claro a bege, uniforme
Borda da concha	Afiada, fina	Grossa, arredondada
Tamanho	Grande (até 20 cm)	Médio a grande (até 12 cm)
Corpo (parte mole)	Marrom-acinzentado escuro	Creme-esverdeado claro
Origem	África (exótica/invasora)	Brasil (nativa)
Risco à saúde	Potencial vetor de angiostrongilíase	Baixíssimo risco
Status	Invasora — deve ser controlada	Protegida — deve ser preservada

Fontes: G1 — Terra da Gente (2025); ICMBio — Folder Informativo; Fiocruz (2007); Instituto Horus; Fischer & Costa (2010).

Como diferenciar rapidamente

Caramujo-africano: concha alongada e pontuda, com faixas escuras, borda fina. Parte mole escura.

Caramujo nativo: concha mais "gordinha", arredondada, menos giros, cor mais clara e uniforme. Parte mole clara (creme-esverdeada).


4. CICLO DE VIDA E REPRODUÇÃO

O caramujo-africano é **hermafrodita** — cada indivíduo possui órgãos reprodutivos masculinos e femininos e pode se autofecundar, embora a reprodução cruzada seja mais comum. Essa característica é uma das principais razões de seu sucesso como espécie invasora (Fischer, 2005; Raut & Barker, 2002).

A maturidade sexual é alcançada entre 4 e 6 meses de idade (Mello et al., 2010; Norma Técnica SMS-SP, 2019). Uma vez adulto, o animal pode produzir de **13 a 442 ovos por postura**, dependendo de fatores como tamanho do indivíduo, disponibilidade de alimento e condições ambientais (Raut & Barker, 2002). Há relatos de posturas com até mil ovos em condições excepcionais.

Cada indivíduo adulto pode realizar múltiplas posturas ao longo do ano, especialmente nos períodos quentes e chuvosos. Os ovos são depositados em ninhos escavados no solo, a profundidades de 2 a 10 cm, e eclodem após 7 a 21 dias, dependendo da temperatura e umidade.

Os filhotes recém-eclodidos consomem o cálcio da casca dos ovos e nutrientes do solo antes de emergirem à superfície. O crescimento é rápido: em condições favoráveis, atingem tamanho adulto em 4 a 6 meses. A longevidade pode chegar a 5-6 anos em condições naturais (Saúde PR, 2024; Fischer, 2005).



Esquema simplificado do ciclo de vida. Em condições favoráveis (clima quente e úmido, abundância de alimento), o ciclo completo pode se repetir várias vezes ao ano.

Condições que favorecem a proliferação

- ❖ **Clima quente e úmido:** períodos chuvosos e temperaturas entre 20 °C e 30 °C;
- ❖ **Ambientes alterados:** terrenos baldios, quintais com entulho, acúmulo de lixo orgânico;
- ❖ **Disponibilidade de alimento:** hortas, jardins, restos de comida, vegetação densa;
- ❖ **Saneamento básico precário:** áreas sem coleta de esgoto e com acúmulo de resíduos (Penedo/AL study, SciELO);
- ❖ **Ausência de predadores naturais** no Brasil.

5. DISTRIBUIÇÃO E PRESENÇA NO BRASIL

Após sua introdução no Paraná em 1988, o caramujo-africano dispersou-se rapidamente por todo o território nacional. Atualmente, há registros de ocorrência em **todos os estados brasileiros**, sendo mais frequente nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste (Fischer & Costa, 2010; JESH, 2024; TCC UNIBRA, 2023).

A espécie é especialmente abundante em áreas urbanas, onde encontra condições ideais: abundância de resíduos orgânicos, locais para abrigo (entulho, jardins, terrenos baldios) e microclima favorável. Estudos realizados em Alfenas (MG), Penedo (AL), Várzea Grande (MT), São Paulo (SP) e Curitiba (PR) confirmam a consolidação da espécie em ambientes urbanos e periurbanos (JESH, 2024; SciELO).

Em áreas naturais, a espécie é encontrada em bordas de matas, áreas de restinga e ilhas. Um estudo na Ilha Rasa (PR) demonstrou a capacidade da espécie de invadir até mesmo reservas naturais (Fischer, 2005).

Distribuição estimada no Brasil

O caramujo-africano está presente em **26 estados + Distrito Federal**. A região Sul (especialmente o Paraná) apresenta as populações mais antigas e estabelecidas, por ter sido o ponto de entrada. Os estados do Norte e Nordeste têm registros mais recentes, mas a espécie continua em expansão.

6. RISCOS À SAÚDE

6.1 Angiostrongilíase

O principal risco à saúde associado ao caramujo-africano é a transmissão de nematódeos do gênero *Angiostrongylus*, que causam a angiostrongilíase. Existem duas formas principais:

Tabela 3 — Tipos de angiostrongilíase associados ao caramujo-africano

TIPO	AGENTE	DOENÇA	SINTOMAS PRINCIPAIS
Angiostrongilíase abdominal	<i>Angiostrongylus costaricensis</i>	Angiostrongilíase abdominal	Dor abdominal, febre, anorexia, massa abdominal palpável. Pode simular apendicite.
Angiostrongilíase meningoencefálica	<i>Angiostrongylus cantonensis</i>	Meningite eosinofílica	Dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, náuseas, vômitos, formigamento na pele.

Fontes: Norma Técnica SMS-SP (2019); Secretaria da Saúde do Paraná; Fiocruz; Nota Técnica MS nº 30/2022.

Risco possível, comprovado e casos registrados

É essencial fazer a distinção entre os diferentes níveis de evidência:

- ❖ **Risco possível:** o caramujo-africano pode atuar como hospedeiro intermediário de nematódeos do gênero *Angiostrongylus*. Estudos de laboratório e campo já detectaram larvas desses parasitos em exemplares de *A. fulica* no Brasil (Fiocruz, 2007; Norma Técnica SMS-SP, 2019).
- ❖ **Risco comprovado:** a transmissão experimental e a presença de larvas viáveis de *Angiostrongylus* em *A. fulica* já foram demonstradas. A Organização Mundial da Saúde reconhece a angiostrongilíase como doença negligenciada.
- ❖ **Casos registrados no Brasil:** há registros de angiostrongilíase abdominal e meningite eosinofílica no Brasil, mas são considerados **raros**. O Ministério da Saúde, por meio da Nota Técnica nº 30/2022, afirma que "há poucos registros no Brasil" de casos humanos associados ao caramujo-africano.

⚠ Contextualização necessária

Embora o risco exista, é importante evitar alarmismo. A maioria dos caramujos-africanos encontrados em áreas urbanas não está infectada. A transmissão requer a ingestão de larvas do parasito — o que ocorre ao consumir o animal malcozido, vegetais mal lavados ou ao levar as mãos contaminadas à boca.

6.2 Outros riscos

- ❖ **Criadouro do *Aedes aegypti*:** a casca do caramujo-africano pode acumular água parada, servindo como criadouro para o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika (Fiocruz Minas).
- ❖ **Contaminação bacteriana:** como qualquer animal de ambientes úmidos e sujos, pode carregar bactérias em sua superfície (como *Salmonella* e *E. coli*).
- ❖ **Ratos:** infestações de caramujo-africano podem atrair ratos, que se alimentam dos moluscos.

6.3 Formas de transmissão e prevenção

Tabela 4 — Riscos e respectivas medidas preventivas

RISCO	FORMA DE TRANSMISSÃO	MEDIDA PREVENTIVA
Angiostrongilíase	Ingestão de larvas (carne malcozida, vegetais mal lavados, mãos contaminadas)	Usar luvas na coleta; lavar bem hortaliças; cozinhar bem os alimentos
Bactérias na superfície	Contato direto com o muco ou concha	Lavar as mãos após contato; não tocar com as mãos nuas
<i>Aedes aegypti</i>	Água acumulada em conchas vazias	Quebrar ou enterrar conchas vazias; eliminar água parada
Atração de ratos	Caramujos servindo de alimento	Controlar a população de caramujos e vedar a entrada de roedores

✓ Tocar no caramujo causa doença?

Não diretamente. O simples toque em um caramujo-africano não transmite angiostrongilíase. A transmissão requer a ingestão das larvas do parasito. No entanto, é sempre recomendável usar luvas ou sacos plásticos para coleta e lavar bem as mãos após qualquer contato, pois o muco pode conter bactérias ou outros microrganismos.

Cuidados com crianças, animais domésticos, hortas e alimentos

- ❖ Crianças devem ser orientadas a não tocar em caramujos e lavar as mãos após brincar em áreas com vegetação;
- ❖ Cães e gatos podem ingerir caramujos — embora a transmissão da angiostrongilíase canina seja mais associada a outras espécies, é melhor evitar o contato;
- ❖ Hortaliças devem ser bem lavadas e deixadas de molho em água sanitária (1 colher de sopa para 1 litro de água por 15 minutos);
- ❖ Hortas devem ser inspecionadas regularmente;
- ❖ Frutas caídas no chão devem ser descartadas se houver sinais de caramujos na área.

7. IMPACTOS AMBIENTAIS E ECONÔMICOS

Impactos ambientais

O caramujo-africano causa impactos significativos na biodiversidade nativa, atuando principalmente por meio de:

- ❖ **Competição:** disputa alimento e abrigo com espécies nativas de caramujos (especialmente *Megalobulimus* spp.), que apresentam menor capacidade reprodutiva e crescimento mais lento. Em áreas de alta infestação, populações nativas podem diminuir drasticamente (Fischer & Costa, 2010; ICMBio, 2024);
- ❖ **Predação indiscriminada:** alimenta-se de mudas, brotos, folhas e raízes, podendo desestruturar a vegetação nativa em áreas de regeneração;
- ❖ **Alteração do solo:** seus hábitos de escavação e deposição de fezes podem modificar as características do solo;
- ❖ **Desequilíbrio ecológico:** ao atingir altas densidades populacionais, altera as cadeias alimentares locais.

Impactos econômicos

- ❖ **Hortas e jardins:** pode devastar hortas domésticas, jardins ornamentais e canteiros de plantas medicinais em poucas noites;
- ❖ **Agricultura:** causa danos a plantações de hortaliças, legumes, mudas de árvores frutíferas e plantas ornamentais. Não há, no entanto, estatísticas nacionais abrangentes sobre perdas econômicas;
- ❖ **Controle:** programas municipais de controle demandam recursos humanos e materiais das prefeituras e secretarias de saúde, que precisam realizar campanhas educativas, distribuir materiais e orientar a população.

 Dado importante

A *Achatina fulica* é considerada uma praga agrícola em diversos países. No Brasil, embora cause prejuízos localmente significativos, não existem levantamentos nacionais consolidados que quantifiquem o impacto econômico total. Estudos locais indicam que infestações urbanas são o principal problema (Colley & Fischer, 2009; Fischer & Costa, 2010).

8. PREVENÇÃO E CONTROLE

⚠ Base oficial

Este capítulo segue as orientações da **Nota Técnica nº 30/2022** do Ministério da Saúde, da **Instrução Normativa IBAMA nº 73/2005**, da **Norma Técnica SMS-SP (2019)** e das orientações das Secretarias Estaduais de Saúde do Paraná, Goiás e São Paulo.

8.1 Medidas preventivas

A prevenção é a forma mais eficaz de controle. As principais medidas são:

Tabela 5 — Métodos de controle recomendados e não recomendados


TIPO	MÉTODO	RECOMENDADO?	OBSERVAÇÃO
Mecânico	Coleta manual com luvas ou sacos plásticos	✓ Sim	Método principal, seguro e eficaz (IBAMA IN 73/2005; MS NT 30/2022)
Mecânico	Destruição mecânica (pisar/esmagar os animais coletados)	✓ Sim	Dentro do saco plástico, antes do descarte
Químico	Cal virgem sobre os animais após coleta	✓ Sim	Usar com moderação, apenas após a coleta
Químico	Água sanitária (imersão dos animais coletados)	✓ Sim	Solução de 1:1 água sanitária/água
Ambiental	Limpeza de terrenos, remoção de entulho, manutenção de jardins	✓ Sim	Reduz abrigos e alimento disponível
Barreira	Telas e barreiras físicas em hortas	✓ Sim	Previne a entrada em áreas cultivadas
Químico	Sal de cozinha	✗ Não	Contamina o solo, mata vegetação, prejudica outros animais

TIPO	MÉTODO	RECOMENDADO?	OBSERVAÇÃO
Químico	Molusquicidas químicos (venenos)	✗ Não	Só com orientação técnica; tóxico para pessoas, pets e fauna nativa
Biológico	Introdução de predadores exóticos	✗ Não	Pode causar novo desequilíbrio ecológico
Manejo	Queimadas	✗ Não	Proibido por lei; destrói o ambiente
Manejo	Despejar animais vivos em terrenos baldios ou matas	✗ Não	Dissemina a infestação para novas áreas

Fontes: IBAMA IN nº 73/2005; MS Nota Técnica nº 30/2022; SES-GO Nota Técnica nº 06/2013; SMS-SP Norma Técnica (2019); Secretaria da Saúde do Paraná.

8.2 Procedimento seguro de coleta e descarte

O procedimento a seguir é baseado nas recomendações oficiais do Ministério da Saúde (NT 30/2022) e das Secretarias Estaduais de Saúde.



Passo a passo detalhado

- 1. Proteja-se:** Use luvas de borracha ou sacos plásticos nas mãos. Se possível, use máscara e óculos de proteção.
- 2. Identifique:** Confirme que se trata de *Achatina fulica* (concha alongada, pontiaguda, com faixas). Se for nativo, deixe-o em paz.
- 3. Colete:** Com o saco plástico protegendo a mão, recolha os caramujos e coloque-os dentro do próprio saco. Recolha também os ovos (pequenas esferas amareladas/translúcidas).
- 4. Elimine:** Feche bem o saco e esmague os animais (pisando ou com um objeto pesado) para garantir a morte imediata.

- 5. Imersão (opcional):** Em um recipiente separado, prepare uma solução de 1 parte de água sanitária para 1 parte de água. Mergulhe os caramujos por 24 horas.
- 6. Descarte:** Enterre os restos em uma cova de pelo menos 50 cm de profundidade, distante de nascentes e cursos d'água. Cubra com cal virgem e terra.
- 7. Higienização:** Lave bem as mãos e antebraços com água e sabão. Lave as ferramentas utilizadas com água sanitária.



Importante

Nunca descarte caramujos vivos no lixo comum — eles podem sobreviver e se reproduzir no aterro ou lixão. Também não os abandone em terrenos baldios ou áreas verdes.

8.3 Responsabilidades

Tabela 6 — Responsabilidades de moradores e órgãos públicos

RESPONSÁVEL	AÇÃO
Morador / Proprietário	Manter quintal limpo, sem entulho, mato alto ou acúmulo de lixo orgânico
Morador / Proprietário	Coletar e descartar corretamente os caramujos encontrados em sua propriedade
Morador / Proprietário	Inspecionar regularmente hortas, jardins e áreas úmidas
Morador / Proprietário	Orientar crianças e visitantes sobre os procedimentos seguros
Vigilância Sanitária / Zoonoses	Orientar a população sobre identificação e manejo correto
Vigilância Sanitária / Zoonoses	Realizar vistorias em áreas de infestação
Vigilância Sanitária / Zoonoses	Capacitar agentes de saúde para orientação técnica
Secretarias Municipais de Saúde	Coordenar campanhas educativas e mutirões de coleta
Órgãos Ambientais (IBAMA, ICMBio)	Fiscalizar, normatizar e coordenar planos de controle em nível nacional

Fontes: IBAMA IN 73/2005; MS NT 30/2022; Secretarias Estaduais de Saúde.

9. O QUE NÃO FAZER

✗ Práticas proibidas ou desaconselhadas

- ✦ **Não toque com as mãos desprotegidas.** Use luvas ou sacos plásticos.
- ✦ **Não consuma o caramujo-africano.** Mesmo cozido, o risco de contaminação existe e o preparo inadequado pode transmitir parasitos.
- ✦ **Não abandone os animais em outro local.** Isso apenas espalha a infestação.
- ✦ **Não esmague os caramujos no chão sem proteção.** O muco e os resíduos podem contaminar o solo e atrair outros animais.
- ✦ **Não utilize sal.** O sal desidrata o animal, mas contamina o solo, mata a vegetação e pode prejudicar outros animais.
- ✦ **Não use venenos ou molusquicidas químicos sem orientação técnica.** São tóxicos para pessoas, animais domésticos e fauna nativa.
- ✦ **Não mate espécies nativas.** Confira a identificação antes de eliminar qualquer caramujo.
- ✦ **Não coloque caramujos vivos no lixo.** Eles podem sobreviver, reproduzir e espalhar a infestação.
- ✦ **Não faça queimadas.** Além de ser crime ambiental, não é eficaz para o controle do caramujo.

10. MITOS E VERDADES

Tabela 7 — Mitos e verdades sobre o caramujo-africano

#	AFIRMAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	EXPLICAÇÃO
1	Todo caramujo grande é caramujo-africano invasor	MITO	O Brasil possui caramujos nativos de grande porte, como o <i>Megalobulimus</i> spp., que podem atingir até 12 cm. É preciso observar a forma da concha para diferenciar (G1, 2025; ICMBio, 2024).
2	O caramujo-africano pode transmitir meningite	VERDADE (com ressalvas)	Pode transmitir o nematódeo <i>Angiostrongylus cantonensis</i> , causador da meningite eosinofílica. Porém, os casos são raros no Brasil e exigem a ingestão das larvas do parasito (MS NT 30/2022; Fiocruz, 2007).
3	Tocar no caramujo-africano causa doença imediatamente	MITO	O simples contato com a pele não transmite a angiostrongilíase. A transmissão exige ingestão de larvas. No entanto, é recomendável usar luvas e lavar as mãos (Fiocruz, 2007; SMS-SP, 2019).
4	Jogar sal nos caramujos é um método seguro de controle	MITO	O sal desidrata e mata o caramujo, mas contamina o solo, mata a vegetação local e pode prejudicar outros animais. Métodos recomendados são coleta manual e enterrio com cal virgem (IBAMA IN 73/2005).
5	O caramujo-africano foi introduzido no Brasil para substituir o escargot	VERDADE	A espécie foi trazida em 1988 como alternativa econômica ao escargot europeu (<i>Helix aspersa</i>), em uma feira agropecuária em Curitiba (Fischer & Costa, 2010; Fiocruz).
6	Caramujos nativos também transmitem as mesmas doenças	DEPENDE	Embora espécies nativas também possam hospedar parasitos em teoria, o risco é muito menor. O caramujo-africano é mais susceptível a abrigar <i>Angiostrongylus</i> devido à sua origem e

#	AFIRMAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	EXPLICAÇÃO
			características biológicas (G1, 2025; Fischer, 2005).
7	O caramujo-africano pode se autofecundar	VERDADE	É hermafrodita e capaz de autofecundação, o que significa que um único indivíduo pode iniciar uma nova população (Fischer, 2005; Raut & Barker, 2002).
8	O caramujo-africano está presente em todos os estados brasileiros	VERDADE	Há registros de ocorrência nos 26 estados e no Distrito Federal, com maior concentração nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste (JESH, 2024; TCC UNIBRA, 2023).
9	Cães e gatos podem pegar angiostrongilíase dos caramujos	VERDADE (parcial)	Outras espécies de <i>Angiostrongylus</i> podem afetar cães (<i>A. vasorum</i>), mas a transmissão pelo caramujo-africano é menos documentada. Ainda assim, evite que pets tenham contato com os caramujos (Colley & Fischer, 2009).
10	O melhor controle é eliminar todos os caramujos com veneno	MITO	O uso de molusquicidas sem orientação técnica é perigoso e ineficaz a longo prazo. O controle integrado (coleta manual + manejo ambiental + educação) é a abordagem correta (MS NT 30/2022; IBAMA IN 73/2005).

11. PLANO DE AÇÃO

11.1 Passo a passo para moradores

1. **Faça uma vistoria** no seu quintal, jardim, horta e áreas úmidas (caixas de inspeção, canaletas, pilhas de tijolos).
2. **Identifique corretamente** os animais encontrados usando as tabelas deste relatório.
3. **Elimine abrigos:** remova entulho, telhas, madeiras acumuladas, folhas secas e lixo orgânico.
4. **Mantenha o gramado aparado** e a vegetação rasteira controlada.
5. **Colete os caramujos** usando luvas ou sacos plásticos, preferencialmente ao entardecer ou após chuvas.
6. **Descarte corretamente:** esmague os animais dentro do saco fechado, adicione cal virgem ou água sanitária e enterre em cova funda.
7. **Inspecione hortaliças** antes de consumir. Lave bem verduras e legumes.
8. **Eduque as crianças** sobre os riscos e a importância de não tocar nos animais.
9. **Comunique à vigilância sanitária** do seu município se a infestação for grande.
10. **Repita o processo** quinzenalmente, especialmente na primavera e no verão.

11.2 Para escolas e instituições públicas

- 💡 **Realize campanhas educativas** com alunos, professores e funcionários;
- 💡 **Promova mutirões de limpeza** e coleta no entorno da instituição;
- 💡 **Utilize o tema** em aulas de ciências, biologia e educação ambiental;
- 💡 **Estabeleça parcerias** com a Vigilância Sanitária, Zoonoses ou Secretaria de Meio Ambiente do município;
- 💡 **Crie um "dia do caramujo"** para vistoria coletiva do terreno;
- 💡 **Distribua folders** informativos para a comunidade;
- 💡 **Estimule a participação dos pais** nas ações de controle.

11.3 Lista de verificação para inspeção de terrenos

Checklist de inspeção quinzenal

-  ☐ Vistoriei áreas com acúmulo de entulho, madeiras e telhas
-  ☐ Vistoriei caixas de inspeção, canaletas e ralos
-  ☐ Vistoriei hortas, canteiros e jardins
-  ☐ Vistoriei pilhas de folhas secas e composteiras
-  ☐ Vistoriei muros e cercas com vegetação densa
-  ☐ Vistoriei embaixo de vasos de plantas e bancadas
-  ☐ Verifiquei se há ovos (esferas amareladas) no solo
-  ☐ Identifiquei corretamente os caramujos encontrados
-  ☐ Usei luvas ou sacos plásticos para a coleta
-  ☐ Eliminei os animais dentro do saco fechado
-  ☐ Enterrei os restos em cova funda com cal virgem
-  ☐ Lavei bem as mãos e ferramentas após o manuseio
-  ☐ Não matei caramujos nativos (*Megalobulimus*)
-  ☐ Não usei sal, venenos ou produtos proibidos
-  ☐ Não abandonei caramujos em outros locais
-  ☐ Não coloquei caramujos vivos no lixo comum
-  ☐ Orientei crianças e familiares sobre os cuidados
-  ☐ Lavei bem hortaliças e frutas antes de consumir
-  ☐ Comuniquei à vigilância sanitária (se necessário)

12. CONCLUSÃO

O caramujo-africano (*Achatina fulica*) representa um desafio concreto para a saúde pública, a agricultura e a conservação da biodiversidade no Brasil. Sua presença em praticamente todo o território nacional, sua alta capacidade reprodutiva e a ausência de predadores naturais fazem dele uma espécie exótica invasora de difícil erradicação, mas passível de controle por meio de ações coordenadas e continuadas.

As evidências científicas disponíveis indicam que:

- ❖ O risco à saúde existe, mas é baixo quando comparado a outros problemas sanitários do país. Casos de angiostrongilíase são raros no Brasil;
- ❖ O método mais eficaz de controle é a **coleta manual segura** aliada ao **manejo ambiental** (eliminação de abrigos e alimentos);
- ❖ A **educação da população** é a ferramenta mais importante para o controle sustentável;
- ❖ Caramujos nativos brasileiros são frequentemente mortos por engano, o que agrava o impacto ecológico da invasão;
- ❖ Não existe "solução mágica" — sal, venenos e queimadas são contraproducentes e perigosos.

O controle do caramujo-africano depende da participação ativa de moradores, escolas, poder público e instituições de pesquisa. Com informação correta e ações consistentes, é possível conviver com a espécie minimizando seus impactos.

"O caramujo-africano é uma das cem piores espécies invasoras do mundo — mas a falta de informação é um problema que podemos resolver."

13. PERGUNTAS FREQUENTES

1. O caramujo-africano pode matar uma pessoa?

Não diretamente. O risco está nas doenças que ele pode transmitir (angiostrongilíase), que são tratáveis quando diagnosticadas. Não há registro de óbito por angiostrongilíase diretamente associado ao caramujo-africano no Brasil (MS NT 30/2022).

2. Posso criar caramujo-africano como animal de estimação?

Não é recomendado. A espécie é exótica invasora e sua criação é proibida sem autorização dos órgãos ambientais competentes (IBAMA IN 73/2005).

3. É verdade que o caramujo-africano ataca plantações?

Sim. Alimenta-se de grande variedade de vegetais, podendo causar prejuízos em hortas, pomares e lavouras.

4. Como sei se um caramujo que encontrei é o africano?

Verifique a concha: se for alongada, com mais de 5-7 giros, pontiaguda na ponta, com faixas marrons e creme, é muito provável que seja *Achatina fulica*. Veja a Tabela 2 para comparação com espécies nativas.

5. O que fazer se meu cachorro comer um caramujo-africano?

Procure um veterinário. Embora o risco de transmissão seja baixo, é melhor avaliar o animal profissionalmente.

6. Preciso notificar a prefeitura se encontrar caramujos?

Sim, especialmente se houver grande quantidade. A Vigilância Sanitária ou o Centro de Controle de Zoonoses do seu município deve ser informado para que possam orientar e, se necessário, intervir.

7. O sal mata o caramujo-africano?

Sim, mas não é recomendado. O sal contamina o solo, mata a vegetação e prejudica outros animais. Use os métodos recomendados pelas autoridades.

8. Posso usar o caramujo como isca para pesca?

Não é recomendado. O manuseio aumenta o risco de contato com possíveis parasitos, e o descarte inadequado das sobras pode espalhar a infestação.

9. O caramujo-africano aparece só em época de chuva?

É mais ativo em períodos quentes e úmidos, mas pode ser encontrado o ano todo. Em épocas secas ou frias, ele se enterra ou sela a concha (estivação).

10. Existe algum predador natural do caramujo-africano no Brasil?

Não existem predadores especializados. Alguns animais (sabiás, gambás, ratos, lagartos) podem se alimentar de filhotes ou ovos, mas não controlam populações adultas.

14. REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Nota Técnica nº 30/2022-CGZV/DEIDT/SVS/MS** — Orientações quanto ao correto manejo, descarte e controle do molusco gastrópode, terrestre, exótico-invasor *Achatina fulica* no Brasil. Brasília, 2022. Disponível em: dive.saude.sc.gov.br
2. BRASIL. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). **Instrução Normativa nº 73, de 18 de agosto de 2005**. Dispõe sobre a metodologia para controle e eliminação do caramujo *Achatina fulica*. Brasília, 2005. Disponível em: ibama.gov.br
3. SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal da Saúde. Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA). **Norma Técnica para a Vigilância e Controle de *Achatina fulica* no Município de São Paulo — 2019**. São Paulo, 2019. Disponível em: docs.bvsalud.org
4. PARANÁ. Secretaria da Saúde. **Caramujo Africano (*Achatina fulica*)**. Página informativa. Curitiba, 2024. Disponível em: saude.pr.gov.br
5. GOIÁS. Secretaria de Estado da Saúde. Superintendência de Vigilância em Saúde. **Nota Técnica nº 006/2013** — Instruções para realização da Vigilância e Manejo do Caramujo Africano *Achatina fulica* em Goiás. Goiânia, 2013. Disponível em: goias.gov.br/saude
6. FISCHER, M. L.; COSTA, L. C. M. (Orgs.). **O Caramujo Gigante Africano *Achatina fulica* no Brasil**. Curitiba: PUCPR, 2010. Disponível em: ResearchGate
7. FISCHER, M. L. Caracterização da população de *Achatina fulica* Bowdich, 1822 (Mollusca-Achatinidae) na Ilha Rasa, Paraná, Brasil. **Brazilian Journal of Biology**, v. 65, n. 3, 2005. Disponível em: SciELO
8. FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (Fiocruz). Instituto Oswaldo Cruz. **Caramujo africano: quais os reais riscos para a população?** Informe Rede, 2007. Disponível em: ioc.fiocruz.br
9. FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (Fiocruz). **Educare — Caracol gigante africano: como combater o molusco invasor e prevenir doenças**. LHMM/Fiocruz Minas e LMALAC/Fiocruz Rio. Disponível em: educare.fiocruz.br
10. FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (Fiocruz) Minas. **Caramujos podem transmitir doenças**. Disponível em: minas.fiocruz.br
11. LOWE, S. et al. **100 of the World's Worst Invasive Alien Species**. IUCN/SSC Invasive Species Specialist Group, 2004.
12. RAUT, S. K.; BARKER, G. M. *Achatina fulica* Bowdich, 1822. In: BARKER, G. M. (Ed.). **Molluscs as Crop Pests**. Wallingford: CABI, 2002. p. 55–86.

13. COLLEY, E.; FISCHER, M. L. Avaliação dos problemas enfrentados no manejo do caramujo gigante africano *Achatina fulica* no Brasil. **Revista de Gestão Costeira Integrada**, v. 9, n. 2, 2009. Disponível em: ResearchGate
14. BOAVENTURA, M. F. F.; THIENGO, S. C.; MONTEIRO, S. Infestações por caramujo africano (*Achatina fulica*): análise de conteúdo das matérias jornalísticas e de materiais educativos sobre o tema no Rio de Janeiro, Brasil. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 11, n. 2, 2011. Disponível em: periodicos.ufmg.br
15. ICMBio. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. **Folder Informativo — Caramujo Gigante Africano (*Lissachatina fulica*)**. Núcleo Urbano de Carajás, 2024. Disponível em: gov.br/icmbio
16. MELLO, M. C. et al. Cultivo e manutenção da praga agrícola *Achatina fulica* em laboratório. **Revista Argumento**, v. 12, n. 1, 2010. Disponível em: revistas.anchieta.br
17. SILVA, N. B. **Após três décadas da introdução do caramujo africano *Achatina fulica* no Brasil: revisão crítica das estratégias de controle**. Dissertação (Mestrado) — UFRRJ, 2017. Disponível em: rima.ufrrj.br
18. SILVA, M. A. et al. Conhecimento Populacional Sobre o Caramujo Africano (*Achatina fulica*). **REDVET**, v. 18, 2017. Disponível em: redalyc.org
19. SILVA, J. F. et al. Ocorrência e distribuição de *Achatina fulica* em zona urbana de Penedo, Alagoas, Brasil. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 24, n. 6, 2019. Disponível em: SciELO
20. JORNAL NACIONAL. Dispersão do Caramujo Africano (*Lissachatina fulica*) no Brasil e o registro de ocorrência em Alfenas/MG. **Journal of Education Science and Health**, 2024. Disponível em: bio10publicacao.com.br/jesh
21. COSTA, L. M. T. S. et al. **Riscos ambientais e à saúde humana associados ao caramujo africano *Achatina fulica* no Brasil**. TCC (Bacharelado em Ciências Biológicas) — UNIBRA, Recife, 2023. Disponível em: grupounibra.com
22. G1 — TERRA DA GENTE. **É tudo caracol? Como diferenciar caracóis nativos do caramujo africano invasor**. 17 fev. 2025. Disponível em: g1.globo.com
23. INSTITUTO HORUS. **Ficha da espécie invasora: *Achatina fulica***. Disponível em: institutohorus.org.br
24. PROJETO REFLORIR. **Diferença entre as espécies nativas e exóticas de caramujos gigantes**. Disponível em: projetoreflorir.eco.br
25. PREFEITURA DE CÁCERES (MT). **Nota Orientativa — Caramujo Africano: informações sobre a espécie, manejo correto e controle**. 2024. Disponível em: caceres.mt.gov.br