问题三模型建立与求解

问题三分析

问题三要求以啤酒风格为条件生成合理的化合物谱，给出生成样本的感官画像，并将源啤酒迁移到目标风格，同时控制缺陷化合物不恶化。该问同时涉及条件联合分布估计、感官映射和受约束搜索三个环节。

数据包含250款啤酒、231个化学及理化字段和22个风格标签；Tripel、Kriek、Lambic分别只有28、10、11个样本。本文保留字段原尺度和观测状态，采用风格内经验边缘与收缩相关结构生成联合谱，并把未知源浓度与未知阈值从缺陷通过分母中分离。

问题三模型

数据口径与预处理

以beer作为唯一连接键，beer_id不参与建模。保留原始缺失；通过正值成对比对识别log10字段和原尺度字段，其余字段保持附件存储尺度。生成与迁移均在训练折内完成分位、尺度、相关阵和边界计算。

对象	处理规则	保留的边界
主键	按beer对齐化学谱、风格和感官数据	beer_id不连接、不建模
化学字段	按字段级核验结果保留存储尺度	不统一指数化
缺失/地板	保留缺失掩码和地板状态	未知浓度不作为安全上限
感官画像	使用最终感官模型	0–6仅作经验映射
迁移约束	已知直接浓度逐项比较	未知不计入通过分母

表1 问题三数据口径与处理规则

风格条件收缩Copula

将风格内字段按平均秩映射到标准正态空间：z□□ = Φ□□((r□□□0.5)/n□)。在潜在空间中对协方差向总体对角结构收缩，得到相关阵R□；从N(0,R□)采样后按训练风格经验边缘反变换。该模型保留非正态边缘并稳定估计依赖结构。

感官画像与相对等级

每个生成谱通过第一问最终感官模型得到50维标准化预测，再按训练折经验分布作单调0–6映射。每种风格生成300份谱，图中误差棒表示合成样本第10–90百分位，不是均值置信区间。

维度	Tripel	Kriek	Lambic
酒精感	4.4	0.9	1.1
苦味	3.9	0.6	1.1
酒花味	3.7	0.8	1.6
4VG	4.6	0.8	1.3
酸度	3.0	5.6	5.6
乳酸感	2.9	5.6	5.7

表2 三种风格生成样本的六维相对画像均值

受约束迁移

源谱x□到目标端点a沿x(λ)=(1□λ)x□+λa搜索。对可核验的DMS、双乙酰、4VG和trans-2-nonenal只施加不升约束；未知源值不填补为安全上限。目标接近用目标风格距离衡量，谱改动用标准差归一化RMS衡量。

问题三求解

求解步骤包括：训练折内拟合边缘和相关结构；统一外层重复比较生成方法；全数据生成三种风格画像；固定候选池和路径搜索迁移；最后按化学可比性、支持域和感官代理稳定性分级。

生成质量与模型选择

收缩Copula在稳健尺度下的W1为0.4762、联合energy为0.5813、留出覆盖率为0.5580、对数离散误差为0.2475。局部混合的覆盖率更高，但离散误差也增加；基函数邻域混合在Lambic上出现距离退化。因此保留风格条件收缩Copula。

方法	W1↓	energy↓	覆盖率↑	离散误差↓
风格收缩Copula	0.4762	0.5813	0.5580	0.2475
整行局部混合	0.4740	0.5772	0.6599	0.2925
PCA邻域混合	0.4768	0.5805	0.6660	0.3026
基函数邻域混合	0.4786	0.5834	0.6580	0.3014

表3 生成方法的稳健尺度比较




图1 风格条件生成方法在外层重复验证中的分布保真与多样性

三风格感官画像

Tripel在酒精感、苦味、酒花味和4VG上较高，Kriek与Lambic在酸度和乳酸感上较高。4VG的外层解释度约为0.255，只作较弱描述证据，画像不能替代真实品评。




图2 三目标风格生成样本的相对感官画像

跨风格迁移与缺陷约束

33组源—目标任务中，固定最小改动规则得到29条有谱候选：2条进入待实测统计候选，26条直接化学证据不足，1条感官代理不稳定，4组未找到搜索可行谱。两条候选均来自源啤酒230，分别指向Tripel和Kriek；目标距离分别下降38.36%和37.36%，谱RMS改动分别为0.4862和0.5822。两条候选均未取得物理安全认证。

目标风格	目标距离下降	谱RMS改动	代理模型状态	化学状态
Tripel	38.36%	0.4862	两模型预测不升	仍有待核验状态
Kriek	37.36%	0.5822	两模型预测不升	仍有待核验状态

表4 两条待实测统计候选的迁移结果




图3 跨风格迁移候选的目标接近程度与证据状态

模型检验与结果讨论

生成比较采用同一外层重复和折内计算，近训练复制率为0，完整谱重构误差处于10□□□量级。覆盖率提高伴随离散误差增加，说明覆盖不能单独作为生成质量结论。地板感知边缘、共享低秩、神经残差和局部双锚点迁移均未提供足以替换收缩Copula的综合证据。

迁移中的“预测不升”只针对冻结感官预测器；Stale hops的外层解释度约0.03、平均绝对误差约0.30 z，预测变化不能直接等同于真实感官改善。已有数据还缺少完整配方、发酵工艺和新实测，因此两条候选应作为待补测的统计设计，不应写成可直接执行的酿造处方或物理安全结论。