100年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、醫事放射師、呼吸治療師、獸醫師考試暨牙醫師考試分試考試

代　　號：3303
類科名稱：牙醫師（二）、牙醫師
科目名稱：牙醫學(三)（包括齒內治療學、牙體復形學、牙周病學等科目及其相關臨床實例與醫學倫理）
考試時間：1小時　　座號：_____

1.有關於內吸收（internal resorption）的敘述，下列何者正確？
A.早期由外觀即可發現
B.可發生在牙根的任何部位
C.持續進行
D.病人有疼痛現象

2.下列關於叩診（Percussion）的敘述，何者正確？
A.可以精確診斷出不可逆性牙髓炎
B.正常牙齒和患慢性根尖牙周炎症的牙齒有不同反應
C.可以診斷出有無急性根尖牙周炎
D.必須要出點力否則診斷不易

3.關於電髓活性測試（electric pulp test），下列何種情況可能有假陽性反應（false positive）？
A.服用某些藥物或飲酒
B.未發育完成的牙齒
C.金屬復形物影響
D.受撞擊的牙齒

4.下列有關牙髓神經纖維之描述何者正確？
A.Aδ fiber與C fiber都具有髓鞘
B.Aδ fiber之直徑較C fiber大
C.C fiber神經傳導的速度較快
D.C fiber會產生牙髓的尖銳（sharp）疼痛

5.下列有關造牙本質細胞（odontoblast）的描述何者正確？
A.造牙本質細胞可再分裂，並產生修復牙本質（dentin）
B.造牙本質細胞的大小型態與它的功能活性有關
C.造牙本質細胞主要是產生第一型與第三型膠原蛋白（collagen）
D.造牙本質細胞在牙冠與牙根部都是多層、柱狀的

6.當牙根未發育完成之牙齒因外傷造成外移脫出（extrusive displacement），下列何者不是適當的治療？
A.復位
B.固定
C.咬合調整
D.根管治療

7.下列何種藥物最適合用於恆齒之根尖成形術（apexification）？
A.蟻醛甲酚合劑（formocresol）
B.氫氧化鈣（calcium hydroxide）
C.戊二醛（glutaraldehyde）
D.硫化鐵（ferric sulfate）

8.大部分造成根管感染的菌種主要是：
A.絕對厭氧菌（strict anaerobes）
B.專性需氧菌（obligate aerobes）
C.兼性厭氧菌（facultative anaerobes）
D.黴菌（fungi）

9.關於牙髓疾病的分類與敘述，下列何者錯誤？
A.過敏性牙本質（hypersensitive dentine）不會有自發性疼痛
B.不可逆牙髓炎以冷刺激時，會產生持續性疼痛（lingering pain）
C.增生性牙髓炎（hyperplastic pulpitis）臨床可見息肉（polyp）存在
D.增生性牙髓炎（hyperplastic pulpitis）通常會有自發性疼痛的症狀

10.關於牙髓中的感覺神經叢的敘述，下列何者正確？
A.依直徑大小和傳導速度分無髓鞘（unmyelinated）A-fiber和有髓鞘（myelinated）C-fiber

B.C-fiber較細，分佈在A-fiber之下層，傳導速度較慢且沒有進入牙髓－牙本質複合層（pulpodentinal complex layer）
C.A-fiber傳導的是鈍痛（dull pain），C-fiber傳導的是較尖銳的疼痛（sharp pain）
D.A-fiber受刺激後釋放出炎性調控神經胜肽（inflammatory modulating neuropeptides）

11.對於根管治療過程中的症候突發（interappointment flare-up），下列敘述何者正確？
A.減緩術後疼痛最常見的方法就是開抗生素
B.病人疼痛、腫脹，有時還會有局部性暫時的皮膚感覺異常（regional temporary paresthesia）
C.給予長效性的麻醉或強止痛劑是無效的
D.根管內放類固醇或全身性給藥都有預防flare-up的效果

12.有關電子根尖測定儀（electronic apex locator），下列敘述何者錯誤？
A.早期之電子根尖測定儀是應用牙周膜和口腔黏膜間電阻（resistance）固定來定位根尖
B.有些電子根尖測定儀是應用牙骨質牙本質交界（CDJ）阻抗（impedance）銳減來定位根尖
C.新一代之電子根尖測定儀是應用兩種不同頻率的電流來定位根尖
D.使用新一代之電子根尖測定儀時，根管內最好不要有任何液體

13.下列有關氫氧化鈣（calcium hydroxide）的敘述，何者錯誤？
A.使用螺旋渦針（lentulo spiral）將氫氧化鈣稀泥（slurry）帶入根管的方向爲順時針旋轉
B.氫氧化鈣可水解細菌脂多醣（lipopolysaccharide）成分
C.在水中的溶解度高
D.pH值爲12.5

14.有關橡皮障的使用，下列敘述何者最正確？
A.易引起患者對橡皮材質的過敏
B.易造成患者說話不便，不得已才用
C.成本的考量，只用在根管充塡時
D.提高治療區視野，有利於臨床操作

15.下列關於牙髓檢查敘述，何者正確？
A.當患者有劇烈疼痛，對熱食特別敏感，且無法正確指出患牙時，冷測試（cold testing）是最有效的檢查方法
B.電髓試驗（electric pulp test）對牙髓血流健康狀態，能提供最佳資訊
C.對牙根尙未形成的年輕牙齒，冷測試（cold testing）的準確度會高於電髓試驗（electric pulp test）
D.測試窩洞（test cavity）最準確，也是臨床上最常用的方法

16.35歲病患因1小時前跌倒意外而來院求診，經檢查發現上顎右邊正中門齒牙冠完整但有下壓內縮（intrusion）約2公釐情形，較理想的治療順序應爲：①等待牙齒自然萌出　②手術再植術（surgical reposition）復位牙齒　③強逼萌出術式（forced eruption）復位牙齒　④進行根管治療　⑤持續追蹤觀察牙齒活性
A.②→④
B.③→④
C.④→③
D.⑤→①

17.學者Fish提出根尖周圍病灶可分爲四區：①irritation zone　②stimulation zone　③contamination zone　④infection zone。若由內到外依序排列，則下列何者正確？
A.①②③④
B.④③①②
C.②④③①
D.①④②③

18.當既存的放射線透射（radiolucent）之慢性根尖發炎病灶，產生急性的發炎惡化轉變時，稱爲什麼？
A.radicular cyst
B.condensing osteitis
C.apical granuloma
D.phoenix abscess

19.急性根尖牙周炎（acute apical periodontitis）可分爲原發性（primary）及繼發性（secondary）兩類，其主要區別在下列何種細胞？
A.淋巴球（lymphocytes）
B.漿細胞（plasma cells）
C.多形核中性白血球（polymorphonuclear neutrophils）
D.巨噬細胞（macrophages）

20.下列有關根尖手術的敘述，何者正確？

A.爲達到最佳視野，不論欲進行手術齒位爲何，一律以長方形皮瓣（rectangular flap）作爲翻瓣設計（flap design）
B.爲了儘可能清除根尖分岐（apical ramifications）及側根管（lateral canals），根尖切除的長度越長越好
C.根尖切除時，儘可能與牙齒長軸垂直
D.以MTA作爲逆充塡材料，其最大優點爲硬化時間短因而滲漏情形少

21.進行根尖手術時，對於手術區的止血控制可以提升視野的清晰度及操作的便利性，下列關於止血控制的敘述，何者錯誤？
A.避免將腎上腺素（epinephrine）打入肌肉中
B.反彈作用（rebound phenomenon）是由於局部的組織缺氧所致
C.除了阻斷麻醉之外，在手術區域加打浸潤麻醉有助於止血的效果
D.愈複雜，愈需要止血控制的步驟，應移至愈後面完成

22.超音波器械應用於根尖手術的牙根尖製備，主要基於下列何者？
A.牙根尖切除角度較佳，可以保留較多齒質
B.可以將逆充塡的窩洞清得更大更乾淨
C.可以製備比鑽針更深的逆充塡窩洞
D.不易造成齒質的龜裂（crack）

23.有關根尖手術，下列敘述何者錯誤？
A.根尖手術前應先考慮非手術性再治療的可能性存在與否
B.非手術性根管治療可預期的會解決真性根尖囊腫（true periradicular cysts）存在的問題
C.傷口縫合後36至42小時形成上皮屏障（epithelial barrier）將明顯增加傷口強度
D.當骨質疏鬆患者接受靜脈注射bisphosphonates時，若進行侵入性牙科治療會增加引起骨壞死危險的機會

24.根管治療需要有近心與遠心偏移的X光照片，偏移的角度多少較爲適宜？
A.60度
B.40度
C.20度
D.10度

25.當患牙同時有根管問題與齒列矯正治療的需求時，要依循適當的治療原則，下列敘述何者錯誤？
A.在進行矯正治療前要儘量先完成根管治療較佳
B.牙根尚未發育完全的牙齒當發生外傷造成intrusion時，儘快進行矯正治療將牙齒拉出，是唯一的治療方法
C.當殘存的牙齒結構低於牙齦下以致於臨床牙冠不足時，可用矯正的方法強逼萌出（forced eruption）將牙根拉出
D.當牙根強逼萌出後（forced eruption）可視情況施行牙冠增長術

26.下列何者不是根管治療前的「告知同意書」（informed consent）所必須涵蓋的內容？
A.該治療所需的大約費用
B.該疾病的其它治療方式
C.沒有治療的後果
D.該治療的風險

27.牙本質牙釉質交界處（dentinoenamel junction）的厚度約爲多少μm？
A.5μm
B.30μm
C.100μm
D.200μm

28.下列有關齲齒的敘述何者錯誤？
A.齲齒是單方向的過程（one-way process）
B.齲齒診斷需要確定齲齒活躍性（caries activity）和評估其危險性（risk assessment）
C.對於正活躍但無窩洞形成的齲齒病灶應先考慮非侵入性（noninvasive）治療
D.乳臼齒的活躍性齲蝕可經由預防措施的介入而成爲歇止性齲齒（arrested caries）

29.下列何者可能爲形成致齲性（cariogenic）牙菌斑之單一最重要因素？
A.高頻率糖暴露
B.宿主抵抗力減弱
C.口腔衛生不良
D.口腔菌種組成複雜

30.下列關於牙本質結構的敘述，何者錯誤？
A.從髓腔往牙釉質的方向，單位面積的牙本質小管數是漸減的
B.牙本質小管的直徑在靠髓腔處小於牙本質牙釉質交界處

C.牙本質的通透性，從髓腔往外是遞減的

D.靠表層的牙本質，大部分組成是管間牙本質（intertubular dentin）

31.關於黏合劑的調拌與應用，下列敘述何者錯誤？

A.玻璃離子體黏合劑粉液混合時，係爲放熱反應，因而宜大範圍調拌才能增加其粉液比發揮出最佳的特性

B.磷酸鋅黏合劑粉液調拌時，通常因有相對較長的操作時間較適合用於對長跨距固定牙橋（long-span fixed bridge）固位黏著

C.樹脂黏合劑原本設計專用於對全瓷復形體的固位黏著，但其實它也很適用於合金復形體的固位黏著

D.聚羧酸鹽黏合劑（Polycarboxylate cement）一般會用於已有敏感症候的支台牙

32.以通用系統（universal system）命名法來表示牙齒的位置，12是代表那一顆牙齒？

A.上顎左側側門牙

B.上顎右側側門牙

C.上顎左側第一小臼齒

D.上顎右側第一小臼齒

33.作爲前牙復形物的黏合劑，若提高粉／水比例，下列何者正確？

A.流動性增加

B.黏稠度減低

C.濕潤性增加

D.機械強度增加

34.與牙齒組織或金屬修復材料相較，下列何者不是複合樹脂的特性？

A.較差的機械性質

B.較低的斷裂韌性（fracture toughness）

C.較低的彈性係數（modulus of elasticity）

D.較低的熱膨脹係數（coefficient of thermal expansion）

35.下列四張病例圖那一個病例較適合以簡單的復形（restoration）方式恢復牙體的外形及美觀？

A.

B.

C.

D.

36.

有關牙體修形之各種完成線（finish lines）圖示如下，各邊緣設計分別是：①knife-edged　②chamfer　③shoulder　④beveled chamfer or beveled shoulder；最適合用於全瓷復形體（all-ceramic restorations）或者相對可提供較厚的材質以強化復形體的邊緣設計是爲：



A.①
B.②
C.③
D.④

37.當金合金復形體其外型製作過當（overcontouring）經固持黏著一陣時日後，最不易造成下列那一個問題的出現？
A.對咬自然牙齒（natural tooth）咬合面的磨耗
B.該鄰接面食物碎屑的填塞（food impaction）
C.該鄰接面齒槽骨嵴的吸收破壞（bone loss）
D.該復形體邊緣牙體與鄰近牙體發生齲齒

38.牙本質的抗張強度（tensile strength）約爲：
A.20MPa（3000 PSI）
B.40MPa（6000 PSI）
C.60MPa（9000 PSI）
D.80MPa（12000 PSI）

39.有關牙薄膜（dental pellicle）下列敘述何者錯誤？
A.是沒有結構，沒有細胞的有機質層
B.具保護牙釉質功能
C.可減少牙齒之間的磨擦（friction）
D.來自唾液中的蛋白質，不含免疫球蛋白IgE

40.患者主訴咬右邊會痛，對冷敏感，則下列何種處理錯誤？
A.觀察牙齒是否有裂痕
B.讓患者以橡皮類硬物用力咬，以確定是那一顆牙齒有問題
C.患者咬橡皮類硬物之後，疼痛立即會消失，表示該牙有不完全斷裂（incomplete fracture）
D.根尖放射線攝影，檢查牙周是否有問題

41.在窩洞製備初期，以旋轉器械穿通牙釉質表面宜採用何種旋轉速度與方式？
A.100,000 rpm；配合水冷卻
B.10,000 rpm；不必水冷卻
C.1,000 rpm；配合水冷卻
D.1,000 rpm；不必水冷卻

42.有關複合樹脂填料（filler）之敘述，下列何者錯誤？
A.多半是玻璃（glass）
B.減低聚合收縮
C.改善透明度
D.增加熱膨脹

43.複合樹脂充填時，下列何者無法增加鍵結的效果？
A.做牙釉質斜面（enamel beveled）
B.窩洞壁做外展的邊緣面（flared margin）
C.酸蝕（etching）牙齒表面
D.窩洞壁塗漆（varnish）

44.可見光光聚機（visible light-curing unit）之照射頭與複合樹脂之最佳距離爲多少？

A.1.0 - 1.5 mm
B.2.0 - 2.5 mm
C.3.0 - 3.5 mm
D.4.0 - 4.5 mm

45.有關樹脂黏合劑（luting cement），下列何者非屬重要的臨床特性之一？
A.流動性（flow）
B.濕潤性（wetting）
C.薄膜厚度（film thickness）
D.抗壓強度（compression strength）

46.在傳統後牙複合樹脂第二類型窩洞修形時，下列何者須修出斜面（bevel）？
A.齦側窩緣面邊緣（gingival cavosurface margin）
B.顏面溝延伸（facial extension）
C.咬合窩緣面邊緣（occlusal cavosurface margin）
D.鄰接盒型（proximal box）之頰側和舌側垂直窩緣面邊緣（buccal and lingual vertical cavosurface margin）

47.關於預防性樹脂修復體（preventive resin restorations，PRR）的敘述，下列何者錯誤？
A.PRR的窩洞修形僅限於有齲蝕的溝裂
B.被PRR封閉的齲蝕病灶將不再進展
C.咬合面有延伸性齲蝕（extensive caries）也適用PRR
D.PRR的臨床表現和汞齊修復體相當或甚至超過

48.鑄造復形物在窩洞修形時其顏面二次外展（facial secondary flare）後形成的鑄造物金屬邊緣之角度爲何？
A.30度
B.40度
C.50度
D.60度

49.患者主訴牙齒有敏感現象，以橡膠棒讓患者試咬，左下第一大臼齒在鬆開時，患者感到劇痛。左下第一大臼齒最可能有何種問題？
A.牙周炎
B.咬頭不完全斷裂
C.可逆性牙髓炎
D.不可逆性牙髓炎

50.在上顎六顆前牙置放橡皮障（rubber dam）時，發現牙齒間有不尋常量的皺摺，此皺摺的原因爲何？
A.洞打得太小
B.洞打得太遠
C.洞打得太近
D.牙齒由切緣至牙齦緣有寬廣之接觸區

51.二級窩洞以複合樹脂或汞齊填補，下列敘述何者正確？
A.以汞齊填補之窩洞需設計固位溝，以複合樹脂填補之窩洞不需固位溝設計
B.以汞齊填補之窩洞底部需平整，以複合樹脂填補之窩洞不需平整
C.以汞齊填補之窩洞壁不可有倒凹（undercut），以複合樹脂填補之窩洞可有倒凹
D.以汞齊填補之窩洞邊緣角小於90˚，以複合樹脂填補之窩洞邊緣角大於90˚

52.在不改變牙齒實際寬度的情形下，爲了使前牙看起來較窄，下列處置何者正確？①將近心頰側及遠心頰側的line angle儘量靠近些　②將發育凹（developmental depression）的距離儘量拉近些　③將近心頰側及遠心頰側的line angle 儘量分開些　④將發育凹的距離儘量分開些
A.①②
B.①③
C.②③
D.③④

53.下列何者不屬於牙齦纖維群（gingival fiber groups）？
A.gingivodental fibers
B.circular fibers
C.transseptal fibers
D.alveolar crest fibers

54.下列關於附連牙齦（attached gingiva）的敘述，何者錯誤？
A.隨年齡增加而增加寬度
B.口內最窄處爲下顎犬齒和第一小臼齒的頰側

C.測量時，附連牙齦和角化牙齦（keratinized gingiva）有相同的寬度值
D.測量附連牙齦所使用的參考點—mucogingival junction，在成人一生中是穩定且位置不變的
55.下列有關牙周病預後的敘述，何者錯誤？
A.牙齒解剖形態，當有牙根分叉侵犯，有愈長的牙根幹部（root trunk）預後愈佳
B.牙周治療患者因骨喪失而使牙齒的旋轉中心下降，比旋轉中心靠牙冠的牙齒預後較差
C.當患者因治療牙周病過程中停止抽菸，可改善其治療預後
D.發育溝、牙根太靠近（root proximity）、牙根分叉侵犯，均因較無法執行清潔而預後較差
56.下列何種病患不適合使用氣磨方式（air-powder polishing）磨亮？
A.須要控制鉀鹽吸取量的病患
B.須要控制鈉鹽吸取量的病患
C.須要控制鈣吸取量的病患
D.須要控制碘吸取量的病患
57.引導組織再生的最主要生物學原理是：
A.傷口穩定與空間維持
B.空間維持與阻隔上皮
C.傷口穩定與牙根脫鈣處理
D.空間維持與穿髓處理
58.下列何者並非是牙周手術後，給予牙周敷料的主要目的？
A.讓患者舒服
B.止住術後的出血
C.保護手術後的傷口
D.維持牙齦翻瓣和下方骨頭的密接
59.口腔內具有凝集血小板能力，且在病患動脈粥狀瘤（atheroma）中可偵察到之革蘭氏陰性菌為：
A.*Treponema denticola*
B.*Streptcoccus sanguis*
C.*Porphyromonas gingivalis*
D.*Prevotella intermedia*
60.為了有效檢查植體是否有感染，下列臨床檢查之描述何者錯誤？
A.若有bleeding on probing（BOP）症狀，是無法預測牙周病的正在進行，但是關於植體邊黏膜的檢查，BOP診斷的正確性仍優於其在一般牙周組織的檢查
B.臨床有suppuration代表有急性組織的破壞，是必須給予抗感染治療的
C.為了追蹤骨喪失，正常情況下每年至少一次X光檢查，若有BOP、化膿可額外照X光以決定齒槽骨嵴的喪失
D.當檢查植體上贋復物有搖動時，即代表植體骨整合的喪失，所以搖動度是一特別的診斷檢查
61.下列那一項組織其上皮為非角化（nonkeratinized）？
A.牙齦溝上皮（sulcular epithelium）
B.硬腭（hard palate）
C.舌頭背面（dorsum of tongue）
D.附連牙齦（attached gingiva）
62.下列有關初期（early stage）牙齦炎之敘述，何者正確？
A.牙菌斑堆積四至七天後，即可發生
B.在接合上皮（junctional epithelium）內出現慢性炎性反應
C.結締組織內出現以漿細胞（plasma cell）為主之浸潤
D.結締組織內膠原蛋白（collagen）已破壞50%
63.檢查35歲患者發現全口有嚴重牙周組織破壞時，則下列何項問診所得的資料和患者臨床診斷最沒有關聯？
A.家族父母兄弟中是否有類似現象
B.是否有嚴重抽菸習慣
C.是否長期服用非類固醇抗發炎藥物
D.是否有糖尿病或其他全身性疾病
64.下列關於牙根凹面（root concavity）發生比例的敘述，何者為錯誤的？
A.上顎第一大臼齒齒根中，以mesiobuccal root發生比例最高
B.上顎第二大臼齒齒根中，以distobuccal root 發生比例最高
C.下顎第一大臼齒齒根中，以mesial root 發生比例最高
D.第一小臼齒齒根比第二小臼齒齒根發生比例高
65.下列何種細菌可能與慢性牙齦炎及牙根齲齒有關？
A.*Porphyromonas gingivalis*
B.*Streptococcus mutans*

C.*Actinomyces viscosus*
D.*Candida albicans*
66.根據Cogen等（1992）有關局部侵犯性牙周炎（localized aggressive periodontitis）的研究，下列的敘述何者錯誤？
A.白種人的流行率（prevalence）爲0.3%
B.黑種人的流行率（prevalence）爲1.5%
C.白種人男性罹患局部侵犯性牙周炎的比例爲女性的4倍
D.黑種人女性罹患局部侵犯性牙周炎的比例爲男性的4倍
67.依據1964年Silness及Löe的牙菌斑指數（plaque index），出現大量的牙菌斑時其指數值爲：
A.1
B.2
C.3
D.4
68.依據Löe在Sri Lanka之研究，81%的人之牙周狀況屬中度破壞，每年之附連喪失平均約爲多少mm？
A.0.01-0.04
B.0.05-0.5
C.0.6-1.0
D.大於1
69.下列何者不是牙周手術的適應症？
A.改善美觀
B.患者口腔衛生不好
C.爲了補綴上的需要
D.重建組織外形，以利口腔衛生的施行
70.遇到骨質較軟的植牙部位，下列何者有助提高植體穩定度？
A.圓柱形、平滑面、自攻螺紋
B.圓柱形、粗糙面、自攻螺紋
C.倒錐形、平滑面、自攻螺紋
D.倒錐形、粗糙面、自攻螺紋
71.牙釉珠（enamel pearl）的最常發生齒位爲：
A.maxillary first molar
B.maxillary second molar
C.mandibular first molar
D.mandibular second molar
72.牙周致病菌*P. gingivalis*的LPS或fimbriae，研究得知主要經由樹突狀細胞（dendritic cell）的何種接受器（receptor）而被確認（recognized）？
A.toll-like receptor -1
B.toll-like receptor -2
C.toll-like receptor -3
D.toll-like receptor -4
73.對於mononuclear phagocytes 的敘述，下列何者錯誤？
A.相似於neutrophil有趨化性（chemotaxis）和吞噬性（phagocytosis）
B.會processing and presenting 抗原給T 細胞
C.血管內的macrophages和組織內的monocytes都屬於mononuclear phagocytes
D.會釋放引導lymphocyte分化的胞激素
74.關於游離牙齦移植術（free gingival graft），下列敘述何者錯誤？
A.移植的牙齦在第一天，是藉著受植區牙床及鄰近牙齦的滲出液（diffusion of fluid）而存活下來
B.牙齦移植片直接覆蓋在骨組織上，其術後腫脹較少，但牙齦組織的收縮較大
C.術後最初的六週，牙齦組織的收縮量最大
D.術後第四天，一層薄薄的新表皮開始出現
75.下列有關非骨移植材（nonbone graft materials），磷酸鈣生醫材（calcium phosphate biomaterials）的敘述何者錯誤？
A.hydroxyapatite（HA）的鈣／磷比例爲1.67，與人骨的比例相同
B.tricalcium phosphate（TCP）的鈣／磷比例爲1.5
C.非骨移植材HA與TCP其促進骨生成的機轉（mechanism），爲骨傳導（osteoconduction）方式
D.HA與TCP會引起人體異物反應（foreign body reaction），所以要小心使用
76.當放置直徑5 mm的人工植體時，相鄰兩顆自然牙的距離最少需多少？

A.6 mm
B.7 mm
C.8 mm
D.9 mm

77.下圖是一位十五歲女性腎臟移植患者，目前正在服用免疫抑制劑治療。血壓正常，無其他系統性疾病；造成她牙齦肥大最可能原因是：

A.遺傳
B.使用cyclosporine
C.使用dilantin
D.使用calcium channel blocker

78.承上題，下列那種處理最有可能長期解決牙齦肥大問題？
A.只需牙齦切除術
B.只需菌斑控制、牙齦切除術
C.只需菌斑控制、牙齦切除術、換藥
D.只需翻瓣清創術、換藥

79.如下圖患者左側上顎犬齒有一深且寬之牙齦萎縮，頰側有2 mm之附連牙齦，鄰接面無骨質缺損，暴露的牙根填補複合樹脂。此案例在Miller（1985）牙齦萎縮之分類是屬於那一類？

A.Class I
B.Class II
C.Class III
D.Class IV

80.承上題，此案例若使用移前翻瓣手術（advanced flap procedure）來覆蓋牙根時，下列何者不是移前翻瓣手術？
A.冠向移前翻瓣手術（coronally advanced flap procedure）
B.半月狀冠向復位手術（semilunar repositioned flap procedure）
C.引導組織再生術（guided tissue regeneration）

D.雙側乳突翻瓣手術（double papilla flap procedure）