102年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分試考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：6302
類科名稱：牙醫師（二）
科目名稱：牙醫學(六)（包括齒顎矯正學、兒童牙科學、牙科公共衛生學等科目及其相關臨床實例與醫學倫理）
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.根據生長發育之研究，對於女性初經的發生時間相較於生長速率之高峰期，何者正確？
A.生長高峰期較早出現
B.生長高峰期較晚出現
C.二者發生時間相同
D.二者無關

2.在生長發育時，若上顎突（maxillary process）和外側鼻突（lateral nasal process）發生融合失敗，則會產生下列何種變化？
A.腭裂
B.唇裂
C.唇腭裂
D.顏面裂

3.下列何者不是下顎生長主要的生長部位（growth site）？
A.下顎喙狀突（coronoid process）
B.下顎枝（ramus）後端
C.下顎髁（condyle）
D.下顎頦（chin）

4.若右側第一大臼齒呈遠心咬合（distocclusion）、左側第一大臼齒呈正常咬合（normal occlusion），則此咬合情形屬於下列那一類？
A.二級異常咬合第一分類（Class II division 1）
B.二級異常咬合第二分類（Class II division 2）
C.三級異常咬合第一分類（Class III division 1）
D.二級異常咬合細分類（Class II subdivision）

5.下列關於法蘭克福下顎平面角（Frankfort-mandibular plane angle，FMA）與顏面型態關係的敘述，何者正確？
A.FMA角度大者屬於短臉型
B.FMA角度大者屬於長臉型
C.FMA角度大者表示下顎骨的發育是朝前上方的方向
D.FMA角度的大小與顏面型態無關

6.下圖為測顱X光描繪圖，menton為圖中第幾號點的位置？



A.50
B.52
C.54

D.57

7.如圖所示，以扶正彈線（uprighting spring）來扶正傾斜的大臼齒時，大臼齒除了會直立外，還會發生那些作用？



A.突出（extrusion），且向頰側傾斜
B.壓入（intrusion），且向頰側傾斜
C.突出（extrusion），且向舌側傾斜
D.壓入（intrusion），且向舌側傾斜

8.下列何種情況適於使用頸部方向牽引的面弓型頭套（cervical facebow headgear）？
A.安格氏三級異常咬合
B.短臉型
C.前牙開咬
D.後牙錯咬

9.第二乳臼齒早期脫落，做一舌側維持裝置（lingual holding arch wire）無法達成下列何項？
A.防止下顎門牙舌側傾斜
B.防止第一大臼齒近心移動
C.防止開咬
D.維持牙弓長度

10.對牙齒施加heavy force，在受力側會引起下列那兩種變化？①牙周膜增厚　②牙周膜有透明變性（hyalinization）的現象　③齒槽骨會有下蝕性吸收（undermining resorption）的現象　④齒槽骨會產生造骨細胞（osteoblasts），以便於骨吸收
A.①②
B.①④
C.②③
D.③④

11.下列有關直線裝置（straight-wire appliance）的敘述，何者錯誤？
A.最早由Dr. Andrews醫師所發展
B.是一種預先調整的方線裝置（preadjusted edgewise appliance）
C.發展的目的之一是為了減少金屬線彎折（wire bending）
D.有考慮到牙齒形態的變異性

12.矯正治療前告知同意書的內容不包括那一項？
A.治療的內容步驟及可能的結果
B.治療可能產生的合併症
C.是否有其他可能的治療計畫
D.醫師診所內治療成功的輝煌史

13.有關牙齒發育障礙的敘述，下列何者錯誤？
A.鎖骨顱骨發育不全（cleidocranial dysplasia）的患者，其特徵為無鎖骨、有許多多生齒及未萌出的牙齒（unerupted teeth）
B.除第三大臼齒外，最常見的牙齒畸形（malformed）為上顎側門齒
C.最常見的多生齒出現在上顎前牙區

D.異位萌發（ectopic eruption）是指異位的乳牙牙苞（tooth bud）導致此乳牙萌發至不當的位置，常見於乳犬齒

14.醜小鴨現象（ugly duckling stage）通常發生在那一顆牙齒萌發時？

A.上顎犬齒

B.下顎犬齒

C.上顎正中門齒

D.下顎中門齒

15.十五歲患者的左上乳犬齒仍未見任何鬆動，口內齒槽區亦無唇側隆起，此時對恆犬齒最適當的處理爲何？

A.照X-光片檢查

B.儘早拔除乳犬齒

C.繼續等待其自然萌發

D.製作空間維持器保留空間

16.對於乳臼齒終端平面（terminal plane）的敘述，下列何者正確？

A.以上下顎第一乳臼齒爲判斷依據

B.mesial step需要靠 leeway space提供下顎乳臼齒向前推進才能發育成Angle Class I

C.distal step較不可能發展爲Angle Class III

D.Angle的咬合分類和終端平面均適用於乳牙齒列

17.關於孩童時期的下顎骨髁突骨折的後續變化，下列敘述何者錯誤？

A.造成下顎骨不再發育

B.若髁突無明顯移位，治療原則可採取無侵入性的處理方式

C.下顎功能正常時，幼童年紀越小，預後越好

D.髁突沾黏時可能會出現下顎不對稱生長，引起嚴重的咬合問題

18.孩童3歲時發生上顎乳門齒區外傷，則其繼發齒最不可能產生下列何種現象？

A.異位萌發

B.牙齒缺失

C.牙根發育異常

D.牙冠發育異常

19.下列何者不是「短臉症候群」（short face syndrome）患者常見的顱顏特徵？

A.骨骼性深咬

B.下顎平面角偏小

C.骨骼性前方開咬

D.下顎骨向前上方旋轉

20.有關Angle Class I異常咬合分類，下列敘述何者正確？

A.上顎第一大臼齒之近心頰側咬頭咬在下顎第一大臼齒之頰側溝

B.上顎第一大臼齒之近心頰側咬頭咬在下顎第一大臼齒近心邊緣嵴

C.上顎第一大臼齒之近心頰側咬頭咬在下顎第一大臼齒遠心邊緣嵴

D.上顎第一大臼齒之遠心頰側咬頭咬在下顎第一大臼齒近心邊緣嵴

21.測顱分析中，Po點及Or點的連線爲：

A.facial plane

B.mandibular plane

C.Frankfort plane

D.palatal plane

22.一名十歲男童，具有嚴重安格氏第二級異常咬合及下顎後縮，伴隨深咬現象，下列何種治療計畫最不適當？

A.固定矯正裝置

B.等生長完成後再進行治療

C.頦托（chin cap）

D.功能性咬合裝置（functional appliance）

23.在測顱分析中，下列那一項目用以進行垂直向之分析？

A.SNA夾角

B.SNB夾角

C.前顱底平面與下顎平面的夾角（SN-MP）

D.上顎正中門齒與nasion-A point夾角（1-NA）

24.下列何者爲波頓牙齒比值（Bolton ratio）分析之主要分析項目？

A.齒弓對稱性分析

B.骨源性異常分析

C.牙齒寬度大小分析
D.垂直向骨源性異常
25.有關利用Moyers預測表（Moyers prediction table）來預估尚未萌發恆牙寬度的方法，下列敘述何者正確？
A.主要是用來預測尚未萌發之臼齒和小臼齒的牙冠寬度
B.需要配合小臼齒區的根尖X光片合併判讀
C.下顎門齒近遠心寬度總合是必須的資料
D.可以預測上、下顎犬齒的大小
26.有關Frankel功能性矯正器的組件，下列何者不是用來控制牙齒垂直向的關係？
A.咬合面或切緣阻擋點
B.咬合塊
C.腭弓（palatal arch）
D.唇墊（lip pad）
27.可撤式矯正器所引起之牙齒移動形式不包含下列那種？

A.可以移動多顆牙齒，以擴張牙弓周長
B.可以調整牙弓內單顆牙齒之位置
C.牙齒移動主要爲傾斜移動
D.連續性牙齒移動
28.胎兒在子宮內頭部彎曲，緊緊的壓在胸部，導致下顎生長受到抑制，出生時下顎嚴重發育不足、易合併腭裂的患者，導致患者 Class II 異常咬合，此稱爲何種症狀？
A.Treacher Collins syndrome
B.Pierre Robin sequence
C.Crouzon's syndrome
D.hemifacial microsomia
29.下列有關手覆口法（hand-over-mouth exercise）之敘述，何者錯誤？
A.適用於3~6歲的小朋友
B.必須取得父母的同意
C.適用於身心障礙的小病人
D.是學習理論（learning theory）的應用
30.使用複合樹脂材料或銀粉做補牙材料時，在操作上何者錯誤？
A.複合樹脂的窩洞製備（cavity preparation）比銀粉小
B.複合樹脂的窩洞製備（cavity preparation）應涵蓋所有的隙溝
C.複合樹脂補牙的技術要求比較高
D.複合樹脂的窩洞較不需機械性倒凹（mechanical undercut）
31.關於幼兒的口腔保健，下列敘述何者錯誤？
A.一歲半幼兒尚未長牙應該拜訪牙醫師做檢查
B.第一次拜訪牙醫師的時間應在第一顆乳牙長出後之六個月內
C.第一次拜訪牙醫師時間應在一歲以前
D.第一次完整口腔檢查應該包括全口X光片
32.下列關於牙釉質發育不全（enamel hypoplasia）的敘述，何者正確？
A.乳牙發生率比永久齒高
B.與牙齒的延遲萌發有關
C.出生體重非常低的早產兒中較常見
D.乳牙的牙釉質發育不全不會因爲乳牙的外傷造成
33.牙釉質發育不全（enamel hypoplasia）通常和下列營養素的缺乏有關，除了那一項以外？
A.維生素A
B.維生素B
C.鈣
D.磷
34.若混合齒列空間分析（space analysis of mixed dentition）的結果爲空間不足時，就永久齒排列而言，下列何種狀況最不可能發生？
A.過度擁擠（crowding）
B.明顯的史比氏曲線（curve of Spee）
C.前牙向唇側突出
D.空隙狀況（spacing）
35.下顎側門牙由乳牙舌側萌出時，呈現空間不足約2 mm現象，應如何處置？
A.立即拔除乳門牙

B.立即拔除同側乳犬齒
C.立即拔除乳門牙及另側乳犬齒
D.照前牙X光咬合片（occlusal film）評估，若乳牙牙根吸收正常，可門診持續觀察至八歲左右
36.外傷性牙齒，受傷後發生根管進行性鈣化（progressive canal calcification）現象，此時臨床檢查上看到牙齒之顏色變化爲何？
A.粉紅色、不透光
B.黃色、不透光
C.粉紅色、透光
D.黃色、透光
37.當牙齒牙周韌帶受傷、連續發炎現象出現且破骨細胞也出現，此時牙齒可能出現下列何者？
A.牙髓壞死（necrosis）
B.牙髓壞疽（gangrene）
C.黏連（ankylosis）
D.牙齒內吸收（internal resorption）
38.一位7歲男童10分鐘前因爲跌倒，馬上由老師帶到牙科治療，經檢查後發現21牙冠斷裂，牙髓暴露約0.1mm，X光檢查牙根無斷裂現象。21要進行覆髓及光聚合樹脂填補，下列何種覆髓材料較適合？
A.以氫氧化鈣當覆髓材料
B.以樹脂黏著劑當覆髓材料
C.以複合樹脂當覆髓材料
D.以氧化鋅丁香油酚黏合劑（zinc oxide eugenol，ZOE）當覆髓材料
39.一位11歲男童因爲早上跌倒赴牙科治療，經檢查後發現11牙冠牙釉質輕微斷裂，牙本質未暴露，無冷熱敏感，X光檢查牙根無斷裂現象，11以下列何種處置較恰當？
A.牙冠尖銳牙釉質修圓滑，以免刺傷唇舌
B.牙齒暫時勿修整及填補，以免樹脂材料刺激牙髓
C.牙齒暫時填補，以免冷熱刺激牙髓
D.牙齒永久性牙冠恢復完整外觀，並恢復咀嚼功能
40.爲了達到預防疾病的目的，重度身心障礙兒童之口腔清潔工作，下列何者扮演最重要之角色？①牙醫師 ②口腔衛生師 ③身心障礙兒童本人 ④身心障礙兒童的父母或照護者
A.①②③
B.①②④
C.①③④
D.②③④
41.關於腦性麻痺（cerebral palsy）的敘述，下列何者錯誤？
A.腦性麻痺是一些失能異常（disabling disorders）的集合體，基本上是出生前後腦部受損所致
B.早產和腦性麻痺有相當高的相關性
C.在許多腦性麻痺患者，某些的新生兒反射動作會持續存在超過嬰兒時期
D.咬合不正，磨牙與牙周病是腦性麻痺患者獨特的疾病
42.兒童行爲處理中，最重要的溝通工具是語言。一般而言，正常兒童在幾歲時其語言能力可以達到適當的溝通能力？
A.2歲
B.3歲
C.4歲
D.5歲
43.根據Frankl的行爲評估量表（Frankl Behavioral Rating Scale）可以將孩童看牙的合作與不合作行爲分成四個類別變項，並且可以用"+"、 "-" 符號來表示，對於明確合作（definitely positive）的行爲可以記錄爲：
A."+"
B."++"
C."-"
D."--"
44.使用口服鎮靜劑水化氯醛 （chloral hydrate）爲兒童做鎮靜時，何者錯誤？
A.容易產生噁心、嘔吐，故最好能禁食6~8小時
B.對呼吸中樞會產生抑制作用
C.最適合的劑量爲100 mg/kg
D.應每5分鐘檢查一次生命跡象（vital sign）
45.對於激動不合作的兒童欲施與以手摀嘴法（hand-over-mouth exercise），下列敘述何者錯誤？
A.目的是獲得高度反抗兒童的注意，建立溝通管道

B.屬於行爲塑造中的反感控制法（aversive conditioning）
C.接續需給予讚美或鼓勵
D.可做爲常規之使用
46.有關溝隙封塡劑（pit and fissure sealants）的適應症，下列何者錯誤？
A.溝隙處齲齒侷限於牙釉質，而鄰接面無齲齒者
B.溝隙處無齲齒但型態上有齲齒危險性者
C.溝隙處無齲齒且牙齒萌發已足以提供充足的口水隔離者
D.溝隙處齲齒侷限於牙本質
47.有關兒童牙科局部麻醉之敘述，下列何者錯誤？
A.塗表面麻醉藥之前，黏膜一定要擦乾
B.不管是阻斷麻醉或浸潤麻醉都可用短針
C.進針時要一次到骨膜下的位置才有效
D.乳前牙麻醉進針時只要把針頭斜面埋進黏膜即可
48.關於乳牙之部分牙髓切除術（partial pulpectomy）之敘述，何者錯誤？
A.若X光片上顯示牙周韌帶有變寬之情形, 則須施以完全斷髓術（complete pulpectomy）來治療
B.通常一次（one appointment）便可完成治療
C.進入牙髓腔後可先用細的倒刺根管針 (fine barbed broach)清除牙髓組織
D.K file有助於清除殘髓組織
49.關於回診病人照X光片的頻率，下列敘述何者錯誤？
A.對於8歲的病人，如果齲齒風險很高，回診追蹤時要每六個月照一次後牙咬翼片
B.對於8歲病人，如果齲齒風險不高，回診追蹤時要每12~24個月照一次後牙咬翼片
C.對於4歲病人如果齲齒風險很高，回診追蹤時要每12~24個月照一次後牙咬翼片
D.對於4歲病人如果齲齒風險不高，且後牙爲緊密靠在一起，無法目視判斷有無齲齒時才需要回診追蹤時每12~14個月照一次後牙咬翼片
50.唾液分泌的功能對於預防齲齒非常重要，下列藥物何者會影響到唾液分泌？
A.Acetaminophen
B.Chlorpromazine
C.Amoxicillin
D.Voren
51.有關恆牙第一大臼齒，臨床上初次咬合接觸發生時的咬合關係敘述，下列何者錯誤？
A.Class I的關係意指上顎恆牙臼齒的近心頰側咬頭非常接近或是接觸在下顎恆牙第一大臼齒的頰側溝
B.Class II是上顎近心頰側咬頭位於下顎近心頰側咬頭的前方
C.Class III代表上顎近心頰側咬頭位於下顎頰側溝的遠心
D.恆牙第一大臼齒之間的初次咬合接觸關係可能會呈現的類型總共只有三種
52.下列何者較可能是牙弓長度不足所造成？
A.萌牙性血腫（eruption hematoma）
B.萌牙性囊腫（eruption cyst）
C.萌牙性死骨（eruption sequestrum）
D.異位性萌發（ectopic eruption）
53.關於處理發展中咬合的診斷與分析，下列何者錯誤？
A.Nance分析最常被使用，它是由完整的研究結果得到，測量下顎第一大臼齒的近心面到對側相應牙齒近心面的齒列牙弓的長度
B.診斷性紀錄可能包括八張的口外與口內的攝影、適當修整的矯正研究模型、全口及環口放射線攝影、側面與前後方向測顱攝影等
C.Moyers 混和齒列分析有很多優點，它可以在口內也可以在模型上完成，並且可以使用於上、下牙弓
D.Bolton分析是用來比較上顎與下顎牙弓之間的整體牙齒大小之差異
54.對於口腔之生長變化，下列敘述何者錯誤？
A.根據Baume的研究，乳牙齒列可分爲空隙型與閉鎖型
B.靈長間隙（primate space）上顎是位於BC之間，下顎是CD之間
C.犬齒間距的寬度，當下顎側門牙萌發時，約增加2~3mm
D.早期近心偏移（early mesial shift）是恆牙第一大臼齒佔用了餘裕空間（leeway space）
55.最常與HIV（human immunodeficiency virus）相關的口內感染者爲何？
A.白色念珠菌感染（*Candida albicans*）
B.克氏肺炎桿菌（*Klebsiella pneumoniae*）
C.人類乳頭狀濾過性病毒（*Human papilloma virus*）
D.糞腸球菌（*Enterococcus faecalis*）

56.Kaposi sarcoma最常見於兒童口腔內的部位是：
A.硬腭
B.頰黏膜
C.舌頭
D.牙齦
57.外傷所造成的牙齒結構喪失與牙本質暴露，除了完整的診斷步驟之外，還需那些處理？①立即做一個暫時復形物或保護性覆蓋　②避免因爲壓力或溫度與化學的刺激對牙髓所造成的進一步傷害　③長期性復形物要能夠恢復鄰近牙齒或對側牙齒的正常接觸，以維持牙弓之完整性
A.①②
B.②③
C.①③
D.①②③
58.四歲孩童跌倒造成前牙內縮（intrusion）的處理下列何者正確？
A.把握黃金時間將之復位，加以non-rigid splinting 2週觀察
B.不用處理，遭撞擊陷入的前齒大多在3~4週內會再度萌出
C.假如陷入的乳牙位於恆牙胚的唇側，將會妨礙牙胚的唇側萌出，應將之移除
D.由前牙咬合片就足以預測牙胚是否會繼續發育或中斷
59.下列方法何者較能減輕低張力型（hypotonic）或 痙攣型（spastic）腦性麻痺病患的緊張？
A.頭側向一邊
B.用毛巾約束
C.用墊子使膝蓋呈彎曲狀
D.手抱枕頭
60.下列何種不適用於四肢的保護性固定？
A.尼龍搭扣繫帶（Velcro straps）
B.毛巾及皮帶
C.橡膠手套
D.額外助手（extra assistant）
61.民國92年台灣地區男性主要癌症死亡原因中，口腔癌列第四順位。該年男性口腔癌之年齡標準化死亡率約爲十萬分之十，爲民國82年之兩倍，下列敘述何者正確？
A.民國92年每十萬男性人口中有十人因口腔癌死亡
B.以標準人口的年齡別死亡率計算標準化死亡率
C.標準化死亡率是虛構的，會因標準人口不同而不同
D.民國82年每十萬男性人口中有五人因口腔癌死亡
62.某流行病學報告顯示：台灣地區國小學童之齲齒盛行率與政府公告之國人每年每人平均糖消耗量成正比。其使用之研究方法爲何？
A.病例對照研究（case-control study）
B.橫斷式研究（cross-sectional study）
C.生態型研究（ecologic study）
D.世代研究（cohort study）
63.在比較有齲齒與無齲齒學童之家長社經地位（I，II，III，IV，V）差異之統計分析中，請問卡方檢定之自由度爲何？
A.2×5＝10
B.2×(5-1)＝8
C.(2-1)×5＝5
D.(2-1)×(5-1)＝4
64.下列何者被用來了解兩個數字變項間之線性關係？
A.獨立樣本 t 檢定
B.卡方檢定
C.相關係數
D.配對 t 檢定
65.氟素（fluoride）經口服攝取後，大約經過多少時間能達到血清中氟的最高值（maximum fluoride level in blood plasma）？
A.10小時
B.60分以內
C.2小時
D.3小時
66.以社區爲對象、口腔疾病預防與口腔保健爲目標、藉公共衛生之理論與方法，來引導各社區自發性口腔保健活動，以提升口腔衛生水準爲目的之科學，稱之爲：

A.社區牙醫學
B.流行病學
C.生物統計學
D.牙周病學
67.根據WHO在西元1997年出版的口腔健康調查方法，下列何者屬於DMFT之F？
A.因齲蝕而暫時填補的牙齒
B.因外傷而做牙冠套的牙齒
C.裂溝封填的牙齒
D.因齲蝕而做牙冠套的牙齒
68.依據丁恩（Dean）所歸納之氟斑齒指數（fluorosis index-FI），若牙釉質上白色不透性之斑塊佔牙面之三分之一，則應屬於：
A.正常
B.非常輕微
C.輕微
D.中度
69.世界各國相互比較齲齒流行狀況與趨勢之指標年齡，不包括下列何者？
A.5歲
B.12歲
C.20歲
D.65歲以上
70.牙科粉塵危害之防治，不包括下列那一項？
A.對粉塵職業性危害之認知，應有相當的了解
B.穿戴工作服、口罩、頭罩
C.不使用抽吸器、空氣調節設備
D.定期進行環境安全評估，以確定是否危及健康之標準
71.牙科醫療院所產生之職業傷害中，下列何者不屬於物理性傷害？
A.游離輻射線
B.噪音
C.紫外線
D.高速磨牙機、產生之飛沫等
72.下列關於B型肝炎感染途徑之敘述，何者錯誤？
A.由污染之飲食感染
B.牙科執業中主要係直接接觸感染
C.台灣地區成年人B型肝炎盛行率約爲15~20%
D.B型肝炎病毒屬於耐熱型病毒
73.關於牙醫師公會全國聯合會在全國各小學所推動的含氟漱口水計畫，下列敘述何者錯誤？
A.漱口水中的主要有效成分是0.2%的NaF
B.含漱一分鐘後吐出
C.吐出後再以清水漱口一次
D.學期中每週執行一次
74.一個世代研究（cohort study）的結果顯示，喝酒與口腔癌的相對危險比（relative risk）爲1.5，統計檢定的p值爲0.001。下列敘述何者正確？
A.此研究的 p 值足以證明「喝酒與口腔癌之間有因果關係存在」
B.p值愈小表示喝酒與口腔癌之間的因果關係愈強
C.此研究需排除各種偏差（bias）的影響，才能推論喝酒與口腔癌是否真的相關
D.此研究的相對危險比（relative risk）小，表示喝酒與口腔癌之間不可能有因果關係存在
75.有關台灣地區口腔癌之敘述，下列何者正確？①白斑症可能是其癌前病變　②紅斑症不是其癌前病變　③可經由口腔黏膜篩檢及早發現　④好發於舌頭部位
A.①②③
B.②③④
C.①②④
D.①③④
76.社區牙醫學（community dentistry）之主要內涵爲何？
A.研究社會學與牙醫學之差異性
B.研究口腔各科主要疾病之治療
C.研究各種口腔病變之基因調控機制
D.藉社區診斷與社區工作來推動口腔疾病之預防
77.有關計畫評價的說明，下列何者錯誤？

A.評價研究設計的要素爲組別與時間
B.系統評價模式是一種目標分析
C.評價工作有助於衛生資源的有效分配
D.效度爲評價設計正確程度的準則

78.某國小有學生2500人，經口腔檢查發現，其中有750人完全無齲齒，有齲齒之1750人中，未矯治齲齒有1830顆，因齲齒而拔除者有770顆，因矯正需要而拔除者有550顆，已矯治完成者有950顆，請問該國小學生之齲齒指數（DMFT）應爲：
A.1.42
B.1.68
C.1.64
D.1.11

79.有關醫療機構感染控制的防護措施所包含的預防感染措施之敘述，下列何者正確？
A.適用於所有醫療機構內所有的病人，不論是否爲被懷疑或已被確認感染的病人
B.僅適用於特定醫療機構內的病人
C.僅適用於被懷疑感染的病人
D.僅適用於已被確認感染的病人

80.有關亞茲伯格症候群（Asperger's syndrome）的敘述，下列何者錯誤？
A.屬於自閉症診斷群（Autism spectrum disorder）之異常
B.語言能力大多正常
C.特徵是低智商
D.典型特徵通常在兒童後期才表現