105年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師藥師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：5311
類科名稱：物理治療師
科目名稱：骨科疾病物理治療學
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.下列那些頸椎問題可能會有上肢感覺異常（paresthesia）的症狀？①小面關節症候群　②頸椎神經根壓迫　③胸廓出口症候群
A.僅①②
B.僅①③
C.僅②③
D.①②③

2.胸廓出口症候群（thoracic outlet syndrome）常伴隨其他症狀，最不可能包括下列何者？
A.肌膜疼痛
B.頸部病變
C.神經病變
D.肩關節脫臼

3.下頸椎關節囊受限模式（capsular pattern）為何？
A.側彎及旋轉最受限，後伸受限較小
B.後伸及側彎最受限，旋轉受限較小
C.旋轉最受限，側彎及後伸受限較小
D.側彎最受限，後伸及旋轉受限較小

4.觸診頸椎時，下列那一節棘突（spinous process）最明顯，且較不會因頸椎屈曲及後伸而有所改變？
A.C4
B.C5
C.C6
D.C7

5.下列有關頸椎間盤突出之敘述，何者錯誤？
A.突然間發生或漸漸發生
B.可伴隨神經根病變（radiculopathy）
C.症狀是雙邊的
D.可因頸部後仰或屈曲動作而增加疼痛

6.下列有關治療頸椎問題之敘述，何者錯誤？
A.頸髓病變（cervical myelopathy）患者可執行緩和的屈曲運動以助打開脊椎椎管
B.腹式呼吸運動可用在頸椎椎間盤疾病的患者，以減少在頸椎上的負荷
C.神經鬆動治療適用於頸因性頭痛伴隨硬膜（dura）刺激之患者
D.針對頸椎不穩定患者之運動治療重點在於該側胸鎖乳突肌的肌力強化訓練

7.顳頷關節功能不良（TMJ dysfunction）患者常見的臨床表徵，不包括下列何者？
A.有頭部前置（forward head）姿勢
B.舌頭位置異常
C.上胸部呼吸
D.肩部後縮（retraction）

8.正常頸部旋轉動作，其最大活動範圍發生於下列那一區域？
A.上頸部
B.中頸部
C.下頸部
D.各節頸椎平均分布

9.平背（flat back）的姿勢容易有下列何種現象？
A.前縱韌帶（anterior longitudinal ligament）拉緊
B.腰椎椎間盤向後突出
C.腿旁肌（hamstrings）鬆弛無力
D.後脊椎小面關節（posterior facet joints）壓力增加

10.下列有關髖關節理學檢查之敘述，何者錯誤？
A.Craig’s 測試可檢查股骨頸（femoral neck）之前傾（anteversion）角度
B.Torque 測試可評估髖關節囊韌帶的完整以及關節穩定性

C.股直肌攣縮（contracture）會出現Tripod sign
D.Fulcrum 測試可檢查股骨幹（femoral shaft）是否有疲勞性骨折（stress fracture）
11.下列關於腰椎關節炎造成之小面關節卡住（locking of arthrotic facet joint）的敘述，何者錯誤？
A.好發於中老年人，常為急性發作
B.病人對於症狀的描述常是明確集中（localized）於單側、腰椎第四、五節附近的疼痛
C.病人在腰椎前屈及向疼痛側之側彎（side flexion to the painful side）最為受限且疼痛
D.多數病人的症狀可在數週內得到緩解，脊椎鬆動術可減輕症狀
12.相對而言，下列何者使腰椎椎間盤內壓最小？
A.俯臥姿勢下，做被動腰椎後伸
B.站立姿勢下，做腰椎前彎
C.俯臥時，主動用力收縮背肌
D.搬重物
13.學者Jull與Janda指出，骨盆交叉症候群（pelvic crossed syndrome）係骨盆附近肌肉失衡所致。據其理論，下列何者較容易呈現肌無力，需進行肌力訓練？
A.臀大肌（gluteus maximus）
B.腰方肌（quadratus lumborum）
C.腸旁肌（hamstrings）
D.股直肌（rectus femoris）
14.下列那個腰薦椎測試的主要目標組織不是後薦髂韌帶（posterior sacroiliac ligaments）？
A.扭轉應力測試（torsion stress test）
B.擠壓測試（squish test）
C.橫後向壓力測試（transverse posterior stress test）
D.俯臥裂縫測試（prone gapping test）
15.王太太今天右邊大腿後外側感到酸痛，前兩天則是感覺左邊大腿外側疼痛。她還表示一年前亦曾有腰痛發作，且當時於左邊膝窩及小腿處亦感疼痛。則王太太最可能有下列何問題？
A.腸旁肌（hamstrings）扭傷
B.髂脛束（iliotibial band）扭傷
C.退化性腰椎小面關節問題
D.腰椎間盤突出
16.下列何者是間歇性牽引治療（intermittent traction）能提供，但一般持續性牽引治療較無法顧及的優點？
A.有助於暫時拉開椎節（seperate the vertebrae）
B.有助於改善脊椎排列（spinal alignment）
C.促進血液循環，減少局部血流阻塞（circulatory congestion）
D.增加椎間孔（intervertebral foramina）大小
17.下列有關髖關節滑囊炎（bursitis）的敘述，何者正確？
A.轉子滑囊炎（trochanteric bursitis）大多數症狀加重的現象出現在患者上樓梯或側躺到患側時
B.髂恥滑囊炎（iliopectineal bursitis）發生機會較轉子滑囊炎（trochanteric bursitis）為高
C.坐骨臀肌滑囊炎（ischiogluteal bursitis）的症狀可經由坐下休息而緩解
D.髂恥滑囊炎（iliopectineal bursitis）患者，不會因髖關節被動後伸到底而出現疼痛
18.下列何者不是全髖關節置換手術的適應症？
A.慢性骨髓炎
B.無癒合之骨折，髖關節畸形或是不穩
C.因關節軟骨磨損，造成髖關節承重時以及動作時嚴重疼痛
D.保守治療或是之前關節重建手術失敗
19.對於未移位的股骨幹（femoral shaft）骨折患者，進行術後行走訓練時，承受體重（weight-bearing）為：
A.術後二至四月為無承重（non-weight-bearing）狀況，之後每一週再增加五公斤的負重
B.術後二至四週為無承重（non-weight-bearing）狀況，之後每一週再增加五公斤的負重
C.術後二至四週為輕踩著地（touch-down weight-bearing）狀況，之後每一週再增加五公斤的負重
D.術後立即可承重，以患側能忍受的範圍為主
20.下列有關退化性髖關節病變的敘述，何者正確？
A.關節囊受限模式（capsular pattern）以內收、外轉動作限制較多
B.可因關節囊中本體感受器（proprioceptor）的變異而造成平衡缺損
C.臨床檢查時，關節大多會出現紅、腫、熱、痛的情形
D.X光影像學的證據與臨床症狀嚴重度是一致的
21.下列何者為肌肉拉傷（muscle strain）時之最主要測試？
A.主動動作測試

B.被動動作測試
C.阻力測試
D.關節內動作測試
22.為提高腰部深層核心肌群（core muscles）的訓練效果，常藉由訓練下列何肌肉，以利誘發核心肌群之共同收縮？
A.腹直肌（rectus abdominis）
B.腹外斜肌（external obliques）
C.豎脊肌（erector spinae）
D.骨盆底肌群（pelvic floor muscles）
23.一位急性椎間盤突出（bulging disc）患者，無明顯發炎症狀，但呈現腰椎側移（lateral shift）的姿勢，根據McKenzie的治療觀念，下列敘述何者正確？
A.須先矯正腰椎側移，再進行後伸運動治療
B.須先進行後伸運動治療，再矯正腰椎側移
C.腰椎側移及後伸運動兩種治療須重覆交替進行，效果最好
D.腰椎側移及後伸運動兩種治療執行之先後順序不影響療效
24.對於中到重度退化性髖關節炎患者，在髖關節活動範圍內具有疼痛症狀時，給予其運動建議，下列何者錯誤？
A.協助式主動關節運動（active-assisted ROM exercise）
B.高速離心肌力訓練
C.在水中或減負荷的環境下運動
D.下肢溫和伸展操
25.下列何種腰痛患者，最可能因脊椎動作或姿勢而影響其相關症狀的強度？
A.下背痛急性發炎期
B.椎間盤髓核突出伴隨完整環狀纖維（annulus fibrosus）
C.椎間盤髓核突出伴隨環狀纖維（annulus fibrosus）完全斷裂
D.癌症轉移之腰痛
26.當懷疑病患第四節腰椎神經根受到壓迫，欲以肌節（myotome）分布之關鍵肌肉收縮確認，應以下列那一動作進行測試？
A.大腳趾伸直（extension）
B.膝關節屈曲（flexion）
C.踝關節背屈（dorsiflexion）
D.髖關節屈曲（flexion）
27.下列何者不是肩胛上神經（suprascapular nerve）受損的症狀？
A.肩關節屈曲90度以上，伴隨肩胛骨翼狀聳出（winging of scapula）
B.頸椎旋轉至對側時，疼痛增加
C.肩胛外展時，疼痛增加
D.肱骨（humerus）控制變差
28.大致來說肩胛肱骨節律（scapulohumeral rhythm）中盂肱關節與肩胛胸廓關節活動度之比是：
A.1：2
B.2：1
C.1：3
D.3：1
29.下列關於肩部肌肉之肌力與功能控制訓練原則的敘述，何者正確？
A.由等長運動（isometric exercise）進展至動態運動（dynamic exercise）訓練
B.必須由開放鏈（open-kinetic chain）運動進展至閉鎖鏈（closed-kinetic chain）運動
C.先單獨訓練肌力較強的肌群，以避免代償動作產生
D.穩定運動（stabilization exercise）須在上肢承重的狀態下進行，以符合功能性需求
30.治療肩關節不穩之病患時，讓病患恢復競技期（returning to sports phase）之條件，下列敘述何者錯誤？
A.患部幾乎沒有疼痛或觸痛
B.完整的關節活動度
C.適當的本體感覺與神經肌肉控制
D.徒手肌力測試為良好等級（Good）且耐力正常
31.進行關節鏡肩峰下減壓（arthroscopic subacromial decompression）手術之患者，下列何者不符合進入第三期復健運動（動態肌力訓練）之條件？
A.無痛且完整的肩關節活動度
B.穩定的肩關節且無夾擠症狀（negative impingement sign）
C.患側肩部徒手肌力測試結果為四分
D.患側肩部肌力為健側的75%
32.下列有關肱二頭肌長頭肌腱炎的敘述，那些正確？①外觀會有「卜派上臂」（Popeye arm）情形　②肩屈曲阻力測試時，常

伴有疼痛的感覺　③通常C7之皮節（dermatome）有疼痛感　④深部摩擦按摩（deep friction massage）是有效的治療方法
A.僅①③④
B.僅①②④
C.僅②③
D.僅②④
33.施行下列那項肩關節特殊測試時，需要給予肱骨（humerus）一個軸向負荷（axial load）？
A.O'Brien主動壓迫測試
B.歸位移動測試（load and shift test）
C.肩盂唇曲柄測試（labral crank test）
D.喀拉聲測試（clunk test）
34.處於冰凍期的冰凍肩患者，在抬臂過程中伴隨聳肩動作（hiking shoulder），有關其關節內活動（joint play）的檢查結果，下列何者受限最明顯？
A.肱骨頭頭向滑動（cephalad glide）
B.肱骨頭後向滑動（posterior glide）
C.肱骨頭外向滑動（lateral glide）
D.肱骨頭尾向滑動（caudal glide）
35.有關肩關節的穩定性，下列敘述那些正確？①盂肱（glenohumeral）關節前向的穩定性，有賴盂肱韌帶維護　②盂唇（glenoid labrum）加深盂窩，提高穩定度　③有壓力加於肩峰鎖骨關節時，容易造成鎖骨往肩峰下移動　④肩胛後縮（retraction）時，肩峰鎖骨關節在閉鎖（close packed）位置，比較穩定
A.僅③④
B.僅①②
C.僅②③
D.僅①④
36.關於肩關節置換術後的物理治療，下列敘述何者正確？
A.肩關節一律固定於身旁，手肘彎曲90度，放在腹部
B.三週內，肩關節雖不須固定，但最好只做肘關節與腕關節運動
C.應立即加強肩關節與肩胛旁肌肉之肌力訓練
D.肩關節活動度的訓練可採多回合，低重複次數的方式進行
37.患有肩夾擠症之運動員，經運動訓練後，要在每秒180°角速度下之肩外轉肌群等速肌力與肩內轉肌群等速肌力比值至少約為多少時，才可以開始進行投擲運動？
A.70%
B.100%
C.50%
D.120%
38.棘下肌完全斷裂（full-thickness infraspinatus tear）並進行修復手術後，至少需等幾週才可以進行高強度拉筋治療（vigorous stretching）？且最初需避免在肩關節那個動作進行末段範圍拉筋（end-range stretching）？
A.4週、內轉
B.4週、外轉
C.12週、內轉
D.12週、外轉
39.下列有關肘關節活動之敘述，何者錯誤？
A.手肘伸直活動度的喪失是關節內病變的一個敏感指標
B.如果兩手手肘未曾受傷且均有10度以內之過度伸直（hyperextension），此情形可視為正常
C.前臂的旋前旋後動作是由尺骨繞著不動的橈骨所產生
D.手肘攜物角（carrying angle）的角度大小可用以判斷是否有肘外翻（cubitus valgus）現象
40.下列何者較不適用於腕隧道症候群（carpal tunnel syndrome）之治療初期？
A.正中神經滑動運動（median nerve gliding exercise）
B.手指肌腱滑動運動（tendon gliding exercise）
C.反覆用力握球運動（ball grasping exercise）
D.使用手腕護具（splint）
41.有關前臂肌肉位置，由外向內之排列順序，下列何者正確？
A.橈側屈腕肌、旋前圓肌、尺側屈腕肌、掌長肌
B.旋前圓肌、掌長肌、橈側屈腕肌、尺側屈腕肌
C.橈側屈腕肌、掌長肌、尺側屈腕肌、旋前圓肌
D.旋前圓肌、橈側屈腕肌、掌長肌、尺側屈腕肌
42.王先生接受評估檢查時，出現前臂疼痛，同時拇指與食指的捏壓指力以及屈指深肌兩者均呈現無力現象，最有可能是下列那一

條神經異常？

A.後骨間神經（posterior interosseous nerve）

B.尺神經（ulnar nerve）

C.橈神經（radial nerve）

D.正中神經（median nerve）

43.下列有關橈（radial）神經的敘述，何者正確？

A.是由臂神經叢（brachial plexus）之前索（anterior cord）接續下來的

B.後骨間（posterior interosseous）神經是其分支，它支配外展拇指長肌（abductor pollicis longus），但不支配外展拇指短肌（abductor pollicis brevis）

C.其表淺感覺分支（superficial sensory branch）通過腕隧道

D.經過肱骨外髁（lateral epicondyle）後，進入前臂，穿過旋前圓肌（pronator teres）後再分支

44.附圖為何種手部畸形？

A.Boutonniere deformity

B.Swan neck deformity

C.Dupuytren’s contracture

D.Bishop’s hand deformity

45.下列有關大拇指尺側韌帶（ulnar collateral ligament）扭傷的敘述，何者錯誤?

A.此傷害有時又稱為獵場看守人拇指（game-keeper’s thumb）或滑雪者拇指（skier’s thumb）

B.由於周圍肌肉支撐，完全斷裂（第三級）患者很少會出現傷後不穩定的併發症

C.傷後評估可包括關節腫脹程度以及大拇指捏夾（pinch）之力量

D.麻醉下，當大拇指的掌骨指骨關節（metacarpophalangeal joint）在彎曲15度時，橈側偏向（radial deviation）大於35度，此韌帶就是完全斷裂

46.下列有關 pushed elbow 的敘述，何者錯誤？

A.受傷機制常是FOOSH（fall on the outstretched hand）

B.可以橈骨頭（radial head）下滑（inferior glide）之關節鬆動術來治療

C.前臂旋後（supination）通常會受限

D.手肘屈曲可能會受限

47.下列有關膝關節開放鏈與閉鎖鏈動作之敘述，何者正確？

A.當膝關節彎曲大於 70 度執行開放鏈動作有較大的脛股骨關節的壓迫力

B.執行下肢開放鏈動作，當膝關節彎曲至 75 度時，髕股骨關節受到最大壓迫

C.執行下肢閉鎖鏈動作，當膝關節彎曲至 75 度時，後十字韌帶所承受之張力相當於體重

D.執行下肢閉鎖鏈動作，前十字韌帶於膝關節彎曲小於 25 度時承受最大拉力

48.下列有關膝關節半月板切除術（meniscectomy）與半月板修補術（repair）患者復健時程之比較，何者最正確？

A.前者需要較多的關節固定限制，且較晚才可開始承重訓練

B.後者需要較多的關節固定限制，且較晚才可開始承重訓練

C.前者需要較多的關節固定限制，但可較早開始承重訓練

D.後者需要較多的關節固定限制，但可較早開始承重訓練

49.接受膝前十字韌帶重建術之患者，最好能在術後 7 至 10 天內儘快增進膝關節活動至膝屈曲至少幾度以上，以避免日後慢性問題之發生？

A.30

B.40

C.50

D.90

50.下列那些為適合前十字韌帶重建術患者重返競技活動的條件？①完全恢復之膝關節活動度　②以KT-1000測量膝關節鬆弛度，兩膝差異>3mm　③股四頭肌肌力至少為健側的65%　④腿旁肌肌力為健側的100%　⑤腿旁肌與股四頭肌肌力比值>0.7

A.①②③

B.③④⑤

C.②③④

D.①④⑤

51.下列關於Q角度之敘述，何者錯誤？

A.代表髕骨（patella）在額面（frontal plane）之排列情形（alignment）

B.代表股四頭肌與髕骨韌帶之交角

C.在膝伸直且股四頭肌收縮的情況下會大於 15 度

D.與髕骨之滑動軌跡（tracking）相關

52.進行髕骨穩定性測試時，膝關節彎曲角度應約為多少，以便讓髕骨置放於滑車溝（trochlear groove）中？

A.0～5度

B.10～30度

C.45～60度

D.＞90度

53.下列有關膝前十字韌帶重建手術常用的髕骨肌腱移植（patellar tendon graft）與腿旁肌移植（hamstring graft）之比較，何者正確？

A.髕骨肌腱移植採用骨對骨（bone-to-bone ）癒合機制，相較於腿旁肌腱移植，癒合速度較快

B.髕骨肌腱移植採用肌腱對骨（tendon-to-bone）癒合機制，相較於腿旁肌腱移植，癒合速度較快

C.腿旁肌腱移植採用骨對骨（bone-to-bone）癒合機制，相較於髕骨肌腱移植，癒合速度較快

D.腿旁肌腱移植採用肌腱對骨（tendon-to-bone）癒合機制，相較於髕骨肌腱移植，癒合速度較快

54.下列何種肌肉緊縮（muscle tightness）與髕股關節失能（patellofemoral dysfunction）最無關？

A.腿旁肌（hamstrings）

B.腓腸肌（gastrocnemius）

C.股薄肌（gracilis）

D.股四頭肌（quadriceps）

55.下列那一條膝部韌帶單獨損傷時，最常被建議採取非手術治療（nonoperative management）？

A.前十字韌帶損傷

B.後十字韌帶損傷

C.外副韌帶損傷

D.內副韌帶損傷

56.以彈力管（elastic tubing）協助訓練一位前十字韌帶重建病患的腿旁肌，要求病患以患側單腳站立，於健側腳踝使用彈力管給予阻力，讓健側髖關節執行下列那個方向的動作最有助於患側之腿旁肌活化？

A.自後伸（extension）往屈曲（flexion）方向

B.自屈曲（flexion）往後伸（extension）方向

C.自外展（abduction）往內收（adduction）方向

D.自內收（adduction）往外展（abduction）方向

57.下列何者不宜作為復發性的髕骨不穩之保守治療計畫？

A.矯正距下（subtalar）關節於正中位置

B.無痛範圍的股四頭肌強化訓練

C.股內斜肌的生物回饋訓練

D.早期騎腳踏車訓練

58.膝關節受傷經 24 小時後才有滑液（synovial fluid）堆積，此現象與下列何者最相關？

A.骨軟骨骨折（osteochondral fracture）

B.前十字韌帶斷裂（ACL tear）

C.後十字韌帶斷裂（PCL tear）

D.髕骨半脫位（subluxated patella）

59.股骨頭過度前轉（anteversion）可能造成膝關節下列那些問題？

A.膝外翻（genu valgum）或脛骨內扭（medial tibial torsion）

B.膝外翻（genu valgum）或脛骨外扭（lateral tibial torsion）

C.膝內翻（genu varum）或脛骨內扭（medial tibial torsion）

D.膝內翻（genu varum）或脛骨外扭（lateral tibial torsion）

60.當懷疑膝關節有前內側旋轉不穩時，下列那些測試可能為陽性？①30度屈膝之外展壓力（abduction stress）測試　②急拉測試（jerk test）　③30度屈膝之內收壓力（adduction stress）測試　④後外拉抽（posterolateral drawer）測試　⑤外轉反曲（recurvatum）測試　⑥脛骨外轉之前拉抽（anterior drawer）測試

A.僅③④
B.僅⑤⑥
C.僅①⑥
D.僅②⑤
61.足部之外生性骨疣（exostosis）較不常出現於下列何處？
A.跗蹠關節（tarsometatarsal joint）的背側（dorsal side）
B.第五蹠骨的頭端（head of 5th metatarsal）
C.跟骨（calcaneus）
D.蹠趾關節（metatarsophalangeal joint）的背側（dorsal side）
62.下列關於足底筋膜炎（plantar fasciitis）的治療，何者最不適合？
A.短期目標以控制發炎，同時下降足底筋膜的受力為主；長期目標則以矯正機械因子（mechanical factors）為主
B.應該持續做承重運動，以減輕症狀
C.足跟墊（heel pad）可用來降低足跟疼痛
D.可藉由關節鬆動術鬆動後足、距骨下關節（subtalar joint）和舟狀骨（navicular）以增進治療效果
63.下列有關脛神經（tibial nerve）的敘述，何者正確？
A.主要是支配小腿前側肌肉
B.通常腓腸神經（sural nerve）僅源自脛神經
C.和跗骨隧道症候群（tarsal tunnel syndrome）有關
D.影響足外翻（eversion）肌力
64.下列那些是足內翻肌？①腓骨長肌　②脛後肌　③脛前肌　④腓骨短肌
A.僅③④
B.僅②③
C.僅①④
D.僅①②
65.下列有關下肢疲勞性骨折之敘述，何者錯誤？
A.普通X光片不一定能見到骨頭裂縫
B.音叉測試有助診斷
C.嚴重時需手術治療
D.骨折部位的活動不會使疼痛加劇
66.下列有關正常成人在短坐（short-sitting）姿勢下，其脛骨扭轉（tibial torsion）角度範圍和量測方式的敘述，何者正確？
A.脛骨外轉角度約 25 至 30 度，量測內外側股骨上髁連線和內外踝連線投射於橫切面（transverse plane）之夾角
B.脛骨外轉角度約 12 至 18 度，量測內外側股骨上髁連線和內外踝連線投射於橫切面（transverse plane）之夾角
C.脛骨外轉角度約 25 至 30 度，量測足部縱軸和內外踝連線投射於橫切面（transverse plane）之夾角
D.脛骨外轉角度約 12 至 18 度，量測足部縱軸和內外踝連線投射於橫切面（transverse plane）之夾角
67.下列何者不是跟腱炎（Achilles tendinitis）的促成因子？
A.過度使用
B.比目魚肌（soleus）柔軟度不足
C.過度足外翻（hyperpronation）
D.希臘型足（Greek foot）
68.下列何者會呈現蹠趾（MTP）關節過度背屈及近端與遠端趾骨（PIP and DIP）關節屈曲？
A.槌狀趾（mallet toes）
B.爪型趾（claw toes）
C.鎚狀趾（hammer toes）
D.摩頓氏足（Morton’s foot）
69.少棒肘（Little leaguer’s elbow）不包括下列何者？
A.肱骨小頭之骨軟骨炎（osteochondritis of the capitulum）
B.橈骨頭之骨軟骨炎（osteochondritis of the radial head）
C.鷹嘴突生長板發炎（olecranon apophysitis）
D.肱骨外上髁生長線延遲關閉（delayed closure of lateral epicondylar apophyseal line）
70.在指導孕婦做運動時，下列敘述何者正確？
A.當腹直肌分離（diastasis recti）小於 2 公分時，病患可以開始做矯正式的腹肌肌力訓練
B.骨盆痛是懷孕自然現象，多躺下休息就好
C.應多訓練單腳站立有助於孕婦之平衡
D.為了生產容易，應儘量用力做髖內收肌之牽拉
71.下列有關產後三週婦女執行運動的敘述，何者錯誤？
A.應儘早進行骨盆底肌肌肉訓練

B.儘量避免膝胸趴臥姿勢（knee-chest position）
C.應避免施行訓練腹肌的任何運動
D.若運動過程中流血量持續增加，應立即停止運動

72.有關左側長C型脊柱側彎（long C type scoliosis），下列敘述何者正確？
A.病患站直向前彎時，右側背部會看到隆起
B.通常右側肩膀會較高
C.通常右側髂骨嵴（iliac crest）會較低
D.從X光片上看起來，右側椎腳（pedicle）會變小或消失

73.下列有關傷口癒合之敘述，何者正確？
A.急性發炎期只有 3 天，進入慢性期後即可加入熱療
B.在增生期時，組織自己會選擇修復路徑，在上皮增生（re-epithelialization）、纖維與血管增生（fibroplasia with neovascularization）及傷口收縮（wound contraction）中選一個路徑進行
C.所有的物理治療應等到再塑期（remodeling stage），疤痕組織較成熟才可以開始
D.要使疤痕組織有彈性、耐壓，物理治療應在增生期時積極介入

74.下列有關淋巴水腫（lymphedema）運動治療的敘述，何者正確？
A.開始運動前，先做深呼吸及全身放鬆
B.上肢淋巴水腫由手部開始做運動，最後是肩部
C.不做運動時應將上肢下垂以增加血液量
D.下肢淋巴水腫的運動需由單側抱膝至胸（knee to chest）運動開始，先做患側，再做健側

75.下列何種手術是將該組織移除（removal）？
A.fasciotomy
B.myotomy
C.tenotomy
D.meniscectomy

76.下列那些為全髖關節置換術的禁忌症？①髖關節附近肌肉癱瘓　②敗血症　③髖關節劇烈疼痛　④股骨頭壞死
A.①③
B.②④
C.①②
D.③④

77.下列何者不是水中運動訓練（aquatic therapy training）的禁忌症？
A.有開放性傷口且有滲出液的病人
B.肌肉拉傷的病人
C.發高燒的病人
D.有接近破裂的癤（boils）的病人

78.影響骨盆底脫垂（pelvic floor prolapse）患者日常功能表現的原因不包括下列何者？
A.排便困難
B.腹壓增加
C.腹部疼痛
D.會陰部壓力減少

79.下圖主要測試肩關節那個方向動作之活動度？

A.內轉
B.外轉
C.外展

D.旋前

80.承上題，關於病患於圖中的表現，下列敘述何者最不適當？

A.左肩之關節活動較右肩大

B.病患之慣用手可能為右手

C.病患右肩可能有後側關節囊緊縮現象（posterior capsular tightness）

D.病患左肩可能有前上側關節囊緊縮現象（anterosuperior capsular tightness）