100年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師、營養師、心理師、高等暨普通考試醫事人員考試暨高等考試醫師考試分試考試試題

代號：4107
頁次：8－1

等　　別：高等考試
類　　科：中醫師
科　　目：中醫臨床醫學㈡（包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學）
考試時間：1小時30分　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本試題禁止使用電子計算器。

1 65歲男性患者，近半年來症見咳嗆氣急，痰少質黏，時時咯血色鮮紅，午後潮熱與顴紅，舌質紅絳苔剝，脈細數，西醫診斷為開放性肺結核。依中醫辨證，下列何者最宜？
(A)痰熱鬱肺　(B)痰濁壅肺　(C)陰虛火旺　(D)風熱襲肺

2 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)百合固金湯　(B)滌痰湯　(C)清燥救肺湯　(D)桑菊飲

3 60歲女性患者，有多年吸菸史合併支氣管擴張病史，有用支氣管擴張劑控制，近1個禮拜來被家屬發現患者的呼吸狀態呈現張口抬肩，無法平臥休息。其咳嗽痰多色黃，胸中煩熱，口渴喜冷飲，舌苔黃，脈滑數，其肺功能檢查發現第一秒用力吐氣容積（forced expiratory volume in 1 second，FEV_1）的預測值比率（FEV_1% predicted）只剩下50%。依中醫辨證，下列何者最宜？
(A)痰熱鬱肺　(B)痰濁阻肺　(C)肺氣鬱痹　(D)風熱襲肺

4 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)麻杏甘石湯　(B)二陳湯　(C)桑白皮湯　(D)三子養親湯

5 感冒後出現頭重痛，惡寒，身重，疼痛，身熱不甚，食後則熱象較顯，胸脘悶、納呆，口不渴，面色淡黃，舌質淡苔白膩，脈象濡緩。以下列何者治療最佳？
(A)川芎茶調散　(B)保和丸　(C)藿朴夏苓湯　(D)甘露消毒丹

6 有關「驚悸」發生的病因病機，下列何者最不相關？
(A)「心虛膽怯」是由於突然受到驚嚇，使心驚神慌不能自主，漸至稍驚則心悸不已
(B)大怒傷肝，怒則氣逆，亦可動撼心神，而發驚悸
(C)大恐傷腎，恐則精卻，陰虛於下，火逆於上，亦可發生驚悸
(D)大悲傷肺，肺失宣降，金虛引火來乘，亦可發生驚悸

7 林小姐因為昨天辦公室冷氣太冷，今晨起咽癢咳嗽，痰白黏，自覺量多但難咳出，每次咳出痰量不多，微胸悶，不喘，無惡寒發熱，亦無肢體酸痛重等見症，納可，二便平。診其脈浮滑，苔白，舌質淡紅偏黯，治以下列何方最宜？
(A)《傷寒論》小青龍湯　(B)《外科理例》荊防敗毒散
(C)《溫病條辨》杏蘇散　(D)《和劑局方》華蓋散

8 45歲女性患者，主訴心悸已1月餘，並自訴有月經量過多的情形，其它症狀並有面色不華，倦怠無力，頭暈失眠，脈細弱，舌質淡胖，苔白。下列診斷何者最適宜？
(A)心虛膽怯　(B)心血不足　(C)肝腎陰虛　(D)心陽不振

9 承上題，最適合以下列何方治之？
(A)安神定志丸　(B)歸脾湯　(C)六味地黃丸　(D)桂枝加龍骨牡蠣湯

10 67 歲男性患者，務農。自訴罹患高血壓十多年，持續以西藥控制。近一年來卻覺血壓逐漸偏高，西藥加量也無法控制穩定。來診時見身材消瘦，面色暗，BP：170/110 mmHg，近來嚴格控制飲食，每餐只吃半碗飯，少油少肉，但血壓仍偏高。自覺易疲倦，目濇目糊，腰背酸痛，畏冷，夜尿頻而清長。診其苔薄白潤，脈沉細兩尺無力。本病證的主要病機以下列何者最宜？
(A)熱極生風 (B)腎陽虧虛 (C)肝陽偏亢 (D)氣滯血瘀

11 承上題，中醫師在診療後投以處方二週，並衛教恢復均衡飲食，改善營養狀態。患者回診時自訴近一週來血壓有逐漸緩和跡象。BP：150/95 mmHg，精神進步，腰酸與頻尿都有減輕。依中醫辨證論治的原則，下列何者是最可能讓病情改善的處方？
(A)羚羊鉤藤湯 (B)柴胡加龍骨牡蠣湯 (C)血府逐瘀湯 (D)桂附地黃丸

12 有關不寐的辨證論治要點，下列敘述何者錯誤？
(A)要辨明是入寐困難，或寐而不酣，或時寐時醒，或醒後不能再寐，或整夜不能入寐
(B)虛證多屬陰血不足，責在心肺脾腎四臟
(C)實證多因肝鬱化火，食滯痰濁，胃腑不和
(D)實證日久，氣血耗傷，亦可轉爲虛證

13 有關五臟水辨證，其身重而少氣，不得臥，煩躁，其人陰腫者，屬下列何者？
(A)心水 (B)肺水 (C)腎水 (D)肝水

14 65 歲男性，小便點滴不爽，排出無力，腰膝冷而酸軟無力，診其舌質淡，脈沉細而尺弱，以下列何方治療最宜？
(A)濟生腎氣丸 (B)知柏地黃丸 (C)加味逍遙散 (D)血府逐瘀湯

15 52 歲女性患者 155 公分 41 公斤，因患潰瘍性結腸炎，每日口服類固醇 6 顆，仍覺左下腹痛，故就診中醫。症見大便日 5、6 行，味腥臭、質稀，有果凍物及便血。患者個性急，易緊張，易胸悶，身倦乏力，怕冷。診其舌淡胖有齒痕苔薄白，脈沉細弦。以下列何者治之最適當？
(A)加味逍遙散合補中益氣湯加減 (B)柴胡疏肝湯和參苓白朮散加減
(C)痛瀉要方合理中湯加減 (D)逍遙散合四神丸加減

16 患者今天早上腹痛泄瀉多次，瀉下急迫，瀉後不爽，大便黃褐而臭，肛門灼熱，小便短赤。診其舌苔黃膩，脈濡數，治以下列何方最宜？
(A)枳實導滯丸 (B)白頭翁湯 (C)藿香正氣散 (D)葛根芩連湯

17 患者食後脘腹脹滿，朝食暮吐，暮食朝吐，吐出宿穀不化，吐後即覺舒適，神疲乏力，面色少華，舌淡苔白滑，脈細緩無力，治療宜下列何方最適宜？
(A)附子理中湯 (B)苓桂朮甘湯 (C)大半夏湯 (D)丁香透膈散

18 患者下腹痛劇，痛如針刺，痛處固定不移，舌質紫黯，脈細澀。以下列何者治療最宜？
(A)桃核承氣湯 (B)少腹逐瘀湯 (C)失笑散和丹參飲 (D)大黃牡丹皮湯

19 臌脹的主要特徵，不包括下列何者？
(A)望診可見病人腹部突出，腹部脹大繃急
(B)後期可見臍心突出、青筋暴露，脈絡瘀阻
(C)面色多屬萎黃，面部或頸胸部皮膚出現紅絲赤縷
(D)浮腫多從四肢目窠開始，繼而及於周身

20 中醫除了宏觀辨證外，也可從病機上結合微觀辨證，下列病況何者較少運用行氣活血法治療？
(A)慢性間質性肺炎 (B)肺部纖維化 (C)感冒恢復期 (D)心肺症

21 臌脹病，若證見腹大脹滿，按之如囊裹水，胸腹悶脹，神疲乏力，畏寒食少，小便少，大便溏瀉，舌淡紅、苔薄白，脈沉緩。治以下列何方最宜？

(A)中滿分消丸　(B)茵陳四苓散　(C)軟堅丸　(D)實脾飲

22 患者的主要病灶如附圖，病灶兩側對稱，質地柔軟，表面光滑，可隨吞嚥動作而移動，則下列那一個診斷最不合適？

(A)瘿囊　(B)瘿腫　(C)瘿氣　(D)石瘿

23 關格病在脾胃的證治要點，下列敘述何者正確？

(A)若症見面㿠、乏力、身重、水腫而兼有噁心嘔吐，則以濁邪犯胃爲主

(B)證見濁邪犯胃，可用旋覆代赭石湯，和胃降逆化濁

(C)若症見噁心頻作、嘔吐不止，舌苔厚膩而兼見面㿠、乏力、納呆等症，則以濁邪困脾爲主

(D)證見濁邪困脾，可用理中湯，行氣化濁

24 患者症見眼瞼浮腫，繼則四肢及全身水腫，來勢迅速，伴見惡風、自汗出、微身熱、肢節酸楚，口不渴，小便不利，舌苔薄白，脈浮。以下列何方治之最宜？

(A)防己黃耆湯　(B)越婢湯　(C)防己茯苓湯　(D)麻黃連翹赤小豆湯

25 下列中藥何者含有馬兜鈴酸，長期服用易導致腎病變？

(A)關木通　(B)川木通　(C)粉防己　(D)木防己

26 《景岳全書・腫脹》云「此雖壯水之劑，而實即脾肺腎三臟之正治也」；趙養葵譽爲「誠治腫之成方」，爲下列何方？

(A)金匱腎氣丸　(B)五苓散　(C)實脾飲　(D)真武湯

27 某 55 歲女性患者，近七、八年常常被家屬發現無故哭泣，同時有精神恍惚，心神不寧的現象。四診可見舌質淡、苔薄白，脈弦細。下列敘述何者錯誤？

(A)此屬《金匱要略》所述「臟躁」證　(B)證型屬於氣鬱化火擾心

(C)常用方劑爲甘麥大棗湯　(D)本病除藥物治療外，精神治療極爲重要

28 淋證屬小便不甚赤澀，但淋瀝不已，時作時止，遇勞即發者，治以下列何方最宜？

(A)萆薢分清飲　(B)八正散　(C)導赤散　(D)無比山藥丸

29 關格病常見濁邪壅滯三焦，損傷陽氣，若病人臨床上爲實證之患者，用下列何藥以降濁最爲適宜？

(A)石膏　(B)大黃　(C)代赭石　(D)黃連

30 65 歲退休的男性患者，有氣喘病史且反覆發作數十年，證見乾咳、咳聲短促，痰少黏白，或痰中挾血，口乾咽燥，聲音嘶啞，顴紅、午後潮熱、手足心熱，舌紅，少苔，脈細數。治以下列何方最宜？
(A)瀉白散合黛蛤散　(B)定喘湯
(C)沙參麥冬湯加減　(D)麻杏甘石湯合四君子湯

31 下列有關痿證之敘述，何者正確？①痿證分為皮痿、脈痿、筋痿、肉痿、骨痿等五種　②脈痿乃心氣熱、脈虛，樞折挈、脛縱而不任地　③筋痿乃肝氣虛，筋膜乾，膽泄口苦、筋急　④骨痿乃骨枯髓減，腰脊不舉　⑤皮痿乃肺氣熱，皮毛虛弱急薄而生痿躄
(A)②③⑤　(B)①②③④　(C)①②④⑤　(D)①②③④⑤

32 40 歲女性患者近來經常抱怨有手腳發麻的情形，經就診並給與診察後發現，其四肢肢端於緊張或遇冷易呈現間歇性的發白、紫紺或脹紅等現象，並且其症狀在寒冷季節會加重，此乃雷諾氏症（Raynaud's disease），此症最接近中醫之下列何者範疇？
(A)筋痹　(B)脈痹　(C)皮痹　(D)肌痹

33 承上題，若其人症見脈細微，口唇及舌略淡，則以下列何處方治療較為恰當？
(A)四逆散　(B)四妙勇安湯　(C)導赤散　(D)四逆湯

34 若關節炎患者上肢症狀特別嚴重，最宜佐加下列何者以增加療效？
(A)地龍　(B)狗脊　(C)薑黃　(D)木瓜

35 47 歲女性患者，身高 154 公分，體重 43 公斤，血壓：117/69 mmHg、心跳：95 下/分，初診主訴不易入睡，口乾，平時容易緊張，易怒，身有燥熱感，經常會覺得心慌，胸悶，心煩少寐，日間神疲，骨關節僵硬不舒，頸項僵硬，舌口水咽有異物感，月經週期不規則，經期淋瀝。望診可見患者形瘦，頸前稍腫但腫塊柔軟，舌紅絳、脈細弦數，經抽血檢查女性荷爾蒙正常，甲狀腺素偏高。針對此位病人的診斷，以下列何者最為適宜？
(A)癭病　(B)瘰癧　(C)臟躁　(D)經斷前後諸症

36 承上題，用方以下列何者最為適宜？
(A)治法：理氣舒鬱、化痰消癭。主方：四海舒鬱丸
(B)治法：理氣化痰、活血消癭。主方：海藻玉壺湯
(C)治法：滋養腎陰、清肝瀉火。主方：天麻鉤藤飲
(D)治法：滋養陰精、寧心柔肝。主方：天王補心丹

37 關於黃疸病的鑑別診斷，下列相關敘述何者錯誤？
(A)黃疸病的診斷依據是目黃、身黃與小便黃赤，其中以小便黃赤為最早出現而最晚消失的指徵
(B)萎黃與黃疸的鑑別要點在於萎黃病之目睛不黃，小便自利
(C)黃疸病以兩目黃染為特徵；黃疸之黃分布均勻，遍及整個眼白
(D)陽黃黃色鮮明，屬熱證實證；急黃身黃如金，屬虛實錯綜，寒熱夾雜之證

38 《內經》中對於消渴（消癉）的病機描述，下列那些是正確的？①「心移熱於肺，則為肺消」是上焦內熱的表現　②「胃中熱則消穀，令人懸心善飢」是中焦胃火的表現　③「陽氣有餘，陰氣不足，則熱中善飢」是胃陰不足的表現
(A)①②　(B)①③　(C)②③　(D)①②③

39 消渴日久，經絡不利，血氣壅滯，易發為癰疽，瘡癬、痤痱。若癰疽初起毒熱蘊營，下列那一個處方最為合適？
(A)《活人書》人參敗毒散　(B)《醫宗金鑑》五味消毒飲
(C)《聖濟總錄》托裏黃耆湯　(D)《金匱要略》黃耆桂枝五物湯

40 某女性患者爲腰痛所苦已近半年，初發時每遇天雨或天熱時加重，而且痛處摸起來熱熱的，活動後可以稍稍緩解，小便量不多而且顏色深黃，口渴喜飲，大便偏軟，近來常有手足心熱熱的感覺，且不時腰酸。診其苔薄黃微膩，舌邊少苔，脈濡而略數，則治以下列何方最宜？
(A)四妙丸加梔子、澤瀉、木通　(B)四妙丸加女貞子、旱蓮草
(C)身痛逐瘀湯加梔子、澤瀉、木通　(D)身痛逐瘀湯加女貞子、旱蓮草

41 33 歲男性患者就診時主訴兩側頭痛，痛甚時伴眩暈，近期因工作量大，常心煩發怒，口乾苦，有時兩脅下脹痛，眠淺多夢，二便平。望其舌色偏紅，舌苔薄黃而乾，脈弦。治以下列何方最宜？
(A)羌活勝濕湯　(B)加味逍遙散　(C)柴胡疏肝散　(D)天麻鉤藤飲

42 38 歲男性患者平日情緒急躁，工作壓力較大，心煩失眠，近日癲癇舊疾發作，每次持續數分鐘，屬大發作，發作時昏仆抽搐吐涎，或有叫吼，醒來又如常人。患者口苦而乾，便秘，診其舌紅苔黃膩，脈弦滑數，其辨證以下列何種證型最正確？
(A)風痰閉阻　(B)痰火內盛　(C)氣鬱化火　(D)虛風內動

43 46 歲女性患者因近日感悶悶不樂，胸脅悶脹就診，平時個性求完美又性子急，偶有胃酸逆流，口苦口乾。診其舌紅苔黃，脈弦細數，其治療以下列何方最適宜？
(A)丹梔逍遙散加左金丸　(B)半夏厚朴湯加瓜蔞皮　(C)甘麥大棗湯加減　(D)柴胡龍骨牡蠣湯加減

44 有關胸痹的辨證要點與治療，下列敘述何者錯誤？
(A)嚴重者伴冷汗出，面白唇紫，手足青至節，旦發夕死
(B)一般發作期以標實爲主，常見有陰寒內結、痰濁閉阻、血瘀氣滯
(C)其病位在心，多爲風寒濕夾雜而致病
(D)治療上必須決定本虛與標實的輕重緩急，以決定是何者爲主

45 72 歲男性患者在鄉間種菜養老，平時身體一向良好。抽菸近五十年。兩個月前他開始咳嗽，隱隱發熱，有時會咳出腥臭的濁痰，甚至挾有膿血，胸部有滿悶痛感，經醫師診脈後發現脈數。依中醫辨證，其治則以下列何者最宜？
(A)清熱化瘀，排膿解毒　(B)宣肺化痰，清熱涼血　(C)清熱化痰，寬胸宣肺　(D)大補氣血，托裏排膿

46 一婦人罹患乳癌，咽乾唇燥，口乾喜飲，大便乾結，五心煩熱，舌紅無苔或剝落，脈象沉細而數，下列何項治法最適宜？
(A)平補肝腎　(B)清熱通腑　(C)養陰生津　(D)滋陰養血

47 78 歲女性乳癌患者，拒絕西醫治療，自訴最近乳房迅速增大，伴有發熱，兼有紅腫，破潰呈翻花樣，血水外滲，伴有瘡面惡臭，潰難收口，消瘦乏力，口乾舌燥，大便秘結，小便赤黃等症。診其舌質紅絳，舌苔黃膩或厚，脈弦數。治以下列何方最宜？
(A)清瘟敗毒散　(B)大補陰丸　(C)人參養榮湯　(D)大柴胡湯

48 45 歲女性患者項部長年有頸前腫塊，按摸是硬塊或結節感，食慾不佳，胸悶，舌上有青紫色的瘀點，其治療以下列何方最宜？
(A)海藻玉壺湯　(B)益氣聰明湯　(C)藻藥散　(D)玉屏風散

49 有關中醫婦科學術理論，下列敘述何項錯誤？
(A)朱丹溪倡「陽常有餘，陰常不足」之說，重視保存陰精
(B)李東垣認爲「內傷脾胃，百病由生」，治法著重升發脾胃陽氣
(C)劉完素治婦人經閉，主張用寒涼瀉火法
(D)薛己對於婦產科疾病的治法，比較傾向於補益和散風寒

50 有一處方：「熟地 5 錢、山茱萸 3 錢、黨參 3 錢、菟絲子 3 錢、五味子 1.5 錢、山藥 4 錢、遠志 1.5 錢、炙甘草 1 錢」治療李小姐的月經先後不定期有顯著效果。試問下列何者應是李小姐就診當時最主要的症候之一？
(A)經行不暢，乳房作脹　(B)大便稀溏，腰脊酸痛
(C)經少色淡質清稀　(D)經行小腹絞痛

51 承上題，李小姐之月經先後不定期的病因病機，下列何者正確？
(A)肝脾損傷，氣血兩虛，衝任不足　(B)怒氣傷肝，肝氣逆亂，血隨氣行
(C)中焦不足，陽氣下陷，血海失固　(D)腎氣不足，封藏失司，衝任不調

52 35 歲患者經來點滴即止，色淡，質稀如水，頭暈，手足不溫，舌淡，脈細，最宜處以下列何方？
(A)《婦人良方》固經丸　(B)《景岳全書》保陰煎
(C)《產寶百問》人參滋血湯　(D)《金匱要略》腎氣丸

53 經來前一至二天少腹脹痛，量少不暢，經色黯紫有塊，塊出痛減，拒按，伴胸脇乳脹，舌紫黯，脈弦，最宜處以下列何方治之？
(A)溫經湯　(B)艾附暖宮丸　(C)膠艾四物湯　(D)膈下逐瘀湯

54 下列何者是《醫學衷中參西錄》壽胎丸與《景岳全書》泰山磐石散相同的組成？
(A)菟絲子　(B)續斷　(C)枸杞子　(D)杜仲

55 導致血熱崩漏的原因為何？
(A)平日思慮過多，傷於心脾　(B)陰虛肝旺，或平素體質陽氣亢盛
(C)長期月經過多，或流產及產育過多　(D)宿瘀內結胞宮，或墜胎，小產殘物瀦留未清

56 某 51 歲女性患者主訴已停經一年多，頭暈耳鳴，腰酸乏力，兩足不溫，時或怕冷，時或烘熱，舌質淡，脈沉細。則下列何辨證診斷最適當？
(A)肝腎陰虛　(B)脾腎陽虛　(C)腎虛肝旺　(D)腎陰陽兩虛

57 32 歲女性因陰血虧虛，陽氣偏旺，血海蘊熱，故婚久不孕，治宜滋陰養血，調沖益精，治以下列何方藥最適宜？
(A)養精種玉湯加女貞子、旱蓮草　(B)毓麟珠加紫河車、丹參、香附
(C)啓宮丸加當歸、川芎　(D)膠艾湯加龜板、雞血藤

58 傅青主言：「帶下色黃者，宛如黃茶濃汁，其氣腥穢，所謂黃帶是也。」其病機為下列何者？
(A)濕盛而火衰，肝鬱而氣弱　(B)肝經鬱火內熾
(C)火熱之極也　(D)任脈之濕熱

59 下列有關滑胎的敘述，何者錯誤？
(A)張錫純立方之「壽胎丸」，以「腎旺自能蔭胎」的觀念，重用菟絲子為君
(B)治療滑胎應「預培其損」，並且懷孕後仍應堅持長期治療
(C)治療滑胎，當慎用辛散香燥或苦寒之品
(D)滑胎之治療期限不宜超過以往殞墮的妊娠月

60 妊娠期間，出現尿頻，尿急，淋瀝澀痛，證屬濕熱下注者，最宜以下列何方治療？
(A)加味五淋散　(B)桑螵蛸散　(C)清心蓮子飲　(D)知柏地黃丸

61 產後血虛，小腹隱隱作痛，若面色蒼白，畏寒喜熱者，可用當歸生薑羊肉湯，養血溫中，方中重用下列何者以溫中補虛？
(A)當歸　(B)生薑　(C)肉桂　(D)羊肉

62 下列有關「兒枕痛」的敘述，何者正確？
(A)產後小腹痛　(B)產後腰痛　(C)妊娠淋痛　(D)臨盆耻骨聯合痛

63 30 歲女性患者產後一個多月，遍身關節腫脹疼痛，麻木重著，得熱則舒，並伴見頭暈，心悸，舌淡，苔薄白膩，脈細無力。其辨證及治則以下列何者最適當？
(A)氣虛夾瘀之證，宜益氣活血、化瘀通絡
(B)血虛夾濕之證，宜養血疏經、除濕通絡
(C)風寒濕三氣雜至，宜祛風散寒、除濕止痛
(D)腎虛又感風寒之證，宜補益腎氣、祛風散寒

64 下列何者為《達生篇》保產無憂方中，用以利肺氣的藥物？
(A)川貝 (B)桑白皮 (C)杏仁 (D)枳實

65 赤游丹症見患部皮膚焮赤疼痛，高熱，心煩，唇燥口乾，舌絳苔黃，神昏、抽搐者，最宜治以下列何方？
(A)神犀丹 (B)錫類散 (C)瀉心導赤散 (D)黑錫丹

66 有關小兒痰濕咳嗽的加減治療，下列何者正確？①濕痰重者加半夏、陳皮、薏仁 ②夾食者加神麯、麥芽、山楂 ③胸悶不適者加枳殼、蘇梗 ④鬱久化熱，證見咳吐黃痰，加白芥子、天南星
(A)①③④ (B)①②③ (C)②③④ (D)①②④

67 一位 3 歲大的小兒，4 天前右足小腿被不知名的昆蟲叮咬，癢甚，不時搔抓至破皮流血。昨天起，傷處皮膚出現紅腫，形如雲片，焮熱腫痛，游走不定，發熱惡寒，煩躁哭啼，舌紅苔黃。雖已用西藥，效仍未顯，家長急欲中藥配合，宜下列何者？
(A)水牛角，黃連，金銀花，連翹，赤芍，生地，防風，荊芥，牛蒡子
(B)水牛角，豆豉，金銀花，連翹，黃芩，人中黃，板藍根，生地，玄參，紫草，天花粉，石菖蒲
(C)金銀花，當歸，玄參，連翹，黃耆
(D)金銀花，野菊花，蒲公英，紫花地丁，青天葵，白附子

68 依《醫宗金鑑》小兒感冒夾食證的敘述，下列何者正確？①臨床表現是發熱憎寒，頭疼惡食，噯臭吐酸，便秘尿澀，腹熱膨脹 ②熱盛者用雙解通聖散 ③內無熱者用保和丸 ④表邪既解，調理脾胃用平胃散加消導藥
(A)①②③④ (B)①②④ (C)①③④ (D)①②③

69 依《醫宗金鑑．兒科雜病心法》瀉證門：「脾胃濕盛成水瀉，懶食溏瀉色多黃，清濁不分溺短濇」，治以下列何法最適當？
(A)理中湯溫中，訶子散止瀉
(B)先以訶子散止瀉，再以調中湯溫補之
(C)先用和氣散除濕，再以調中湯溫補之
(D)胃苓湯除濕，瀉久不止則用升陽除濕湯

70 厭食是小兒的一種常見病證，一位六歲小男孩，出現口乾多飲而不喜進食，皮膚乾燥，缺乏潤澤，大便乾結，舌苔光剝，甚至有時光紅少津，舌質紅，脈細。治以下列何方最適宜？
(A)參苓白朮散 (B)麯麥枳朮丸 (C)沙參麥門冬湯 (D)養胃增液湯

71 某三歲小男孩突然高熱昏迷、譫妄抽搐，嘔吐腹痛，大便腥臭，舌質紅，苔黃膩，脈滑數。此最可能由下列何因所造成？
(A)感受風邪 (B)感受暑邪 (C)濕熱疫毒 (D)外感驚風

72 《醫宗金鑑》麻疹未出證治：「若兼風寒食滯熱，隱伏不出變叢生」，應以下列何方治療？
(A)升麻葛根湯 (B)荊防敗毒散 (C)宣毒發表湯 (D)元參升麻湯

73 依《醫宗金鑑》所述，小兒瘟疫指的是天地之厲氣流行，明顯是一種高度流行感染疾病之記載，治療之方法，有發、攻與清法之不同，其中發法用下列何者？
(A)麻黃湯 (B)荊防敗毒散 (C)銀翹散 (D)柴葛解肌湯

74 依《幼科雜病心法．淋證門》有關血淋的治療，下列何者正確？
(A)方用小薊飲子，若莖中痛用五淋散 (B)方用豬苓散
(C)方用十味導赤湯，大便結急服八正散 (D)方用葵子散

75 2 歲男童發熱持續不退 2 個月，午後發熱較高，適逢夏季，氣溫愈高則發熱愈高，口渴多飲，皮膚灼熱無汗，口唇乾燥，小便頻數，量多，舌紅，苔薄黃，脈數。治以下列何方最恰當？
(A)生石膏、半夏、麥冬、人參、竹葉、甘草、粳米
(B)大黃、芒硝、甘草、梔子、黃芩、薄荷、連翹、竹葉、白蜜
(C)西洋參、麥冬、知母、甘草、竹葉、黃連、石膏、荷梗、鮮西瓜翠衣、粳米
(D)香薷、銀花、扁豆花、厚朴、連翹

76 承上題，若以上方治療未癒，並出現心煩欲嘔，脈細數無力，舌紅少苔，則應用下列何方最適當？
(A)青蒿、鱉甲、生地、知母、丹皮
(B)香薷、銀花、扁豆花、連翹、厚朴
(C)竹葉、石膏、人參、甘草、麥冬、粳米、半夏
(D)沙參、麥門冬、玉竹、甘草、桑葉、白扁豆、天花粉

77 依《醫宗金鑑》有關小兒吐血治療的敘述，下列何者正確？①吐血不咳嗽者，因內熱致血妄行上行，用四物三黃瀉心湯 ②努勞吐血兼咳嗽者，先用桃仁承氣湯破逐，次用加味四物湯和之 ③勞傷吐血兼咳嗽，痰中帶血有熱者，用救肺散 ④勞傷吐血兼咳嗽，痰中帶血無熱者用雞蘇散
(A)①② (B)③④ (C)①③④ (D)②

78 7 歲患者，咽痛後，皮膚下肢出現瘀點、瘀斑，壓之不褪色，斑色紅赤，伴有腹痛，口渴，汗出，舌質紅，檢查有血尿，體溫 38.8℃，心跳每分鐘跳 95 次。治以下列何者最適宜？
(A)石膏、知母、甘草、犀角、粳米、玄參
(B)麻黃、石膏、杏仁、甘草、細茶
(C)銀花、連翹、豆豉、牛蒡子、荊芥、薄荷、桔梗、蘆根、竹葉、甘草
(D)竹葉、石膏、半夏、麥門冬、人參、甘草、粳米

79 針對腦性麻痺的相關敘述，下列何者錯誤？
(A)古代所稱五軟，很可能是指該類患兒之低張狀態
(B)以強直型（rigidity）最常見
(C) 12 歲以前爲治療黃金期
(D)中醫治療時先後天補養與併發症的控制並重

80 依《醫宗金鑑．痘疹心法》毒熱移入大腸經，傳化失常瀉泄引起腸炎，若疹已發而作瀉，宜治以下列何方？
(A)升麻葛根湯加赤苓、豬苓、澤瀉 (B)三黃石膏湯加赤苓、豬苓、木通
(C)黃連解毒湯加赤苓、木通 (D)清熱導滯湯加車前子、澤瀉