101年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師考試暨普通考試護士考試、101年專門職業及技術人員高等考試中醫師（第一試）考試分試考試、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：中醫師
科　　目：中醫臨床醫學㈡（包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學）
考試時間：1 小時 30 分　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 肺心病之患者，在病情上與下列何種證型較無關？
㈠木火刑金　㈡水飲凌心射肺　㈢氣滯血瘀　㈣腎不納氣

2 25 歲女性患者，無慢性疾病史，主訴二週前開始咳嗽並有黃膿痰，發熱口乾，胸滿痛。診其舌苔黃質紅，脈洪數，X 光片顯示有肺膿瘍但無開洞，關於此病證之中醫治法，下列何者最適宜？
㈠清肺解表　㈡清肺消癰　㈢排膿解毒　㈣托裏排膿

3 承上題，治以下列何方最適宜？
㈠銀翹散　㈡托裏消毒飲　㈢葦莖湯　㈣加味桔梗湯

4 32 歲女性患者，罹患支氣管哮喘已二年，自訴不定時發作，尤其是餐後臥時易發，和冷熱飲食及天候變化無關，發作時無惡寒發熱、咽乾或咽痛、咳嗽等症狀，反而會合併有泛酸、脘痞悶、嘈雜等不適感，平時納可，二便平。診其脈滑有力，苔白膩，治以下列何方最適宜？
㈠定喘湯　㈡小青龍湯　㈢半夏厚朴湯　㈣香砂六君子湯

5 64 歲男性患者，最近因慢性支氣管炎急性發作就診，症見發燒至攝氏 38.8 度，不惡寒，咽癢咳嗽，痰黃稠，胸悶，喘促，四肢無不適，苔黃膩舌質紅，朱點，脈滑數。治以下列何方最適宜？
㈠銀翹散　㈡瀉白散　㈢千金葦莖湯　㈣麻杏石甘湯

6 某患者平時不咳，但每次上台報告或考試等壓力大時容易咳嗽，痰少難出，苔薄白，舌淡紅，脈弦。治以下列何方最適宜？
㈠金沸草散　㈡半夏厚朴湯　㈢華蓋散　㈣黛蛤散

7 有關癲狂證的病因病機與辨證論治，下列何者錯誤？
㈠癲狂證患者的家族往往有類似病史　㈡癲狂證的病變部位主要在肝膽心脾
㈢癲狂證的主要病因病機為心脾積熱、肝腎陰虛　㈣癲證可以轉化為狂證，狂證日久又可轉為癲證

8 60 歲男性患者，主訴為胸悶痛近 1 週發作，時輕時重，發作時疼痛持續約 1 分鐘，搬重物或爬樓梯後痛易發作，並見呼吸氣短，形寒肢冷等，舌淡紅苔白，脈沉遲，以下列何方治療最適宜？
㈠炙甘草湯　㈡栝蔞薤白白酒湯　㈢生脈散　㈣橘枳薑湯

9 68 歲男性患者，罹患高血壓、糖尿病二十年，西藥規則控制中。患者風濕性心臟病，已於十年前接受人工主動脈瓣置換術，目前仍於心臟科門診追蹤診療。來診時主訴手腳末端有寒冷感已十天，近來同時出現面紅、腹痛腹瀉、乾咳、心悸的症狀。診其舌苔薄乾，舌質稍紅，脈沉有力。本病的病機為何？
㈠心陽虧虛　㈡陰竭於內，陽亡於外　㈢陽氣內鬱　㈣陰盛於內，格陽於外

10 承上題，面對此病證，如何進一步處理才是最佳方案？
㈠陰盛於內，格陽於外。宜投以通脈四逆湯，以溫通內外陽氣
㈡陰竭於內，陽亡於外。宜投以通脈四逆加豬膽汁湯，益陰回陽
㈢陽氣內鬱。宜投以四逆散，透達陽氣
㈣心陽虧虛。宜投以麻黃附子細辛湯，溫助心陽

11 水腫從脾論治的辨證要點，下列敘述何者錯誤？
㈠眼瞼浮腫，繼則四肢皆腫，來勢迅速者　㈡四肢腫，甚至腰以下腫甚，或單腹腫滿者
㈢臨床症見水腫伴有納呆、便溏、身倦之象　㈣水腫發生以前有水濕外受或內傷脾胃之因素

12 70 歲男性患者，高脂血症、高血壓已三十年。近日因天氣變化，感冒風寒，發熱 38℃，同時出現惡寒、頭痛、骨節酸痛、無汗的症狀，診之脈浮緊。服麻黃湯後，發出一點汗，熱勢退，但是身體仍覺微溫，仍有惡寒頭痛、骨節酸痛，而且感覺心悸無力，陣發頭暈眩，手足肌肉抽動，站立不穩。此病候的病機為何？
(A)表證未解，陰氣已傷　(B)表證欲解，陰氣已傷
(C)表證未解，陽氣已傷　(D)表證欲解，陽氣已傷

13 承上題，面對此病候，如何進一步處理才是最佳方案？
(A)急投以芍藥甘草湯，斂陰固液　(B)靜待表解，陰液自復
(C)急投以真武湯，溫陽利水　(D)靜待表解，陽氣自復

14 65 歲男性，主訴小便不爽數月，症見脅腹脹滿，多煩善怒，苔薄黃，舌紅，脈弦，診斷為良性前列腺肥大，以下列何方治療最適宜？
(A)沉香散　(B)八正散　(C)導赤散　(D)豬苓湯

15 45 歲女性乾燥症候群（Sjogren’s syndrome）患者，症見口乾燥，目乾澀，視物模糊，眩暈耳鳴，兩脅隱痛，指甲枯脆，失眠，腰痠，膝軟乏力，手足易麻，舌質紅苔少，脈弦細數，試問下列診斷何者最適宜？
(A)燥邪犯肺　(B)肺腎陰虛　(C)脾胃陰虛　(D)肝腎陰虛

16 承上題，以下列何方治療最適宜？
(A)一貫煎　(B)玉女煎　(C)百合固金湯　(D)清燥救肺湯

17 38 歲婦人產後便秘，解出困難，身倦乏力，脈細無力，苔薄白質淡。下列何方治之最適宜？
(A)補中益氣湯加麻子仁丸　(B)潤腸湯合枳食導滯丸
(C)八珍湯加首烏、桃仁、白蜜　(D)溫脾湯加減

18 10 歲男童，晨起突然嘔吐，發燒至 38℃，頭身疼痛，胸脘滿悶，不思飲食，舌苔白，脈濡緩。下列處方何者最適宜？
(A)藿香正氣散　(B)葛根芩連湯　(C)新加香薷飲　(D)旋覆代赭石湯

19 78 歲男性患者，與友人聚餐後出現胃脘疼痛，脹滿拒按，噯腐吞酸，或嘔吐不消化食物，嘔吐物腐臭，吐後痛減，不思飲食，大便不爽，矢氣與便後稍舒。診其舌苔厚膩，脈滑，治療以下列何方最適宜？
(A)藿香正氣散　(B)保和丸　(C)半夏瀉心湯　(D)香砂平胃散

20 20 歲女性患者前一晚因喝冰綠茶，後半夜突然脘痛醒，喝礦泉水後痛勢不減，用熱敷包則減輕，口不乾，苔薄白質淡紅，脈弦緊，以下列何方治療最適宜？
(A)保和丸　(B)柴胡疏肝散　(C)良附丸　(D)六君子湯

21 關於痹證之敘述，下列何者錯誤？①行痹乃風邪偏勝，防風湯為主方　②痛痹痛有定處，乃寒邪偏勝，以烏頭湯為主方　③著痹肌膚麻木，關節重者，宣痹湯主之　④久痹痰瘀阻絡，獨活寄生湯主之
(A)③④　(B)①②④　(C)①③④　(D)①②③④

22 下列有關鼓脹、水腫與積證之敘述，何者錯誤？
(A)《醫學心悟》：目窠與足先腫，後腹大者，水也；先腹大，後四肢腫者，脹也
(B)鼓脹以腹脹大為主，積證以腹中結塊為主
(C)水腫與鼓脹的病機係肺、脾、腎三臟相干，水液不能正常通調輸布，以致水溢肌膚
(D)積證可為鼓脹之病因

23 患者脘腹脹滿，疼痛拒按，噯腐吞酸，厭食，大便粘臭，瀉後痛減，苔膩，脈滑實。下列處方何者最適宜？
(A)枳實導滯丸　(B)柴胡疏肝散　(C)半夏瀉心湯　(D)大承氣湯

24 56 歲男性患者，血液檢查 ALT：52 IU/L，albumin： 2.8 g/dL，globulin： 3.6 g/dL，血液 WBC：3010/μL，platelet：72000/μL，今日來診，主訴兩脇肋部脹悶，胃納減少，小便量少，下肢水腫，大便軟。脈診：弦細脈，舌診：舌質淡紅，苔薄白，此階段治療以下列何方最適宜？
(A)小柴胡湯　(B)四逆散　(C)實脾飲　(D)濟生腎氣丸

25 嘈雜而見噁心吞酸，口渴喜飲，口臭心煩，脘悶痰多，多食易飢，或似飢非飢，舌質紅，苔黃乾，脈滑數，治療宜選用何方？
(A)平胃散　(B)溫膽湯　(C)柴胡疏肝散　(D)香砂六君子湯

26 60 歲男性患者，罹患類風濕性關節炎（Rheumatoid arthritis）多年，常晨起時關節僵硬，活動不利，手足多處關節疼痛，痛處常對稱發生，甚至出現手部尺側偏移的變形，其病證最接近於中醫何者之範疇？
(A)尪痹　(B)脈痹　(C)肌痹　(D)筋痹

27 下列有關脅痛的敘述，何者錯誤？
(A)病位在肝膽，與脾、胃、腎關係密切　(B)初病多實證，久病多虛證
(C)瘀血停著者多以脹痛表現　(D)外感脅痛多治以利濕清熱

28 50 歲女性，主訴腰痛多日，症見腰部冷痛重著，轉側不利，遇陰雨天則加重，苔白膩，脈沉緩，診斷以下列何證最適宜？
(A)脾濕腰痛　(B)寒濕腰痛　(C)腎虛腰痛　(D)血瘀腰痛

29 尿毒症患者，中焦虛寒，血便者，宜黃土湯主之。今多以下列何藥代替灶心黃土？
(A)赤石脂　(B)花蕊石　(C)桑螵蛸　(D)金櫻子

30 癃閉是指小便量少，點滴而出，甚則小便不通為主症的一種疾患。下列相關敘述何者錯誤？
(A)小便不利，點滴而短少，病勢較緩者稱為「癃」；小便閉塞，點滴不通，病勢較急者稱為「閉」
(B)「癃閉」之名首見於《內經》，於《素問．靈蘭秘典論》說：「膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。」
(C)王燾《外台秘要》記載：「……為胞屈僻，津液不通，以蔥葉除尖頭，內陰莖孔中深三寸，微用口吹之。胞脹，津液大通，便癒。」這是最早用導尿術治療小便不通
(D)正常人小便的通暢有賴於三焦氣化的正常，而三焦的氣化主要又依靠肺脾腎三臟來維持

31 30 歲男性早泄，伴有脅痛少腹脹痛，胸悶太息，口中乾苦，少寐多夢，舌紅苔薄白，脈弦，則此病人的診斷證型為何？
(A)肝氣鬱結　(B)肝陽上亢　(C)肝風內動　(D)肝腎陰虛

32 承上題，宜以何方治療？
(A)柴胡疏肝散　(B)天麻鉤藤飲　(C)鎮肝息風湯　(D)左歸丸

33 28 歲年輕男子，主訴小腹澀痛，滿急時疼痛加劇，且小便顏色為紅色，偶夾有血塊，舌尖紅，脈數。治以下列何方最適宜？
(A)龍骨遠志丸　(B)坎離既濟湯　(C)五苓散　(D)小薊飲子

34 下列有關哮證之辨證論治，何者正確？
(A)寒哮苔白滑或白膩，脈弦緊或浮緊，以射干麻黃湯或小青龍湯為主方
(B)熱哮多有痰熱壅肺，痰黃粘，以清燥救肺湯為主方
(C)痰哮多喘而氣粗息湧，喉中痰鳴如吼，痰黃濁稠厚，以三子養親湯加味為主方
(D)虛哮屬氣虛痰熱者，以定喘湯為主方

35 瘿病頸前腫塊柔軟，心悸不寧，心煩少寐，目乾澀，手顫抖，消瘦乏力，脈弦細數，屬下列何種辨證分型？
(A)肝火亢盛　(B)肝氣鬱結　(C)痰氣交阻　(D)心肝陰虛

36 承上題，以下列何方治療最適宜？
(A)梔子清肝湯或龍膽瀉肝湯　(B)加味逍遙散或柴胡疏肝湯
(C)天王補心丹或一貫煎　(D)小柴胡湯或溫膽湯

37 35 歲男性患者，糖尿病多年，近日煩渴多飲，乾咳無痰，氣短無力，神倦，自汗，舌乾少苔，脈虛大而數，用下列何方最合適？
(A)百合固金湯　(B)麥門冬湯　(C)白虎加人參湯　(D)清燥救肺湯

38 瘿病患者，頸前腫塊，按之堅硬，表面不均勻，則下列那些處置是正確的？①如果患者腫塊堅硬不可移動，需考慮石瘿的可能　②作超音波及細針穿刺檢查　③考慮使用海藻玉壺湯治療　④不宜考慮外科手術治療
(A)①②　(B)②③　(C)①②③　(D)①②③④

39 《內經》中關於消渴的論述，下列何者錯誤？
(A)關於消渴的名稱，有「消癉」、「消中」等不同的稱呼
(B)認為飲食不節，肥甘厚味是致消渴的病因
(C)《素問．氣厥論》：「心移熱於肺，則為肺消」
(D)二陽結謂之消

40 下列有關「噎膈」的敘述，何者錯誤？
(A)噎指飲食不下或食入即吐
(B)噎雖可單獨出現，亦可爲膈之前驅，故往往以噎膈並稱
(C)本證首見於《內經》，認爲與津液及情志有關
(D)若飲食能順利嚥下入胃，但食入不化，停留胃中，朝食暮吐，暮食朝吐，則稱爲「反胃」

41 38 歲女性患者，自訴近來常覺口苦心煩，頭重目眩，胸悶，胃口變差，餐後常噯氣，服胃藥只能稍稍緩解，不易入睡，已開始服用助眠劑。診其脈滑略數、舌淡偏紅、苔黃厚而膩。依上述證候其治則何者最適當？
(A)化痰清熱，養心安神 (B)化痰清熱，和中安神 (C)疏肝瀉熱，養心安神 (D)疏肝瀉熱，和中安神

42 41 歲開工廠的阿成因受到金融海嘯的壓力，最近常感頭暈痛，心煩易怒，失眠，面紅目赤，口苦，於 10 多年前就偶有顳側抽痛，近 2 個月來更加嚴重，上下樓梯頭痛更厲害，常常頭痛到無法工作。診其脈弦細數，舌紅苔黃，則下列何方最適宜？
(A)天麻鉤藤飲 (B)川芎茶調散 (C)通竅活血湯 (D)柴胡疏肝湯

43 45 歲男性患者因不眠多夢就診，其平常急躁易怒，口乾而苦，小便黃。診其舌紅苔黃，脈弦數，則下列何方最適宜？
(A)溫膽湯加黃連、山梔、珍珠母 (B)龍膽瀉肝湯加生龍骨、生牡蠣、茯神
(C)黃連阿膠湯 (D)酸棗仁湯加五味子、合歡皮、夜交藤、黃連

44 64 歲男性患者，因肺腺癌進行標靶治療，出現面部皮膚紅色丘疹並夾膿皰，治以下列何藥最適宜？
(A)皂刺、白芷、天花粉 (B)川芎、桃仁、紅花
(C)丹皮、連翹、赤芍 (D)生地、麥冬、地骨皮

45 48 歲男性患者，初開始時因在項部、腋下及鼠谿部觸摸到腫塊結節，也有癢及發熱感，稍有咳嗽，自汗出，且漸漸變瘦。然而近來治療後身體開始浮腫，尤其是下肢腫成象腿一般，請問出現下列症狀時，何者病勢相對較輕？
(A)足心平滿，紋理消失，腰酸無力，頭上汗出
(B)腹部腫起脹感，呼吸自覺受限，不喘不咳
(C)陰囊腫爛滲液，面色暗如有一層灰煙，反覆低熱
(D)臍腹腫滿凸起，不欲飲食，體重增加

46 下列有關癌症之敘述，何者錯誤？
(A)殷墟甲骨文就記有「瘤」的病名，該字具有留聚不去的意思
(B)《黃帝內經》已對發生在人體不同部位的腫瘤作了分類，並認病因是由於「邪氣居其間」所致
(C)「癌」這個字，首次見於宋代東軒居士的外科專著《衛濟寶書》
(D)《三因方論》將瘤分爲骨瘤、脂瘤、肉瘤、氣瘤、血瘤、膿瘤六種，並以決潰爲大法

47 當歸龍薈丸具抗慢性粒細胞白血病的作用，最可能是下列那一個藥物的功能？
(A)當歸 (B)蘆薈 (C)青黛 (D)龍膽草

48 55 歲女性患者，腰痛時發疼痛，痛則無法轉側，腰部自覺較冷與沉重感，每遇天氣陰雨則痛加重。診其苔白膩，脈沉而遲緩，治療宜選用下列何方最適宜？
(A)四妙丸 (B)左歸丸 (C)身痛逐瘀湯 (D)腎著湯

49 22 歲林小姐於 97 年 6 月 3 日來診，其最近三次月經來潮日期依序爲：3 月 22 日、4 月 20 日、5 月 18 日。請問林小姐的月經週期符合下列何者的定義？
(A)月經先期 (B)月經後期 (C)月經先後不定期 (D)月經週期正常

50 根據《金匱要略》，婦人經水不利下，下列何方主之？
(A)膠艾湯 (B)溫經湯 (C)四逆散 (D)抵當湯

51 朱丹溪主張經行過後，腹中綿綿作痛者的病機，下列何者正確？
(A)血氣實 (B)虛中有熱 (C)鬱滯有瘀 (D)血行而氣滯未盡行

52 承上題，下列何者治療最適宜？
(A)四物湯加木香 (B)四物湯加丹皮、黃連
(C)八珍湯加丹皮、梔子 (D)八珍湯加桃仁、香附、黃連

53 49 歲婦女月經過期紊亂、經量少、色紫黯、頭暈、耳鳴、眠差、潮熱盜汗、易怒煩躁、舌紅、脈細數，治療處方下列何者最適當？
(A)知柏八味丸 (B)加味逍遙散 (C)天王補心丹 (D)血府逐瘀湯

54 導致血瘀崩漏的原因為何？
(A)內傷氣滯，或因外受創傷等因 (B)腎氣不足，致中氣虛不能統攝血液
(C)過食溫熱，辛辣等食物和助陽的藥品 (D)怒氣傷肝，肝經火熾，熱鬱於內

55 某女性患者，主訴結婚已八年未孕，近期月經數月不行，證見四肢不溫，小腹冷痛，白帶量多，苔白，脈沉緊，醫者診其為寒凝血瘀。下列何方劑治療最適宜？
(A)《傅青主女科》溫土毓麟湯 (B)《萬病回春》溫清飲
(C)《金匱要略》溫經湯 (D)《景岳全書》歸腎丸

56 某女士剛生完產不久，不慎感受風寒，造成陰戶腫痛，甚至痛到碰到衣服被子也痛，陰部看起來沒有焮紅的表現。她同時覺得身體虛弱，怕冷周身骨節酸痛。望其舌苔白膩，診其脈細。就中醫辨證，以下列何方治之最適宜？
(A)《脾胃論》補中益氣湯 (B)《醫宗金鑑》龍膽瀉肝湯
(C)《傅青主女科》祛風定痛湯 (D)《醫宗己任篇》滋水清肝飲

57 王孟英於《溫熱經緯》曰：溫邪熱入血室有三證，如經水適斷，而邪乃乘血舍之空虛以襲之者，宜用下列何法治之？
(A)養營以清熱 (B)清熱以安營 (C)破其血結 (D)通其氣滯

58 下列有關中醫學專有名詞之敘述，正確的有幾項？①妊娠期陰道少量出血，時下時止而無腰痠、腹痛、小腹脹墜等現象者，可稱為「胞漏」 ②妊娠期腰痠、下腹墜脹而無陰道出血者，可稱為「胎動不安」 ③妊娠期腰痠、下腹墜脹且有陰道少量出血者，可稱為「胎動不安」 ④懷孕三個月以後流產者，可稱為「小產」
(A)一 (B)二 (C)三 (D)四

59 患者懷孕六個月，常覺心中煩悶，坐臥不寧。問診發現患者手足心覺熱，口乾咽燥，但喝水不會很多，有時也會乾咳無痰。望其舌紅，苔薄黃而乾，脈細數而滑。下列何種組成治療此一病患最適宜？
(A)桑葉、沙參、貝母、淡豆豉、梔子、杏仁、梨皮
(B)人參、麥冬、茯苓、黃芩、生地、知母、甘草、蓮子心、竹茹
(C)竹瀝、麥冬、黃芩、茯苓、浙貝母
(D)炒梔子、淡豆豉

60 產後痙病，若證屬血虛者，下列何方加味治療最適宜？
(A)三甲復脈湯 (B)華佗癒風散 (C)白朮散 (D)天麻鉤藤飲

61 造成「子煩」的病機，下列何項最不常見？
(A)陰血不足 (B)心火偏旺 (C)痰飲停聚 (D)腎氣虛弱

62 《醫宗金鑑．婦科心法要訣》關於產後汗出之敘述，下列何者正確？①若微微自汗，是營衛不和，宜調和營衛收斂止汗 ②若周身無汗，獨頭汗出者，乃陰虛陽氣上越之象 ③若頭身俱大汗不止，則恐有亡陽之慮
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③

63 下列那一個方劑的組成藥物是山藥、芡實、黃柏、車前子、白果？
(A)清白散 (B)易黃湯 (C)舉元煎 (D)完帶湯

64 保產無憂方是《達生篇》方，組方用以升舉胎元的藥物為何？
(A)黨參、升麻、白朮 (B)當歸、白芍、菟絲子
(C)黃耆、荊芥穗、羌活 (D)人參、蘄艾、枳殼

65 一位出生未滿一天的新生兒，產程順利，餵食、活力皆正常，血液例行檢查時發現：紅血球 5.9×10^6 個/mm^3、血色素 19 g/dL；白血球 17000 個/mm^3、中性球 57%、淋巴球 20%、嗜酸球 2%、單核球 10%；血小板 15 萬個/mm^3。下列敘述何者正確？
(A)該嬰兒可能有急性細菌性感染，應該立即作血液細菌培養
(B)該嬰兒應該立即施打廣效性抗生素
(C)該嬰兒應該送往新生兒加護病房，密切觀察與治療
(D)宜留在嬰兒室，照常餵養，但仍應注意觀察一般狀況

66 依《醫宗金鑑》，小兒感冒門傷風證的敘述，下列何者正確？①臨床表現是身體發熱憎寒，頭疼有汗，嚏涕鼻塞聲重，不時咳嗽 ②用金沸草散開通氣逆 ③解外邪用杏蘇散
(A)①② (B)②③ (C)①③ (D)①②③

67 依《幼科雜病心法．初生門》，小兒「胎黃」的治療下列何者正確？①治法當滲濕清熱　②色微黃者用鵝黃散　③色深黃者用犀角散
(A)①②　(B)②③　(C)①③　(D)①②③

68 依《醫宗金鑑》，下列有關風寒喘急之敘述，下列何者正確？①因肺主皮毛，一受風寒，內閉肺氣，則氣逆不降，呼吸氣急，故作喘　②發熱無汗，宜以華蓋散，汗而散之　③若肺氣本虛，外復被風寒所傷者，宜以紫蘇飲子，補而散之　④若肺虛外無風寒所傷，內無痰涎壅塞，惟氣逆喘急者，以加減蘇子降氣湯降其逆氣，其喘自癒
(A)①②③　(B)①③④　(C)②③④　(D)①②③④

69 依《幼科雜病心法．吐證門》，「神倦囟動睡露睛，自利不渴頻嘔吐」為虛吐，則下列處方何者最適宜？
(A)丁沉四君子湯　(B)香砂六君子湯　(C)附子湯　(D)附子理中湯

70 4 歲孩童，有厭食和異嗜症史，症見形體消瘦，面色萎黃，毛髮稍稀，身倦，易發脾氣，大便溏，舌苔薄黃。下列相關敘述，何者正確？①此屬疳氣　②可選用資生健脾丸　③治法應以和脾健運為主　④本病亦稱疳極
(A)①②④　(B)①③④　(C)②③④　(D)①②③

71 有關驚風之徵候，下列何者正確？①竄　②搐　③張　④視
(A)①②③　(B)②③④　(C)①②④　(D)①②③④

72 3 歲男童，因發燒腹痛 1 天至中醫兒科求診，證見咽紅，畏寒，四肢冰冷，噁心嘔吐，腹痛合併下利，舌質紅苔白，脈數。依《幼科雜病心法．腹痛門》，以下列何方最適宜？
(A)加減理中湯　(B)香砂平胃散　(C)藿香和中湯　(D)芍藥甘草湯

73 依《幼科雜病心法．水腫門》，濕水腫「腫在下者因濕起，急宜利水可安然」，治以下列何方最適宜？
(A)越婢加朮湯　(B)外用貼臍法，內服沉香琥珀丸
(C)重用疏鑿飲，輕用茯苓導水湯　(D)大聖濬川散

74 6 歲男童，睡中經常遺尿，多則一夜數次，醒後方覺，神疲乏力，面色蒼白，肢涼怕冷，下肢無力，腰腿痠軟，小便清長，舌質淡。醫者治以《醫宗必讀》菟絲子散，下列何者非其組成？
(A)益智仁　(B)牡蠣　(C)雞內金　(D)肉蓯蓉

75 暑溫出現突然發熱，頭痛，項部強急，微惡風，全身灼熱無汗，口渴，常伴有惡心、嘔吐、嗜睡，以及煩躁不安，舌苔薄白或黃、質偏紅、脈多浮數或滑數。用下列何方治療最適宜？
(A)銀花、鮮扁豆花、厚朴、連翹、香薷
(B)蘇葉、白芷、桔梗、白朮、厚朴、藿香、半夏麯、大腹皮、茯苓、陳皮、甘草
(C)半夏、茯苓、杏仁、薏苡仁、白蔻仁、藿香、豬苓、淡豆豉、澤瀉、厚朴
(D)西洋參、麥冬、知母、甘草、竹葉、黃連、石斛、荷梗、鮮西瓜翠衣、粳米

76 依《醫宗金鑑》，描述欲吐不吐，欲瀉不瀉，腹中絞痛，煩渴，大飲，應用下列何處方治療？
(A)理中湯　(B)白虎加參湯　(C)桂苓甘露飲　(D)清暑益氣湯

77 有關紫癜的敘述，下列何者正確？①皮膚、黏膜可見瘀點、瘀斑，壓之褪色　②葡萄疫、肌衄、斑毒等病證，與本病有相似之處　③紫癜可分血熱、氣虛兩類　④發於遍身，以腹部居多
(A)①②③　(B)①③④　(C)②③④　(D)②③

78 依《醫宗金鑑．痘疹心法》，疹毒熱甚上攻喉，腫痛難堪實可憂，裏熱喉痛，治以下列何方？
(A)清咽利膈湯　(B)桔梗湯　(C)玄參升麻湯　(D)涼膈消毒飲

79 依《醫宗金鑑．痘疹心法》，麻疹見形證治，熱閉以三黃石膏湯治療，下列何者為三黃石膏湯組成之一？①黃連　②大黃　③青黛　④麻黃
(A)①②　(B)①③　(C)②③　(D)①④

80 下列有關嬰兒腹部絞痛（Infantile colic）的敘述何者正確？①此症通常發生於 3 週大之新生兒，但 3 個月內之任何時間均可出現　②其特徵為反覆發作性的腹痛及哭鬧　③如症狀輕微，且多發於白天，稱之陣發性騷亂（paroxysmal fussing）　④本症預後甚佳，大多在 9-12 週大即自行消失
(A)①②③　(B)①③④　(C)①②④　(D)①②③④