110年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、社會工作師考試、110年專門職業及技術人員高等考試心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：中醫師（一）
科　　目：中醫基礎醫學（二）（包括中醫方劑學、中醫藥物學）
考試時間：1小時30分　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 下列那個藥物在所屬方劑中為反佐藥？
(A)《太平惠民和劑局方》參蘇飲中的人參　(B)《醫方集解》龍膽瀉肝湯中的生地黃
(C)《丹溪心法》虎潛丸中的黃柏　(D)《丹溪心法》左金丸中的吳茱萸

2 關於清代程鍾齡提出之治病八法，下列敘述何者錯誤？
(A)所謂八法即：汗法、吐法、下法、利法、溫法、清法、消法、補法
(B)麻疹初起，疹點隱而不透可以汗法治療
(C)下法是通過蕩滌腸胃，瀉出腸中積滯，使宿食、冷積、瘀血、結痰、停水等從下竅而出
(D)清法治療溫病後期應避免純用苦寒直折之法治療

3 45歲男性患者，平素痰多。昨日受寒後今晨起出現發燒，體溫為攝氏37.8度，並伴有鼻塞聲重、咳嗽痰多、微惡寒、無汗諸症，未見煩躁及口渴，二便調，納可。兩寸浮微緊略數，舌淡紅苔薄白，下列那個湯劑處方最適宜？
(A)桂枝三錢，芍藥三錢，炙甘草兩錢，生薑三錢，大棗六枚
(B)麻黃三錢，杏仁三錢，炙甘草兩錢，桂枝三錢，白朮四錢
(C)麻黃二錢，杏仁二錢，桑白皮二錢，紫蘇子二錢，赤茯苓二錢，陳皮二錢，炙甘草一錢
(D)蘇葉二錢，半夏二錢，茯苓二錢，前胡二錢，桔梗二錢，枳殼二錢，炙甘草一錢，生薑一錢，杏仁二錢，大棗二枚

4 一位72歲男性，三週前因肺部感染住院治療，經兩週治療後，現已無發燒。但出現大便乾結難解，腹脹滿，口乾咽燥，舌紅苔黃，脈細數有力，下列處方何者最適宜？
(A)麻子仁五錢，白芍二錢半，枳實二錢半，大黃五錢，厚朴二錢半，杏仁二錢半
(B)生地黃五錢，生甘草二錢，人參一錢五分，生大黃三錢，芒硝一錢，玄參五錢，麥門冬五錢，當歸一錢五分，海參二條，薑汁六匙
(C)玄參一兩，麥門冬八錢，生地黃八錢，大黃三錢，芒硝一錢五分
(D)大黃三錢，芒硝三錢，枳實三錢，厚朴三錢，甘草一錢，人參二錢，當歸三錢，生薑二錢，大棗二枚，桔梗一錢

5 有關《景岳全書》濟川煎之功用，下列何者最適宜？
(A)清營透熱，養陰活血　(B)清心養陰，利水通淋
(C)益氣健脾，養血安胎　(D)溫腎益精，潤腸通便

6 38歲男性患者，咳嗽伴有胸脇痛，呼吸困難，頭痛，大便每日一解偏乾，苔滑，脈沉弦，X光檢查發現左側胸腔積水。宜治以下列何者所組成的方藥？
(A)大黃、芒硝、甘遂
(B)甘遂、大戟、芫花、紅棗
(C)大黃、芒硝、甘草
(D)黑丑、甘遂、芫花、大戟、大黃、青皮、陳皮、檳榔

7 關於《太平惠民和劑局方》四物湯之敘述，下列何者最適宜？
(A)加人參、黃耆主治妊娠胎漏
(B)可治月經不調、臍腹疼痛之症
(C)加阿膠、艾葉為完整《金匱要略》芎歸膠艾湯
(D)《金匱要略》溫經湯之組成包含完整四物湯

8 關於《內外傷辨惑論》當歸補血湯之敘述，下列何者正確？①當歸與黃耆用量之比率為當歸5：黃耆1 ②由勞倦內傷，氣血不足，浮陽外越所致 ③證見肌熱面赤，口乾不欲飲水 ④可治產後血虛發熱頭痛 ⑤脈洪大而虛
(A)①②③ (B)①④⑤ (C)②③④ (D)②④⑤

9 下列各方劑之敘述，正確的有幾項？①《小兒藥證直訣》六味地黃丸主治肝腎陰虧，虛火上炎之證 ②《醫級》八仙長壽丸主治肺腎陰虛，咳嗽喘逆之證 ③《傷寒論》炙甘草湯可主治肺痿咳嗽，痰少帶血之證 ④《慎齋遺書》百合固金湯方中之沙參助二地滋陰潤肺止咳
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

10 關於《金匱要略》腎氣丸之敘述，下列何者最不適宜？
(A)桂枝、附子用量重，其意在於溫腎補火 (B)加鹿茸、五味子為《濟生》十補丸
(C)主治腎陽不足，腰痛腳軟外，尚可治痰飲 (D)若晚上頻尿者，可加五味子

11 《景岳全書》之方劑組成，下列何者最適宜？
(A)右歸丸：熟地、山藥、山茱萸、枸杞、菟絲子、鹿角膠、龜板膠、杜仲、肉桂、附子
(B)左歸丸：熟地、山藥、山茱萸、枸杞、菟絲子、鹿角膠、當歸、牛膝
(C)右歸飲：熟地、山藥、山茱萸、枸杞、杜仲、炙甘草、肉桂、附子
(D)左歸飲：熟地、山藥、山茱萸、枸杞、牛膝、茯苓、炙甘草

12 《溫病條辨》清營湯之組成中，下列那一組藥皆入心，為方中使藥？
(A)竹葉、梔子、羚羊角 (B)天麻、丹參、鉤藤
(C)犀角、連翹、黃連 (D)丹參、黃連、竹葉

13 下列何種情況最不宜使用解表法治療？
(A)腰以上水腫 (B)麻疹初起且有惡寒發熱
(C)頭身疼痛 (D)完穀不化

14 關於《傷寒論》理中丸的臨床應用時機，下列何者錯誤？
(A)主治中焦虛寒，自利，或嘔吐腹痛
(B)亦治小兒急驚，真寒假熱者
(C)飲食不節，或暴受風寒所致之吐利，亦可以本方治療
(D)亦治胸痹證，由中焦虛寒所致者

15 在下列那一個清熱方劑的組成藥物中沒有生地？
(A)《蘭室秘藏》當歸六黃湯 (B)《景岳全書》玉女煎
(C)《小兒藥證直訣》導赤散 (D)《溫病條辨》青蒿鱉甲湯

16 關於肺虛久咳，病人的治療用藥選擇，下列那一組藥物最少被考慮？
(A)人參、蛤蚧 (B)阿膠、五味子 (C)赤石脂、乾薑 (D)款冬、貝母

17 《外臺秘要引崔氏方》黃連解毒湯主治熱毒充斥三焦之證，有關其組方加減與臨床應用原則，下列何者最不適宜？
(A)瀉火必先瀉心，故本方以黃連直解心經火毒為主藥
(B)熱毒壅盛，若上擾神明，則證見煩躁，錯語，失眠
(C)熱毒壅於肌肉，則可見癰疽、疔毒
(D)本方去黃柏、梔子，再加半夏、炙甘草、大棗、生薑，即是《傷寒論》半夏瀉心湯

18 63歲吳先生，多年咳嗽不癒，經西醫檢查疑似感染肺結核。經以西藥控制，症狀穩定；但患者自訴容易疲倦，體力明顯減退，肌肉消瘦，來診時面頰兩顴泛紅，食慾不振，午後身體容易發熱，夜眠盜汗，舌苔少舌質光紅，脈來細數無力。經使用《衛生寶鑑》秦艽鱉甲散治療，諸證改善。下列敘述何者錯誤？
(A)本方用治風勞證
(B)本方功效為滋陰養血，清熱除蒸
(C)方中以鱉甲：滋陰潛陽，退熱除蒸；配當歸和血；知母滋陰降火；烏梅：生津清熱，斂陰止汗
(D)方中以秦艽：祛風透邪，清退虛熱；配青蒿：清熱除蒸，透邪外出；桑白皮：清肺涼血，退蒸熱；柴胡以透邪解熱

19 50歲丁女士，主訴兩側胸脇悶痛已二個月，望之面黃少華，體格中等，問之近半年來月經來的頻率漸漸稀少，現約三個月一行，三餐尚規則，但食慾稍減退，尤其是工作壓力大時易感頭痛，伴隨右乳房脹不舒，排便順暢日一行。睡眠偶多夢，舌苔薄白潤舌質稍紅，脈沉細，兩關帶弦，若以中醫辨證論治原則，下列處方何者最適宜？
(A)柴胡，枳實，赤芍，炙甘草
(B)炒白朮，廣陳皮，炒白芍，防風
(C)柴胡，炒白芍，當歸，炒白朮，炙甘草，薄荷，煨薑，茯苓
(D)人參，炒白朮，茯苓，炙甘草，柴胡，炒白芍

20 64歲女性病患，1月10日來院門診，前至合歡山賞雪，回來後覺胸悶不舒，至西醫檢查無異狀，處方以肌肉鬆弛劑及鎮痛消炎藥，效不佳，故尋求中醫治療來院求診。證見胸悶痛，嚴重時會連至背痛，苔白膩，舌淡紅，脈沉弦。下列何方劑治療最適宜？
(A)《景岳全書》柴胡疏肝散
(B)《素問病機氣宜保命集》金鈴子散
(C)《金匱要略》瓜蔞薤白白酒湯
(D)《醫學發明》天臺烏藥散

21 關於《太平惠民和劑局方》蘇子降氣湯之敘述，下列何者最不適宜？
(A)組成含有當歸、炙甘草
(B)其病機為腎陽不足致不能納氣，氣機上逆，寒痰上泛
(C)以半夏、蘇子為主藥（君藥），降逆祛痰止咳
(D)以肉桂溫補下元

22 下列何者為《丹溪心法》咳血方中的組成？
(A)瓜蔞仁、訶子　(B)瓜蔞根、訶子　(C)瓜蔞仁、黃連　(D)瓜蔞根、黃連

23 《傷寒論》桃核承氣湯，下列敘述何者最不適宜？
(A)可治少腹急結，小便自利，脈沉實之證
(B)可治下焦蓄血，譫語煩躁
(C)方中桃仁、紅花破血祛瘀
(D)若治少腹急結，至夜發熱，小便自利，脈沉澀，乃因血行不暢、瘀熱互結

24 《金匱要略》半夏厚朴湯、《症因脈治》丁香柿蒂散、《傷寒論》旋覆代赭石湯之比較，下列何者最不適宜？
(A)三方皆有胃氣虛之證
(B)丁香柿蒂散以人參益氣補虛；旋覆代赭石湯則以人參、大棗、甘草益氣扶正，和中補虛
(C)三方中皆有生薑
(D)半夏厚朴湯與旋覆代赭石湯二方皆有半夏

25 下列何藥不包含在《十藥神書》十灰散的組成中？
(A)蒲黃　(B)梔子　(C)大黃　(D)荷葉

26 《醫學發明》天台烏藥散與《景岳全書》暖肝煎的藥物組成，相同的藥物有幾個？
(A)1　(B)2　(C)3　(D)4

27 關於《醫門法律》清燥救肺湯與《金匱要略》麥門冬湯比較，下列敘述何者錯誤？
(A)兩方組成中均有麥門冬、人參、甘草
(B)清燥救肺湯之功用為清燥潤肺；麥門冬湯則為滋養肺胃，降逆和中
(C)清燥救肺湯中的桑葉有清宣肺燥之用；麥門冬湯中的半夏有降逆化痰的作用
(D)清燥救肺湯主要用於治療虛熱肺萎；麥門冬湯則主要用於治療虛勞乾咳

28 小陳是25歲的男性。盛暑之際，喜飲貪涼，而出現了如下症狀：頭痛，輕微發熱惡寒，脘腹脹滿，嘔吐泄瀉。候其脈見浮細而軟，望舌則見舌淡紅苔白微膩。下列處方何者最適宜？
(A)《溫熱經緯》清暑益氣湯　(B)《太平惠民和劑局方》藿香正氣散
(C)《溫病條辨》三仁湯　(D)《內外傷辨惑論》羌活勝濕湯

29 《和劑局方》八正散與《溫熱經緯》甘露消毒丹的組成中皆有下列何藥？
(A)甘草　(B)梔子　(C)滑石　(D)車前子

30 有關《溫病條辨》杏蘇散的敘述，下列共幾項正確？①主治外感溫燥證　②本方乃《和劑局方》參蘇飲去人參、葛根、木香加杏仁而成　③方中桔梗、枳殼，一升一降，助杏仁宣利肺氣　④方中含《和劑局方》二陳湯以燥濕化痰止咳　⑤忌生冷、油膩、辛辣、烤炸食物
(A)5　(B)4　(C)3　(D)2

31 下列滋陰潤燥方劑之組成皆含有「玄參、麥門冬、生地黃」，何者除外？
(A)《重樓玉鑰》養陰清肺湯　(B)《慎齋遺書》百合固金湯
(C)《金匱要略》麥門冬湯　(D)《溫病條辨》增液湯

32 臨診時以眩暈、頭痛、失眠、舌紅苔黃、脈弦數為方證，下列何者為其主藥？
(A)天麻、鉤藤　(B)夜交藤、茯神　(C)黃芩、梔子　(D)石決明、牛膝

33 方劑的藥物組成中含有川芎、防風和羌活者，下列共幾項正確？①《傷寒六書》再造散　②《和劑局方》川芎茶調散　③《備急千金要方》獨活寄生湯　④《此事難知引張元素方》九味羌活湯
(A)1　(B)2　(C)3　(D)4

34 66歲患者，求診主訴為咳嗽氣逆，胸悶，食欲不佳，痰多，胃納不佳，舌苔厚白膩，脈滑有力，治以下列何組成最適宜？
(A)瓜蔞、貝母、桔梗、黃芩、梔子、陳皮、桑白皮、麥冬、知母、茯苓、甘草
(B)桔梗、甘草、梔子、黃芩、連翹、薄荷
(C)白芥子、蘇子、萊菔子
(D)貝母、玄參、牡蠣

35 關於《醫學心悟》止嗽散，下列敘述何者錯誤？
(A)辨證為風邪犯肺，導因於外感風邪犯肺，肺失清肅，雖經發汗解表，但仍見咽癢咳嗽
(B)組成為：紫菀、百部、桔梗、陳皮、荊芥、白前、甘草、生薑
(C)陰虛勞嗽和肺熱咳嗽仍可使用
(D)無表邪，僅存內傷咳嗽者，可去荊芥

36 關於《溫病條辨》新加香薷飲，下列敘述何者錯誤？
(A)組成為香薷、銀花、鮮扁豆花、厚朴、連翹
(B)功用為祛暑解表，清熱化濕，滋陰益氣
(C)身熱盛，可考慮加石膏以清熱
(D)以惡寒無汗，口渴，面赤，舌苔白膩為運用主證

37 《醫宗金鑒・外科心法要訣》五味消毒飲之組成，下列何者最不適宜？
(A)金銀花　(B)野菊花　(C)紫草　(D)紫背天葵

38 臨診時以咳嗽痰多，色白易咯，脘悶納差，噁心嘔吐，舌苔白滑或膩為主證，其組方時以下列何者為主（君）藥？
(A)茯苓　(B)製半夏　(C)苡仁　(D)竹茹

39 《醫方考》清氣化痰丸是以下列何種原料泛成丸劑的？
(A)水　(B)醋　(C)蜂蜜　(D)薑汁

40 有關《醫方考》指迷茯苓丸之敘述，下列何者最適宜？
(A)其組成有茯苓、半夏、枳殼、風化硝
(B)主治風邪上攻、氣血兩虛、阻滯兩臂經絡
(C)此方乃以茯苓為主藥；枳殼寬胸行氣為輔藥
(D)棗肉糊為丸，鹽湯下

41 關於細辛主治應用，下列敘述何者最不適宜？
(A)《本經》列為上品，研末服，毒性較小，用量無顧慮
(B)肺寒咳喘，痰多清稀
(C)口舌生瘡，胃火牙痛，與他藥同用
(D)頭痛，風濕痹痛，鼻淵常流清涕

42 下列何者非《臺灣中藥典》收載之毒劇中藥？
(A)生附子　(B)生巴豆　(C)生白附子　(D)薑半夏

43 能祛風勝濕兼有止痛解痙的作用，下列何藥物最適宜？
(A)紫蘇、荊芥 (B)香薷、生薑 (C)白芷、藁本 (D)蒼耳子、辛夷

44 能發散風寒濕邪而解表，適用於腰腿疼痛，兩足痿痹，下列何藥物最適宜？
(A)秦艽 (B)獨活 (C)威靈仙 (D)防風

45 有關秦艽主治，下列敘述何者最適宜？
(A)口噤牙痛，濕勝風淫 (B)久痛虛羸，下部虛寒
(C)濕熱黃疸，溲多便滑 (D)脾虛便溏，小便不禁

46 用於止嘔，下列何者最不適宜？
(A)草豆蔻 (B)砂仁 (C)吳茱萸 (D)茯苓

47 肺熱咳嗽痰多，小便短數、熱赤澀痛，下列何者最適宜？
(A)海金沙 (B)通草 (C)石韋 (D)葫蘆

48 下列祛風濕強筋骨藥物中，何者最適宜用於胎漏下血等證？
(A)桑寄生 (B)五加皮 (C)豨薟草 (D)千年健

49 用於「行氣止痛，引心包相火下行，亦能入肝舒筋，且能殺蟲」，下列何藥最適宜？
(A)細辛 (B)川楝子 (C)附子 (D)烏藥

50 枳實的功效，下列何者最適宜？
(A)溫中散寒，順氣止痛 (B)破氣消積，化痰除痞
(C)升提益氣，補脾益氣，消食化積 (D)舒肝理氣，溫補脾腎，和中化痰

51 主治心煩，懊憹不眠，紫癜白癩，皰疹瘡瘍，下列何藥物最適宜？
(A)梔子 (B)黃芩 (C)丹皮 (D)黃柏

52 玄參之禁忌，下列何者最適宜？
(A)溫、熱病，熱入營分者 (B)脾虛泄瀉者
(C)外感風熱引起之咽喉腫痛者 (D)陰虛火旺者

53 主治傷寒，煩熱，蓐勞骨蒸，燥渴虛煩，下列何者最適宜？
(A)牡丹皮 (B)白芍 (C)荊芥 (D)知母

54 具散熱解毒、補虛、療風、養血、止渴之功能、治癰疽疥癬、楊梅惡瘡、腸澼血痢、五種尸疰，下列何藥物最適宜？
(A)蒲公英 (B)紫花地丁 (C)白頭翁 (D)金銀花

55 有關瀉下藥之敘述，下列何者最不適宜？
(A)引起腹瀉或滑利大腸 (B)適用於裏虛證，使虛熱下泄
(C)作用峻者，於月經期應慎用或忌用 (D)此類藥易傷胃氣，奏效即止

56 具有涼血止血，清熱利尿，清肺胃熱的功效，下列何藥物最適宜？
(A)白茅根 (B)蘆根 (C)冬瓜皮 (D)側柏葉

57 用於治療脾不統血，衝脈不固之崩漏不止，常配伍益氣固澀之品以益氣健脾，固衝攝血，下列何藥物最適宜？
(A)棕櫚炭 (B)荊芥炭 (C)五靈脂 (D)三七

58 關於鬱金的描述，下列何者最適宜？
(A)活血止痛、行氣解鬱 (B)養血斂陰，柔肝止痛
(C)補血活血，調經止痛 (D)通陽散結、行氣導滯

59 具有破血行氣，消積止痛的功效，下列何藥物最適宜？
(A)青皮 (B)鬱金 (C)烏藥 (D)三稜

60 關於川芎的描述，下列何者最適宜？
(A)辛香行散，溫通血脈，乃氣中之血藥
(B)尤善「下行血海」，而「下調經水」，故為婦科活血調經之要藥
(C)具有通經，利尿的功效
(D)為良好的補血藥，能養血以安神，故適用於血虛引起的各種證候

61 有關五加皮應用，下列何者最不適宜？
(A)久病體虛，水腫腳氣 (B)肌膚瘀血，筋骨拘攣
(C)陰痿囊濕，女子陰癢 (D)肝腎不足，陰虛火旺

62 白朮的敘述，下列何者最適宜？
(A)陰虛內熱 (B)津液虧耗 (C)脾氣虛的胎動不安 (D)氣滯脹悶

63 具有滋陰潤肺、鎮咳祛痰、益胃生津、清心除煩之功效，下列何者最適宜？
(A)五味子 (B)黃精 (C)玉竹 (D)麥門冬

64 淫羊藿的敘述，下列何者最不適宜？
(A)溫肺定喘 (B)補腎壯陽 (C)強筋健骨 (D)祛風除濕

65 補骨脂的敘述，下列何者最適宜？
(A)口乾舌燥 (B)陰虛火旺 (C)腰膝冷痛 (D)大便秘結

66 菟絲子的敘述，下列何者最適宜？
(A)胎動不安 (B)陰虛火旺 (C)大便燥結 (D)小便短赤

67 具有潤肺止咳、清心安神之功效，下列何者最適宜？
(A)沙參 (B)天冬 (C)石斛 (D)百合

68 患者外傷骨折，抑鬱不眠，下列何藥最為適用？
(A)龍骨 (B)合歡皮 (C)遠志 (D)酸棗仁

69 桔梗的敘述，下列何者最不適宜？
(A)不適用於陰虛，久咳氣逆、咳血 (B)對於胃病患者，慎服
(C)陰虛火旺，咳血，可配薄荷 (D)內服過量，會引起噁心嘔吐

70 半夏為治濕痰的要藥，下列敘述何者最不適宜？
(A)生半夏多外用，消腫散結 (B)清半夏長於陰虛燥咳
(C)薑半夏偏於降逆止嘔 (D)法半夏善和胃燥濕

71 凡以平肝潛陽或息風止痙，治療肝陽上亢或肝風內動病症為主要作用的藥物，稱為平肝息風藥，下列敘述何者最適宜？
(A)平抑肝陽藥多為蟲類藥物
(B)息風止痙藥多為質重之介類或礦石類藥物
(C)此類藥中的動物甲殼、礦物藥質地堅硬，在煎藥時應打碎後下
(D)蟲類藥物有毒者，用量不宜過大，以免中毒

72 草荳蔻的功效，下列何者最不適宜？
(A)止嘔 (B)止痛 (C)止瀉 (D)止痙

73 古籍中鉤藤常與羚羊角相須為用，用於治療下列何者？
(A)痘疹後，餘毒未清 (B)肺經血熱，咯血、吐血
(C)肝膽濕熱所致的頭痛、目赤 (D)肝風內動、驚癇抽搐

74 下列驅蟲藥物中，何種藥材受熱容易破壞有效成分？
(A)苦楝皮 (B)雷丸 (C)檳榔 (D)鶴蝨

75 成熟果實的藥物，具止咳、開音、止渴藥效，下列何藥物最適宜？
(A)五倍子 (B)五味子 (C)烏梅 (D)訶子

76 檳榔主治痰癖癥瘕，瘴癘瘧痢，且包含下列何者？
(A)蟲疥惡瘡 (B)腰膝冷痛 (C)水腫腳氣 (D)脾虛便溏

77 有關藜蘆的敘述，下列何者最不適宜？
(A)研細末外用，可治疥癬禿瘡 (B)可以滅蝨、殺蚊蠅幼蟲
(C)善治寒痰 (D)治中風不語，可製丸以溫酒下

78 下列何種藥物的植物，其嫩枝葉可做成蜀漆？
(A)鹽膚木 (B)常山 (C)乾漆 (D)五倍子

79 下列何藥的來源是經由植物的枝幹或枝葉煎汁濃縮而成乾燥浸膏？
(A)血竭 (B)松香 (C)孩兒茶 (D)樟腦

80 下列藥物製霜的目的，何者與其他三者不同？
(A)巴豆 (B)瓜蔞仁 (C)鹿角 (D)大風子