# 102年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分試考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、特種考試聽力師、牙體技術人員考試、102年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：5103
頁次：7－1

等　　別：高等考試
類　　科：中醫師、中醫師㈡
科　　目：中醫臨床醫學㈡（包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學）
考試時間：1 小時 30 分　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 60 歲女性患者，有多年吸菸史合併支氣管擴張病史。患者自訴近 1 週來胸滿煩躁，咳痰呈現色黃黏稠，小便黃，大便乾。診其舌質邊尖紅苔黃，脈滑數。關於此肺脹病之中醫辨證，下列何者最宜？
㈠痰熱鬱肺　㈡痰濁阻肺　㈢肝火犯肺　㈣風熱襲肺

2 承上題，治以下列何方最適宜？
㈠麻杏石甘湯　㈡二陳湯　㈢桑白皮湯　㈣定喘湯

3 60 歲患者，外觀偏瘦，喜飲綠茶，平時經常吐清稀的痰液，偶咳，爬樓梯才會稍喘，每因氣候轉變而症狀加重，無頭痛、胃痛、腰痛病史，食慾尚正常，大便稍溏，小便淡黃色，舌潤苔薄白，脈滑稍弱，治以下列何方最宜？
㈠六君子湯　㈡苓桂朮甘湯　㈢腎氣丸　㈣吳茱萸湯

4 承上題，若要加強化痰，加下列何藥最宜？
㈠白芥子、紫蘇子、萊菔子　㈡陳皮、半夏、茯苓、甘草
㈢麻黃、杏仁、甘草　㈣細辛、乾薑、五味子

5 下列有關支氣管哮喘之敘述，何者錯誤？
㈠發作期的基本病理變化為伏痰自發
㈡長期反覆發作，可以由實轉虛，表現為肺脾腎虛損之候
㈢嚴重者，肺不能治理心血的運行，則心陽同時受累
㈣痰氣相搏於氣道，是哮喘發作的基本病理

6 林女士自訴照顧孫子，三天前孫子因感冒看醫師，經診斷為上呼吸道感染，昨天起林女士自覺身體發熱微惡寒，體溫攝氏 38 度，發燒時頭痛作，咽痛，微咳，痰黃，涕黃，胸無不適，肢無酸痛重。診其舌紅，苔薄白，脈浮數。治以下列何方最宜？
㈠桑菊飲　㈡銀翹散　㈢麻杏石甘湯　㈣普濟消毒飲

7 15 歲女性患者，近 1 年準備基測，時常睡眠不足，思慮過度，就診時其症狀有心悸，心煩，驚惕不安，多夢，舌淡紅苔少，脈細數，下列何者是最適宜的診斷？
㈠心虛膽怯　㈡肝氣鬱結　㈢心陰血虛　㈣痰火擾心

8 承上題，最適合以下列何方治之？
㈠安神定志丸　㈡加味逍遙散　㈢天王補心丹　㈣黃連溫膽湯

9 有關「胸痹」的類證鑑別，下列敘述何者錯誤？
㈠胸痹常於勞累、飽餐、受寒、情緒激動後突然發作，休息亦難以緩解
㈡懸飲胸脅脹痛，持續不解，且多伴有咳唾，轉側、呼吸時疼痛加重
㈢胸痹的疼痛亦可在胃脘部，但胃脘痛多伴有脾胃證候，可予以鑑別
㈣真心痛症見心痛劇烈，甚則持續不解，為胸痹的進一步發展

10 心為君火，肝腎藏相火。君火妄動，相火隨之。臨床上常見心動神浮，眠中多夢而遺精；並見面紅、煩躁眩暈、耳鳴、口苦脅痛、易怒。舌苔薄黃、脈弦數者。其最適當的治療處方應為下列何者？
㈠導赤散　㈡金鎖固精丸
㈢三才封髓丹　㈣《丹溪心法》萆薢分清飲

11 71 歲女性患者，來診時主訴陣發性心悸伴隨呼吸不暢已二十年。患者運動心電圖檢查無異常。自覺緊張時或飽食後易發作，運動不會發作，發作時多先覺胃脘痞悶，而後感頭暈眩，胸膈悶緊呼吸不順，甚至連到下巴處都覺緊繃。平時吃柳丁或喝冷水易腹瀉，吃甜食會作嘔。診其脈沉細緩，右關弦帶緊，左脈沉濇。本病主要病機下列何者最宜？
(A)心肺氣虛，胸陽不振　(B)脾陽虛衰，痰飲上逆
(C)腎陽虛衰，水氣凌心　(D)心肝血少，血脈不利

12 承上題，中醫師在診療後投以處方一週，患者回診時自覺一週來發作次數已明顯減少。依中醫辨證論治的原則，下列何者是最可能讓病情改善的處方？
(A)生脈散　(B)濟生腎氣丸　(C)苓桂朮甘湯　(D)酸棗仁湯

13 患者嘔吐反覆發作，但嘔量不多，時作乾嘔，口燥咽乾，似飢不欲食，舌紅津少，脈細數。下列治療處方何者正確？
(A)麥門冬湯　(B)橘皮竹茹湯　(C)旋覆代赭湯　(D)小柴胡湯

14 44 歲男性患者，由於長期腹瀉日三四行已五年，軟或水樣，常伴有黏液，解前腹痛解後症減，因害怕得癌症，至大醫院做大腸鏡檢查，結果並無瘜肉、癌變等變化；後來中醫門診治療，症如上述，診其苔白厚質淡紅，脈弦緩。下列何者治之最適當？
(A)胃苓湯合痛瀉要方加減　(B)藿香正氣散和平胃散加減
(C)白頭翁湯合胃苓湯加減　(D)葛根芩連湯合痛瀉要方加減

15 52 歲女性患者，於直腸惡性腫瘤手術後，接合處因狹窄西醫建議使用擴肛器，但大便每天約六七次，軟或溏瀉，常常肛門處有急迫感想大便，時常要躺臥，起則頭昏不舒，面色無華，身倦乏力。診其苔薄白質淡齒痕，脈弱。下列何方治之最適當？
(A)六君子湯　(B)歸脾湯
(C)補中益氣湯　(D)芍藥甘草湯合四君子湯

16 患者大便乾結、排便困難數月，半身熱心煩，腹脹滿痛，口乾口臭，小便短赤。診其舌紅，苔黃燥，脈滑數，選用下列何方最宜？
(A)麻子仁丸　(B)潤腸丸　(C)枳實導滯湯　(D)防風通聖散

17 患者見吐酸時作時止，噯氣臭腐，胸脘脹悶，喜唾涎沫，喜熱食，四肢不溫，大便溏泄，舌淡紅苔薄白，脈沈遲，治療宜用何方？
(A)半夏瀉心湯　(B)保和丸
(C)香砂六君子湯合吳茱萸　(D)左金丸

18 胃熱型胃痛的特點為下列何者？
(A)灼痛　(B)隱痛　(C)脹痛　(D)暴痛

19 關於臌脹的類證及鑑別診斷，下列敘述何者錯誤？
(A)臌脹的病機是肝脾腎三臟功能失調，形成氣滯、血瘀、水停腹中；水腫的病機係肺、脾、腎三臟相干，水液不能正常通調輸布，以致水溢肌膚
(B)臌脹以腹脹大為主證，積證的主證是腹中結塊疼痛
(C)《醫學心悟．腫脹》：「水腫鼓脹何以別之？答曰：目窠與足先腫，後腹大者，脹也；先腹大，後四肢腫者，水也。」
(D)臌脹腹診腹大但脹滿不甚，朝寬暮急，為脾腎陽虛證

20 李先生時常腸胃不舒服，每於黎明前腹痛腸鳴而瀉，瀉後痛減，併見腰膝痠軟，舌淡脈沈細，治以下列何方最適宜？
(A)藿香正氣散　(B)葛根黃芩黃連湯　(C)痛瀉要方　(D)四神丸

21 56 歲女性患者，罹患慢性肝炎，AST: 80 IU/L，ALT: 132 IU/L；ALP: 62 IU/L，今日來診，主訴平日怕冷，胃納少，大便溏，飲冷則大便溏薄加劇，腰膝冷痛。舌診：舌質淡胖，治療以下列何方最適宜？
(A)茵陳五苓散　(B)附子理中湯　(C)丹梔逍遙散　(D)參苓白朮散

22 一慢性腎炎患者來診症見眼瞼浮腫，小便不利，惡風發熱，身體生瘡，苔薄黃、舌紅，脈滑數，下列何方治療最宜？
(A)豬苓散　(B)越婢加朮湯　(C)麻黃連軺赤小豆湯　(D)小薊飲子

23 34 歲男性患者，外感後出現耳鳴，伴見耳根連及牙齦腫痛，兼見頭痛身痛、惡風、眩暈、嘔逆、心中煩悶，舌淡紅、苔薄白，脈浮數，治以下列何方最為適宜？
(A)涼膈散 (B)柴胡桂枝湯 (C)清胃湯 (D)翹荷湯

24 林先生，腎病症候群的患者，平素非常怕冷，但長期服用類固醇治療後臉部浮腫，蛋白尿雖由 4+轉為 2+，但始終無法完全消失，因此尋求中醫的治療。臨診脈弦細數，舌紅少苔，口乾欲飲，腰痠膝軟，難眠，手足心熱，尿短，大便一日一行，若病情允許而欲停服類固醇者，治以下列何種治療方法最適當？
(A)馬上停服類固醇，用知柏地黃丸合豬苓湯治療
(B)馬上停服類固醇，用桂附八味丸合五苓散治療
(C)逐漸減服類固醇，用桂附八味丸合五苓散治療
(D)逐漸減服類固醇，用知柏地黃丸合豬苓湯治療

25 承上題，若林先生在治療的過程中突然感冒了，則應如何處理最適當？
(A)「治病求本」，照原方處理即可
(B)「急則治其標，緩則治其本」，應先處理外感，但要避免傷其正
(C)「邪之所湊，其氣必虛」，故應加強補氣
(D)「血為氣之母」，補氣不如補血，補營所以調衛

26 一位中年男子主訴有性功能不好的問題，而且少寐多夢，夢則遺精，伴有心中煩熱、心悸、精神不振與體倦乏力。其舌紅脈細數，治以下列何方最宜？
(A)天王補心丹 (B)桂附八味丸 (C)妙香散 (D)導赤散

27 下列有關淋證之敘述，何者最宜？
(A)小便短數，灼熱刺痛，溺色黃赤，腰痛拒按，寒熱起伏，口苦噁嘔，便秘，苔黃膩，脈濡數者，治宜小薊飲子
(B)少腹墜脹，尿有餘瀝，面色白，舌質淡，脈虛細無力者，治宜知柏地黃丸
(C)小便澀滯，淋瀝不宣，少腹滿痛，脈沉弦者，治宜沉香散
(D)小便混濁如米泔水，尿道熱澀疼痛，舌紅，苔黃膩，脈濡數者，治宜膏淋湯

28 14 歲男童於一週前曾罹患上呼吸道感染合併急性扁桃腺炎，近 2 日突然發生全身水腫，血壓增高，血尿，肢體疼痛，惡風惡寒舌質紅苔薄白，脈象浮緊，請問此男童最可能罹患何種疾病？
(A)急性腎盂腎炎 (B)急性腎絲球腎炎 (C)急性間質性腎炎 (D)急性尿道炎

29 承上題，臨床處置以下列何者治療最宜？
(A)五苓散 (B)小薊飲子 (C)八正散 (D)越婢加朮湯

30 治療石淋有時會以清熱利濕之法用石葦散為主方，若要加強排石消堅的作用，以加下列何藥最宜？
(A)黃連 (B)黃柏 (C)雞內金 (D)鬱金

31 下列有關痹證之敘述何者正確？①行痹游走疼痛，時而上肢，時而下肢，以濕邪偏勝 ②痛痹以寒邪偏勝，痛有定處，疼痛較劇，得熱痛減 ③熱痹關節灼熱紅腫，口渴，舌紅，苔黃，脈滑數 ④久痹多因痰瘀阻絡、氣血虧虛 ⑤肌膚麻木，肢體關節重著，苔白膩，屬寒邪偏重
(A)①②③ (B)②③④ (C)②③⑤ (D)②③④⑤

32 35 歲女性患者，罹患系統性紅斑狼瘡（Systemic lupus erythematosus）已經多年，且出現腎病症候群（Nephrotic Syndrome）的臨床表現。腎病症候群的常見臨床症狀最接近於中醫的下列何者之範疇？
(A)關格 (B)尿血 (C)水腫 (D)癃閉

33 承上題，若患者出現心悸氣短，腰痛痠重，尿量減少，四肢冷，怕冷，神倦，面色白，面浮身腫，腰以下尤甚，按之凹陷不起。診其舌質淡胖，脈沉無力，則治以下列何方最適當？
(A)實脾飲 (B)真武湯 (C)疏鑿飲子 (D)濟生腎氣丸

34 有關痰、飲、水、濕的敘述，下列何者正確？①津液為正常生理產物 ②痰飲水濕皆為不正常之病理產物 ③肺主運化水液，運化不利則水濕停聚而為痰飲 ④哮是一種反覆發作性疾病，發作期亦稱伏飲
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①②③④

35 下列有關癭病之敘述，何者錯誤？
(A)好發於婦女，與衝任不調有密切關係
(B)日久引起血脈瘀阻，以致氣、痰、瘀三者合而爲患
(C)氣滯痰凝壅結頸前是癭病的基本病機
(D)火熱傷陰，形成陰虛火旺之證，以心肝兩臟病變較爲突出

36 癭病，頸前腫塊柔軟，煩熱多汗，急躁易怒，面部烘熱，口苦眼突手顫，舌紅脈數，治以下列何方最適宜？
(A)黃連溫膽湯 (B)梔子清肝湯 (C)黃連解毒湯 (D)抑肝散

37 消渴中消的患者，症見口渴易飢，但雖飢卻胃口不佳，雖渴卻不喜多飲水，下列相關敘述那些是正確的？①若患者口乾唇焦，大便結燥，此爲胃中堅燥，宜調胃承氣湯通泄火鬱 ②若多飲水則身易腫，易疲乏力，大便溏瀉，宜用錢氏白朮散益氣攝精 ③若多食則易脘脹，大便秘結，應益氣和陰，甘淡養胃，宜除煩養胃湯
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③

38 57 歲男性患者，糖尿病四年，口渴少飲，小便量多而頻，伴食慾減少，身倦乏力，下肢冷，自感身熱，動則易汗，舌淡苔白，脈沉細，治以下列何方最適宜？
(A)補中益氣湯 (B)理中湯 (C)金匱腎氣丸 (D)白虎加人參湯

39 以「柴胡疏肝散」治療鬱證，下列何者不是其辨證參考之主要依據？
(A)月經不規則 (B)目赤、耳鳴
(C)胸脅脹痛，痛無定處 (D)脘悶噯氣，腹脹納呆

40 下列關於頭痛病因論述，何者錯誤？
(A)外傷或久病入絡，均會導致氣滯血瘀，瘀血阻於腦絡，不通則痛，頭痛隨之而發
(B)脾胃爲後天之本，脾失健運，痰濕內生，阻遏清陽而致頭痛
(C)情志不和，鬱怒傷肝，則肝失條達，肝氣鬱結而致頭痛
(D)內傷頭痛多因起居不慎，坐臥當風等感受六淫之邪，上犯巔頂，清陽之氣受阻，氣血凝滯，阻礙脈絡而致頭痛

41 48 歲男性患者，身高 165 公分，體重 90 公斤，工作積極，亦常與同事衝突，嗜速食油炸辛辣，雙親有糖尿病史。今晨突然昏仆，就診時痰音明顯，呼吸氣粗，苔白膩，脈沈而滑。依上述，其辨證與治則下列何者最適宜？
(A)氣厥；順氣開鬱 (B)氣厥；行氣豁痰 (C)痰厥；行氣豁痰 (D)痰厥；順氣開鬱

42 下列關於「痙證」之敘述何者錯誤？
(A)是以項背強直，四肢抽搐，甚至角弓反張爲臨床特點的一種病證
(B)外感病因中屬熱邪所致者，主要有「熱熾陽明」、「熱盛動風」及「虛風內動」三類
(C)「濕熱侵入經絡」致痙之特色爲「時時發痙，手足蠕動」，宜以宣痹湯加減治療
(D)痙證大多預後較差，尤其內傷致痙，多虛中夾實，更爲難治

43 54 歲的男性患者平日喜食厚膩且常熬夜，顯得身體強壯臉色紅光滿面，又有高血壓但不按時服藥，一日發怒後仆倒於地，腦部電腦斷層掃描發現有基底核區出血 20c.c.，診其脈弦細數，舌紅苔黃，下列相關敘述何者錯誤？
(A)病因病機爲大怒則形氣絕，而血菀於上，使人薄厥
(B)可用鎮肝熄風湯，鎮肝熄風，滋陰潛陽
(C)可用三七、益母草、大黃
(D)可用補陽還五湯

44 74 歲的男性患者，突然左側肢體麻木但意識清楚、面紅目赤、尿赤便乾，診其脈弦數、舌紅苔黃，腦部電腦斷層掃描有腔隙小梗塞，選用下列何方最宜？
(A)羚羊角湯（羚羊角、珍珠母、竹茹、天竺黃、九節菖蒲、遠志）合安宮牛黃丸
(B)滌痰湯合蘇合香丸加減桃仁、紅花、川芎
(C)天麻鉤藤飲加桃仁、紅花、川芎、雞血藤
(D)補陽還五湯加減

45 在中年之後發作消渴病者，一般起病較緩，病程長，且常見有併發症，尤其在合併有經絡不利，血氣壅滯的癰疽發作時，其治則以下列何者最宜？
(A)清熱潤肺，益精攝氣　(B)實脾利水，滋養肝腎　(C)蒸騰水氣，引火歸元　(D)清熱解毒，益氣解毒

46 男性患者最近常有小腹脹滿疼痛，小便不暢有阻塞的現象，且每次小便都點滴而下。診其舌頭暗紫有瘀點，脈象細澀，則下列何方最宜？
(A)沉香散　(B)代抵當丸
(C)補中益氣湯和春澤湯　(D)濟生腎氣丸

47 肺癌患者，出現乾咳無痰或痰少粘稠不易咯出，或兼咯血，胸悶氣短，心煩口渴，潮熱盜汗，顴紅，聲音嘶啞等症，診其舌質紅而乾，苔薄或光剝無苔，脈細數。若咳嗽較劇者，加下列何藥最宜？
(A)麻黃、杏仁　(B)百部、款冬花　(C)瓜蔞實、浙貝　(D)川貝、桔梗

48 一婦人罹患大腸癌，畏寒肢冷、四肢浮腫、下利清穀、五更泄瀉、舌大胖嫩、脈象沉遲，則下列何方劑最適宜？
(A)小金丹　(B)補中益氣湯　(C)附子理中湯　(D)一貫煎

49 排卵週期在那一階段的子宮內膜腺體表現脹大而彎曲最顯著？
(A)增殖期　(B)分泌期　(C)內膜崩落期　(D)預備植入期

50 以菟絲子、杜仲、枸杞、山萸肉、當歸、熟地、山藥、茯苓所組成的方劑，最宜用來治療下列何種病證？
(A)「月經過多」之血熱證　(B)「月經過少」之腎虛證
(C)「月經先期」之虛熱證　(D)「月經後期」之血虛證

51 38 歲患者，月經量多，色淡而質清稀，面色白，偶心悸，氣短懶言，舌質淡紅、苔薄白，脈弱。下列治則何者最適當？
(A)補腎調衝　(B)涼血止血　(C)益氣攝血　(D)活血化瘀

52 28 歲患者以前並無經痛現象，近 3 個月開始有嚴重經痛，熱敷無法改善，經來喝四物湯下腹更痛，經婦產科超音波檢查顯示有右側巧克力囊腫 3 公分大，且抽血 CA-125 值 86（正常值爲小於 35）。其下腹痛症狀自月經前 2 天持續至月經來第 3 天，痛時拒按，經量正常但色鮮紅，察其脈象弦滑，苔白膩，質紅，則下列何項辨證最適當？
(A)經痛多爲寒證和虛證，證爲胞宮虛寒　(B)喝四物湯無效，且痛時拒按故證屬氣滯血瘀
(C)證屬血熱妄行　(D)證屬濕熱下注

53 鑑別及治療經行泄瀉與慢性泄瀉的相關敘述，下列何者正確？
(A)病程時間長爲慢性腹瀉，病程時間短爲經行泄瀉
(B)婦女平時有慢性腹瀉，但遇經期加重，可診斷爲經行泄瀉
(C)肌熱渴瀉，乃虛熱，宜用參苓白朮散加減
(D)經來泄瀉，脾虛者，宜用景岳大營煎加減

54 關於導致肝腎不足型經閉之原因，下列何者正確？①產後感寒　②先天腎氣不足　③房勞
(A)①②　(B)①③　(C)②③　(D)①②③

55 53 歲患者已停經一年，兩頰頭項陣發烘熱、大汗淋漓、五心煩熱、皮膚乾癢、口乾、大便硬結、舌紅少苔、脈細數，下列何者最適宜？
(A)加味逍遙散　(B)左歸飲加味　(C)右歸丸　(D)三黃瀉心湯

56 血熱型崩漏分虛、實兩型，有關虛熱型之敘述，下列何者正確？
(A)漏血日久，血色紫紅，質稠濃　(B)出血日久不淨，色鮮紅，午後輕微潮熱
(C)出血淋漓，色深紅，有血塊，舌質紅，苔黃　(D)漏紅日久，面赤易怒，胸脇脹

57 女性患者主訴婚後育一子已 3 歲，閉經不行已半年，致欲再懷第二胎未遂，醫者診斷爲氣滯血瘀經閉，其最可能之病因病機爲何？
(A)飲食勞倦，損傷脾氣
(B)多產房勞，損及肝腎
(C)大病久病，或產後失血傷津
(D)經期產後血室正開，調攝失宜，外感寒邪，內傷生冷

58 《醫宗金鑑．婦科心法》中對於帶下之敘述，下列何者正確？
(A)帶下因六淫之邪入胞中，色黑清稀者，宜六味地黃湯治療
(B)帶下如污水綿綿，伴少腹脹痛，屬濕熱者，宜萬安丸治療
(C)帶下膠黏色白，從精竅出，尿竅通利，乃膀胱白濁病
(D)帶下如米泔，兼尿竅不利，乃胞中白淫病

59 關於「癥瘕」之敘述，下列何者正確？①為腹內有結塊，並伴有或滿、或脹、或痛，甚或出血的一種病證　②本病辨證，重在辨氣病、血病　③治療須遵循「衰其大半而止」之原則　④於婦科屬於帶下病之範疇
(A)①　(B)①②　(C)①②③　(D)①②③④

60 下列關於《達生篇》保產無憂方之敘述，正確的有幾項？①其組成含有艾葉、厚朴二藥　②用羌活、荊芥之目的是欲升舉胎元　③懷孕六、七月服之，能使胎氣安和　④臨產服之，亦可催生
(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4

61 在診斷產後病時，有「三審」之法，其中審查大便之通或不通，目的為下列何者？
(A)驗惡露之有無　(B)驗氣之通與不通　(C)驗津液之有無　(D)驗胃氣之強弱

62 患者產後惡露過期不止，且量多，其色紫紅質稠黏，有臭味。望其舌質紅，脈虛細而數。下列何組成最宜治療此一病患？
(A)生地、熟地、白芍、山藥、續斷、黃芩、黃柏、阿膠、旱蓮草、烏賊骨、甘草
(B)當歸、川芎、桃仁、炮薑、益母草、炒地榆、炙甘草
(C)金銀花、野菊花、蒲公英、紫花地丁、紫背天葵
(D)當歸、仙茅、仙靈脾、巴戟天、知母、黃柏

63 林小姐昨日於醫院自然產時，突然陰道大量出血，出現昏暈面色蒼白，手腳冰冷，心悸，冷汗淋漓，見其舌淡無苔，脈浮大而虛。此時最宜下列何方治療？
(A)當歸四逆湯　(B)獨參湯　(C)奪命散　(D)補中益氣湯

64 下列出自《傅青主女科》之方劑，那些敘述正確？①山茱萸、熟地是養精種玉湯的組成藥物之一　②當歸、白芍是養精種玉湯與開鬱種玉湯相同的組成藥物　③丹皮是開鬱種玉湯的組成之一，但不是健固湯的組成
(A)①②　(B)①③　(C)②③　(D)①②③

65 一位出生體重 1750 公克的早產兒，現在已 40 天大，體重 1980 公克。近來出現面目皮膚發黃、顏色淡而晦暗、神疲身倦、四肢欠溫、納少易吐、大便溏薄灰白、舌淡、苔白膩等症狀，宜下列何方劑處理？
(A)茵陳、山梔子、大黃、枳實、竹茹
(B)茵陳、乾薑、黨參、茯苓、白朮、甘草
(C)茵陳、柴胡、枳殼、桔梗、桃仁、當歸、川芎、生地、紅花、牛膝、甘草
(D)柴胡、黃芩、半夏、黨參、生薑、紅棗、甘草

66 依《醫宗金鑑》，小兒證見痰多燥黏，氣逆喘咳，夜臥不寧，面赤口乾，小便黃赤，屬於下列何證？
(A)肺熱　(B)火熱　(C)燥痰　(D)風熱

67 承上題，宜治以下列何者？
(A)輕者用麻杏石甘湯清之，重者用雙解通聖散下之
(B)輕者用麻杏石甘湯清之，重者用涼膈散下之
(C)輕者用清氣化痰丸清之，重者用蘇葶滾痰丸下之
(D)輕者用加味瀉白散清之，重者用蘇葶滾痰丸下之

68 依《醫宗金鑑》瀉證門，水瀉症狀為小便短濇，懶食，溏瀉，便色黃，治療宜用下列何方？
(A)胃苓湯　(B)養脾丸　(C)補中益氣湯　(D)參苓白朮散

69 林小妹 3 歲，因嘔吐來求診，症狀爲食入即吐，嘔吐酸臭，口渴喜飲，身熱煩躁，唇乾面赤，大便秘結，舌紅苔黃，脈數。則下列處方何者最適宜？
(A)定吐丸《醫宗金鑑》 (B)解肝煎《景岳全書》
(C)加味溫膽湯《醫宗金鑑》 (D)消乳丸《證治準繩》

70 三個月大嬰兒，由父母帶到中醫兒科門診，主訴每晚哭鬧。在望診發現孩子臉色甚紅，嘴唇亦紅，聞診聽其聲音宏亮，問診得知小便不利，切診撫摸嬰兒身腹俱熱。以下列何方劑治療最適合？
(A)鉤藤飲 (B)導赤散 (C)蟬花散 (D)硃衣滾痰丸

71 小兒腹脹，時有疼痛，夜臥不安，煩躁夜啼，嘔吐酸餿乳食，舌紅苔膩，脈象滑數，指紋紫滯，治以下列何方藥最適當？
(A)全蠍觀音散 (B)健脾丸 (C)木香大安丸 (D)定吐丸

72 下列何方屬陰水治療方劑？
(A)舟車神祐丸 (B)沉香琥珀丸 (C)茯苓導水湯 (D)實脾散

73 依《幼科雜病心法．淋證門》，有關石淋的治療，下列何者正確？
(A)方用十味導赤湯，大便結急服八正散 (B)輕證用葵子散，重證則用八正散
(C)方用五苓散 (D)方用小薊飲子，若莖中痛用五淋散

74 某 5 歲男童，最初症狀爲鼻塞，流清涕，無熱，2 天後起疹，疹有泡漿清亮，周圍紅暈，有癢感，不痛，3-4 天後見丘疹、疱疹癒後結痂，下列診斷何者正確？
(A)幼兒急疹 (B)疱疹 (C)水痘 (D)奶麻

75 承上題，病在初期 1 或 2 天時，下列處方何者最適當？
(A)清胃解毒湯 (B)麻杏甘石湯 (C)銀翹散 (D)桑白皮湯

76 小兒噤口痢，乃火毒沖胃而成，《醫宗金鑑》之處方爲「參連開噤散」，請問方中之參，指的是下列何藥？
(A)苦參 (B)人參 (C)太子參 (D)玄參

77 依《醫宗金鑑．痘疹心法》，毒熱凝結移大腸，腹痛下痢赤白色，治以清熱導滯湯，其組成爲下列何者？
(A)山查、生甘草、檳榔、當歸、白芍（酒炒）、條芩（酒炒）、連翹、牛蒡子（炒、研）、青皮（炙）、黃連（吳茱萸炒）引用生薑
(B)山查、厚朴（薑炒）、生甘草、枳殼（麩炒）、檳榔、當歸、白芍（酒炒）、條芩（酒炒）、連翹、牛蒡子（炒、研）、青皮（炙）、黃連（吳茱萸炒）引用生薑
(C)山查、厚朴（薑炒）、生甘草、枳殼（麩炒）、檳榔、當歸、白芍（酒炒）、連翹、牛蒡子（炒、研）、青皮（炙）引用生薑
(D)山查、厚朴（薑炒）、生甘草、枳殼（麩炒）、當歸、白芍（酒炒）、條芩（酒炒）、連翹、牛蒡子（炒、研）、黃連（吳茱萸炒）引用生薑

78 有關病毒或細菌感染的分辨，下列敘述何者正確？①病變部位牽涉到多系統者爲病毒感染，細菌感染有局部化特性 ②臨床嚴重度比較毒性（toxic）的，傾向細菌感染 ③皮膚出疹（skin rash）多爲細菌感染 ④C 反應蛋白（CRP）和白血球高，傾向病毒感染
(A)①② (B)③④ (C)①④ (D)②③

79 6 歲患者，皮膚突然出現瘀點、瘀斑，斑色鮮紅，伴有發熱、頭痛、心煩、口渴、便秘及腹痛，舌質紅，脈浮數。下列病機何者最適當？
(A)外受邪熱，內伏血分，迫血妄行 (B)體稟不足，氣血虧損，脾虛氣弱，氣不統攝
(C)虛火內動，血隨火行，滲於脈外 (D)內傷腎陰，熱迫血行

80 承上題，下列何者最適宜？
(A)知母、黃柏、熟地、山茱萸、山藥、澤瀉、丹皮、白茯苓
(B)荊芥炭、浮萍、豨薟草、地膚子、生地、丹皮、赤芍、景天三七、紫草
(C)白朮、黃耆、龍眼肉、茯神、酸棗仁、黨參、當歸、木香、遠志、炙甘草、生薑、大棗
(D)犀角、生地、丹皮、芍藥