103年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：5105
頁次：8－1

等　　別：高等考試
類　　科：中醫師㈡、中醫師
科　　目：中醫臨床醫學㈡（包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學）
考試時間：1 小時 30 分　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1　72 歲男性患者罹患慢性阻塞性肺病而肺功能較差，已有心肺症，症見胸悶、刺痛，手足麻，舌青紫、瘀點，脈澀者，治以下列何方最適宜？
㈠千金葦莖湯　㈡補中益氣湯　㈢血府逐瘀湯　㈣百合固金湯

2　有關支氣管哮喘預防保健方法，下列敘述何者錯誤？
㈠哮喘每因氣候突然變化，特別是寒冷空氣刺激而誘發，故患者應注意避免感冒
㈡飲食宜清淡，忌食肥甘厚味，如酒、魚、蝦蟹、肥肉、濃茶等
㈢若見實喘，禁食補品；只有在身體虛弱的患者，才適合食用
㈣凡見痰黏稠之症，均宜食梨子以潤肺化痰

3　62 歲女性患者有多年支氣管擴張病史，近一年來症見咳逆喘息少氣，咳痰夾血絲色暗淡，白天常動則出汗，形寒肢冷，五更腹瀉。診其脈虛大無力，舌質紅少津，依中醫辨證，下列何者最適宜？
㈠陰陽兩虛　㈡痰濁阻肺　㈢肺腎氣虛　㈣肺腎陰虛

4　承上題，治以下列何方最適宜？
㈠百合固金湯　㈡參蛤散　㈢補天大造丸　㈣蘇子降氣湯

5　25 歲男性患者上呼吸道感染，症見咽乾、咽痛、痰黃、涕黃、身熱微惡寒、脈浮數、苔薄白，舌質微紅等症，醫師用荊防敗毒散治療，最可能出現下列何種預後？
㈠有助熱燥液動血之弊　㈡汗不易出，病邪難以外達
㈢重傷正氣　㈣邪速從表解

6　30 歲患者於感冒 5 天後發生咳嗽，呼吸困難，測量體溫 38.3℃，理學檢查：在右側肩胛骨尖端下方，叩診時呈現濁音，該部位之呼吸音消失，無濕性囉音；在該濁音區域之附近聽診時，可聽到一些濕性囉音及支氣管呼吸聲，中醫師診察後，症見舌紅，苔黃，脈滑數。下列何方可優先考量使用？
㈠十棗湯　㈡茯苓桂枝白朮甘草湯
㈢小青龍湯　㈣大青龍湯

7　65 歲男性患者，自訴 2-3 個月前由 24 小時心電圖診斷為病態竇房結綜合徵（sick sinus syndrome），其望診面白少華，精神倦怠，舌淡胖有齒痕，舌苔白邊少苔多津，舌下絡脈怒張，問診其症狀有頭暈心悸、胸悶氣促、手足冰冷乏力等，切診其脈遲澀無力。下列相關敘述何者錯誤？
㈠辨證為心腎陽虛為主
㈡可以人參、黃耆、附子、肉桂等藥物為主治療
㈢本病多為病毒感染所致，可輔以抗病毒藥物治療
㈣本病多夾有血瘀，可輔以活血藥物治療

8 臨床上「心悸」常源自其他臟腑的生理失調，間接影響到心臟的功能，下列何者不屬於上述狀況？
(A)房勞過度，或長期憂思驚恐，導致腎陰虧損，虛火妄動，擾亂心神，形成心悸
(B)飲食無度，膏粱厚味煎炸炙烤，生痰蘊熱化火，痰火擾心，導致心悸
(C)天氣寒冷，寒邪外束，心脈收引，脈氣不利，造成心悸
(D)年老或勞役過度，導致脾腎陽虛，無以運化水液，聚而成飲。飲邪上泛，心陽被遏，造成心悸

9 61 歲女性患者有多年高血壓糖尿病病史。來診時主訴最近一個月經常心悸發作，同時伴有眩暈、噁心嘔涎、脘腹痞脹、手足不溫、小便短少等症狀。其臨床辨證以下列何者最有可能？
(A)心脾兩虛 (B)腎陰虛火旺 (C)水飲凌心 (D)痰火擾心

10 承上題，中醫師投以處方，一週後回診時患者反應服藥一日後心悸、眩暈明顯減輕，脘腹痞脹較消，尿量增加。依中醫辨證論治的原則，下列何者是最可能讓病情改善的處方？
(A)桂枝湯 (B)養心湯 (C)真武湯 (D)八味地黃丸

11 有關肺痿的敘述，下列何者錯誤？
(A)以咳嗽胸痛，吐痰腥臭，甚至咳吐膿血爲主證
(B)是肺臟的慢性虛損性疾患
(C)病因可分肺燥津傷和肺氣虛冷，使得肺氣失於濡養而日漸枯萎
(D)治療要注意保護津液，不可妄投燥熱之劑

12 患者嘔吐清水痰涎，胸悶不食，心悸頭眩，舌苔白膩，脈滑，應診斷爲下列何種證型最適宜？
(A)外邪犯胃 (B)飲食停滯 (C)痰飲內停 (D)脾胃氣虛

13 患者腹痛綿綿，喜熱喜按，飢勞更甚，神疲乏力，氣短，畏寒，便溏，舌淡苔白，脈沉細，治以下列何方最適宜？
(A)良附丸 (B)小建中湯 (C)安中散 (D)痛瀉要方

14 有關「癃閉」的辨證，下列敘述何者錯誤？
(A)老年排尿無力、點滴而下者，爲腎虛命門火衰
(B)口渴欲飲、咽乾氣促、小便難出者，爲熱積膀胱
(C)小便不利兼有小腹重脹、肛門下墜，爲中氣不足
(D)尿線變細，或時而通暢，時而不通，爲尿路阻塞

15 患者大便時溏時瀉，水穀不化，飲食減少，稍進油膩之物，則大便次數明顯增多，面色萎黃，肢倦乏力，舌淡苔白，脈細弱。治以下列何方最適宜？
(A)四神丸 (B)參苓白朮散 (C)藿香正氣散 (D)胃苓湯

16 有關哮證發作辨證論治之敘述，下列何者錯誤？
(A)寒哮咳痰色白、稀薄、泡沫或黏膩，咯吐不爽，主方以小青龍湯爲主
(B)痰哮仍痰涎壅盛，喉如曳鋸，咯痰黏膩難出，主方以蘇子降氣湯或麥門冬湯爲主
(C)熱哮痰黃或白，黏濁稠厚，咳吐不利，可使用越婢加半夏湯
(D)射干麻黃湯可用於治療寒哮

17 40 歲女性患者，自訴與朋友至冷飲店喝完綠奶茶後，胃痛不舒，食不下，上腹脹滿。診其舌淡紅苔白，脈弦緊。治以下列何方最適宜？
(A)黃耆建中湯 (B)安中散 (C)香砂六君子湯 (D)理中湯

18 患者嘔吐吞酸，噯氣頻繁，胸脅滿痛，舌邊紅，苔薄膩，脈弦。下列治法何者最適宜？
(A)消食化滯，清胃止嘔 (B)疏肝理氣，和胃降逆
(C)溫中化飲，治脾止逆 (D)溫養脾胃，降逆止嘔

19 56 歲女性患者主訴脅痛以脹痛為主，走竄不定，疼痛每因情志變化而增減，胸悶不舒，飲食減少，矢氣頻作。診其苔薄，脈弦。治以下列何方最適宜？
(A)柴胡疏肝散 (B)旋覆花湯 (C)龍膽瀉肝湯 (D)一貫煎

20 53 歲女性患者，會診症見腹大脹滿，腹診按之如囊裹水，脘腹痞脹，得熱稍緩，精神困倦，怯寒懶動，尿少便溏，顏面及下肢浮腫，苔白膩。下列治法何者最適宜？
(A)攻下逐水，清熱利濕 (B)行濕散滿，疏肝理氣
(C)溫中健脾，行氣利水 (D)溫肺補脾，化氣行水

21 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)實脾飲 (B)胃苓湯合柴胡疏肝散
(C)附子理中湯合濟生腎氣丸 (D)茵陳蒿湯合中滿分消丸

22 45 歲男性患者主訴眼瞼浮腫，繼則全身浮腫，伴有惡風、發熱、肢節痠楚，小便不利。診其舌紅、脈滑數，患者診斷以下列何證最適宜？
(A)濕熱內蘊 (B)脾腎陽虛 (C)風水泛濫 (D)水濕浸漬

23 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)小薊飲子 (B)實脾飲 (C)五苓散 (D)越婢加朮湯

24 45 歲男性患者主訴小便淋瀝不已，時作時止，遇勞即發，腰膝痠軟，神疲乏力。診其舌淡、脈弱，治以下列何方最適宜？
(A)無比山藥丸 (B)五淋散 (C)加味逍遙散 (D)補陽還五湯

25 58 歲男性患者，症見小便量少幾近全無，兼見手指顫抖、頭痛、齒齦腫痛糜爛，皮膚搔癢，煩躁不安。診其舌光剝無苔，舌紅、卷縮，脈細弦數，治以下列何方最適宜？
(A)知柏八味丸 (B)調肝散 (C)秦艽鱉甲散 (D)鎮肝熄風湯

26 50 歲男性因為頻尿看診，主訴尿多、尿濁、形體消瘦與口渴飲多。診其舌紅脈數，患者診斷以下列何者最適宜？
(A)膏淋 (B)消渴 (C)熱淋 (D)虛淋

27 有關淋證之敘述，下列何者錯誤？
(A)沉香散可同時用在「氣淋實證」與「肝鬱氣滯型癃閉」
(B)八正散對於「膀胱濕熱型癃閉」與「熱淋」皆可用
(C)腎氣丸可用在「腎陽衰憊型癃閉」與「膏淋」症
(D)補中益氣湯使用在「脾氣不升型癃閉」與「氣淋虛證」均可

28 15 歲男性患者，一週前先是眼瞼面部水腫，最近兩日繼而全身浮腫。胸部 X 光檢查：心臟大小正常；尿液檢查：尿蛋白++、紅血球 10~15/HPF；血壓 150/100 mmHg。病人尚有惡風、發熱、四肢關節腰部痠楚、尿少、舌紅、脈滑數。治以下列何方最適宜？
(A)越婢湯 (B)豬苓湯 (C)導赤散 (D)八正散

29 72 歲男性患者，主訴小便點滴而出，時常要跑廁所，大約每半小時一次，醫師診其舌淡脈沉細尺偏弱，腰膝痠軟無力，也易手腳冰冷，治以下列何方最適宜？
(A)五苓散 (B)補中益氣湯 (C)八正散 (D)金匱腎氣丸

30 50 歲男性患者，近來突發頭暈頭痛、記憶力減退、視力下降等情形，醫師診察時發現上肢發冷、麻木疼痛、脈搏動減弱並伴有局部身熱、乏力、肌肉關節痠痛、大便不順暢、舌質紅、苔黃膩、脈數，治以下列何方最適宜？
(A)黃耆桂枝五物湯 (B)桂附八味丸 (C)陽和湯 (D)四妙勇安湯

31 承上題，此病症最接近於中醫何者之範疇？
(A)骨痹 (B)脈痹 (C)肌痹 (D)皮痹

32 有關痹證與痿證的鑑別，下列敘述何者最正確？①痹證四肢均易罹患 ②痿證以下肢爲主 ③痹證多有疼痛，痿證一般不痛 ④痹證與痿證一般都會有肌肉瘦削之症
(A)①②④ (B)①②③ (C)②③④ (D)①③④

33 66 歲女性硬皮症患者，症見顏面與肢體皮膚變硬變薄，伴有身倦乏力，頭暈腰痠，吞嚥不利，四肢冰冷，手足遇寒變白變紫，舌質淡，苔白，脈弱沉遲，下列證型診斷何者最適宜？
(A)寒濕壅肺 (B)痰瘀阻絡 (C)肺胃陰虛 (D)陽虛寒凝

34 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)一貫煎 (B)陽和湯 (C)身痛逐瘀湯 (D)六味地黃丸

35 有關消渴病之敘述，下列何者錯誤？
(A)病變中心以脾虛最爲重要
(B)本病最多三消合病並見
(C)因病多虛證，雖有火燥，不可過投寒涼攻下
(D)腎有水火陰陽，消證腎虛精耗，火浮爲多

36 55 歲女性患者尿頻，泡沫多色黃，體重下降，腰痠，手足心熱，大便乾 2 個月，西醫診斷爲糖尿病。診其口乾苦，舌嫩紅，有裂紋，少苔，脈沉細數，其診斷以下列何種證型最適宜？
(A)腎陰虛火旺 (B)腎陰虛夾濕熱 (C)腎氣陰兩虛 (D)肝腎陰虛

37 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)甘露飲 (B)知柏地黃丸 (C)一貫煎 (D)八仙長壽丸

38 有關癭病的敘述，下列何者錯誤？
(A)《三國志・魏書》有「十人割癭九人死」是中國最早關於反對癭病進行手術的記載
(B)《肘後救卒方》中用昆布、海藻治療癭病，是中醫典籍之中最早使用含碘藥材治療癭病的記載
(C)《千金要方》中對癭病提出了石癭、肉癭、筋癭、血癭、氣癭等五種分類
(D)《陳無擇・三因極一病證方論》認爲癭病主要應以內服藥治療，反對癭病施以刀針治療

39 25 歲孕婦因爲頸前腫塊前來看診，觀察其腫塊位於頸部正中線，均勻對稱，觸感表面平滑，質地柔軟，可以隨吞嚥動作而活動，患者常常覺得胸脅悶，但沒有煩熱、眼突、指顫、急躁易怒等症狀，舌淡紅，苔白，脈弦，則下列何者治法最不適宜？
(A)《外臺秘要》昆布丸 (B)《瘍醫大全》四海舒鬱丸
(C)《類證治裁》梔子清肝湯 (D)《儒門事親》化癭丹

40 53 歲男性患者，門診主訴眩暈反覆一年多，每因煩勞或惱怒而發作，面潮紅，急躁易怒，少寐多夢，口苦，舌質紅苔黃，脈弦。其證治以下列何者最適宜？
(A)氣血虧虛，方用歸脾湯 (B)痰濁中阻，方用半夏白朮天麻湯
(C)腎陰虛內熱，方用左歸丸 (D)肝陽上亢，方用天麻鉤藤飲

41 28 歲女性患者，二個月前早產，近來常覺健忘，偶爾會恍惚，容易受驚嚇，頭暈心悸，食慾不振，常掛心小嬰兒，家人都說她臉色越來越差。診其舌質淡紅偏淡，苔白，脈細而無力，治以下列何方最適宜？
(A)甘麥大棗湯 (B)歸脾湯 (C)丹梔逍遙散 (D)滋水清肝飲

42 7 歲男童，因神志昏迷會診，一週前高熱至今，口噤抽搐，全身肌肉張力上升。望其唇紅而乾、舌質紅絳，苔黃而乾甚，脈緊而數，觸之額頭及四肢均熱甚。依上證治以下列何方最適宜？
(A)清宮湯送安宮牛黃丸 (B)羚羊鉤藤湯合安宮牛黃丸
(C)天麻鉤藤湯送服至寶丹 (D)安宮牛黃丸送服大黃末

43 25 歲患者於 10 天前淋雨後感到頭痛頭脹，往往頭如戴帽子的感覺，且四肢沉重，食慾變差。診其脈濡，苔白膩，治以下列何方最適宜？
(A)川芎茶調散 (B)羌活勝濕湯 (C)柴葛解肌湯 (D)藿香正氣散

44 20 歲男性患者在中學求學時期就少與同學往來，於家中亦見其靜默少言，一年前因在服兵役時，常常神志痴呆，語無倫次或喃喃自語而提前退伍，就診時見其表情淡默，不思飲食，診其舌苔膩，脈弦滑，治以下列何方最適宜？
(A)順氣導痰湯合控涎丹 (B)養心湯加減
(C)甘麥大棗湯加菖蒲、鬱金 (D)歸脾湯加減

45 積病是指腹內有結塊，或脹或痛的病證。依《丹溪心法．積聚痞塊》認為積病後期治療有培補氣血扶正攻瘀的治則，但不可用下列何藥？
(A)清熱藥 (B)消積藥 (C)攻下藥 (D)化痰藥

46 58 歲女性，胃癌第三期患者，胃部手術切除，並進行化學治療。治療期間，納差，食不下，身體遽瘦，語音低微，氣短懶言，面色蒼白，寒熱交作。下列治療原則何者最適宜？
(A)補益肺氣，調和營衛 (B)扶養脾胃，補氣益損
(C)平肝健肺，溫補腎陽 (D)疏肝理氣，和胃降逆

47 對於各類型耳鳴的敘述，下列何者最正確？
(A)腎虛者耳竅轟鳴，攻逆陣作 (B)痰濁者耳鳴，時輕時重，煩悶不舒
(C)肝火者耳鳴聲細，如蟬持續，怒則加重 (D)陽虛者耳鳴時作，午後加重

48 34 歲女性患者大便秘結，欲便不得，噯氣頻作，胸脅痞滿，腹中脹痛，時作時止，納食減少，苔薄白膩，脈弦。治以下列何方最適宜？
(A)麻子仁丸 (B)六磨湯 (C)大承氣湯 (D)調胃承氣湯

49 月經先期的患者，若經量多、經色紫紅、質稠黏。下列何者是最可能的證型？
(A)氣虛血熱 (B)陰虛血熱 (C)陽盛血熱 (D)濕熱內蘊

50 40 歲患者，月經量多，色淡而質清稀，面色白，偶心悸，氣短懶言，舌質淡紅、苔薄白，脈弱。治以下列何方最適宜？

(A)人參、黃耆、白朮、升麻、炙甘草　(B)當歸、川芎、熟地、白芍

(C)茜草、益母草、當歸、川芎　(D)白芍、龜板、黃芩、黃柏、椿根皮、香附

51 「月經過少」之治法，著重在下列何者？

(A)利下化瘀　(B)濡養精血　(C)涼血清熱　(D)祛邪扶正

52 一般痛經病人，因痛發作的時間不同而有虛實不同的辨證，下列有關這些辨證的敘述何者最正確？

(A)經前痛作者均屬虛　(B)經行痛甚者均屬實

(C)經後綿綿作痛者多屬虛　(D)經後始痛發作者多屬實

53 52 歲患者經期紊亂、經量少、色紫、頭暈目眩、耳鳴、潮熱、煩躁易怒、舌質紅、脈細數，下列辨證何者最適宜？

(A)肝鬱化火　(B)腎虛肝旺　(C)腎陰陽兩虛　(D)肝腎兩虛

54 承上題，治以下列何方最適宜？

(A)丹梔逍遙散合涼膈散　(B)右歸飲合理中丸

(C)二仙湯合二至丸　(D)知柏地黃湯合龍膽瀉肝丸

55 經血時下時止，閉經日久又突下，血量多、色紫黑、有血塊、小腹疼痛、拒按、脈弦緊、舌色紫瘀斑。治以下列何方最適宜？

(A)當歸、熟地、黃耆、人參、白朮、炮薑

(B)生地、生白芍、花蕊石、棕櫚炭、藕節炭、煅牡蠣、側柏葉、地骨皮、石斛、黃芩、玄參

(C)當歸、生地、赤芍、川芎、蒲黃炭、五靈脂、茜草、烏賊骨、三七

(D)生地、當歸炭、生白芍、丹皮、槐花、旱蓮草、仙鶴草、炒蒲黃、熟軍炭

56 一婦人婚後久不受孕，經行延後，帶下量多，質黏稠，面色白，頭暈心悸，胸悶泛噁，苔白膩，脈滑，治以下列何方最適宜？

(A)《景岳全書》毓麟珠　(B)《傅青主女科》開鬱種玉湯

(C)《濟生方》歸脾湯　(D)《葉天士女科》蒼附導痰湯

57 38 歲患者常常陰道氣出有聲，伴隨帶下量多色白質黏，口膩痰多，胃脘痞悶，舌淡紅苔白膩，脈滑。治以下列何方最適宜？

(A)完帶湯　(B)豬膏髮煎　(C)補中益氣湯　(D)橘半桂苓枳薑湯

58 有關「臟躁」與「甘麥大棗湯」之敘述，下列何者最正確？①本病主要表現在神志的異常改變　②本病屬內傷虛證，五志化火而成　③《金匱心典》認為小麥為心之穀，而善養其氣　④治宜清降瀉火

(A)③④　(B)①②　(C)①②③　(D)①②③④

59 因氣血虛弱引起之胎動不安，治以下列何方最適宜？

(A)《醫學衷中參西錄》壽胎丸　(B)《景岳全書》胎元飲

(C)《景岳全書》保陰煎　(D)《金匱要略》膠艾湯

60 患者懷孕 36 週，出現面目及四肢浮腫，皮薄而光亮，膚色淡黃，問診發現病患還有胸悶短氣，不喜歡多說話，食慾不振，口淡無味，大便較稀軟。望其舌苔薄白，舌質胖嫩邊有齒痕，診其脈緩滑無力。治以下列何方最適宜？

(A)黃耆、桔梗、升麻、知母、柴胡

(B)黨參、白朮、茯苓、甘草、陳皮、法半夏

(C)白朮、茯苓皮、大腹皮、生薑皮、陳皮

(D)茯苓、豬苓、砂仁、陳皮、木香、檳榔、大腹皮、白朮、澤瀉、蘇梗、木瓜、桑白皮

61 產後病，古人有「三急」、「三衝」、「三病」之說。下列何者不是「三急」之一？

(A)痙症　(B)嘔吐　(C)盜汗　(D)泄瀉

62 患者臨產分娩時，陣痛微弱，宮縮時間短，間歇時間長，產程進展緩慢。診其面色蒼白，舌淡苔薄，病人且覺疲乏，四肢無力，氣短，脈大而虛。治以下列何方最適宜？

(A)當歸、白芍、大腹皮、枳殼、白芷、益母草

(B)黃耆、黨參、白朮、陳皮、柴胡、升麻、當歸、甘草

(C)黃耆、當歸、黨參、白芍、川芎、茯神、枸杞、醋炙龜板

(D)當歸、川芎、白芍、黃耆、艾葉、菟絲子、厚朴、羌活、荊芥穗、枳殼、川貝母、甘草、生薑

63 《景岳全書》歸腎丸與小營煎相同的藥物組成，下列何者最正確？①山藥、當歸　②山茱萸、白芍　③枸杞子、熟地

(A)①②　(B)①③　(C)②③　(D)①②③

64 下列那些是《傅青主女科》固本止崩湯之組成藥物？①人參、炙甘草　②白朮、熟地　③黃耆、當歸　④炮附子、陳皮　⑤炮薑、升麻

(A)②③　(B)①③⑤　(C)①②④⑤　(D)①②③④⑤

65 依《醫宗金鑑．幼科雜病心法要訣》，盤腸氣痛，治以下列何方最適宜？

(A)烏藥順氣散　(B)勻氣散　(C)白豆蔻散　(D)藿香正氣散

66 小兒水腫，稍有浮腫，或腫不明顯，小便黃赤短小，甚至血尿，舌苔黃或黃膩，質偏紅，脈偏數。治以下列何方最適宜？

(A)杏仁、連翹、麻黃、赤小豆、生梓白皮、生薑、大棗、炙甘草

(B)黃柏、牛膝、蒼朮、燈心、淡竹葉、木通、生地黃、生甘草梢

(C)木通、滑石、淡竹葉、山梔、藕節、當歸、小蓟、炒蒲黃、炙甘草、生地

(D)滑石、澤瀉、茯苓、阿膠、豬苓

67 1 歲患者，咳嗽 1 日，咳有痰聲，鼻塞，流少量清涕，體溫 38.5℃，指紋浮紅。辨證為下列何種證候最適宜？

(A)風寒　(B)風熱　(C)痰濕　(D)濕熱

68 承上題，治以下列何方最適宜？

(A)金沸草散　(B)桑菊飲　(C)二陳湯　(D)清金化痰湯

69 依《醫宗金鑑．幼科雜病心法》，小兒腹痛有四，若「發熱惡寒腹痛兼，惡食嘔吐多啼叫」。則下列診斷何者最適宜？
(A)食痛 (B)蟲痛 (C)寒痛 (D)內食外寒痛

70 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)治以桂枝加芍藥湯
(B)宜理中湯溫之，若四肢厥冷加附子
(C)先以錢氏安蟲散散之，痛久不愈者，加減理中湯治之
(D)治以藿香和中湯

71 6 歲幼兒於五月中旬出現倦怠嗜睡，食慾減退、泛噁、熱勢不高，大便不調、小便頻數短赤，苔黃膩、脈濡等症狀，下列診斷何者最適宜？
(A)夏季熱 (B)暑溫 (C)疰夏 (D)陽明經熱

72 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)醒脾化濕 (B)清暑益氣 (C)清熱通腑 (D)清熱解毒，辛涼透表

73 婦人寒冬於家中產子，因護理不當，後見嬰孩膚腫硬發涼、臀腿臂頰紅腫如凍傷，唇色暗紅、面色晦暗。治以下列何方最適宜？
(A)附子、乾薑
(B)附子、乾薑、蔥白
(C)附子、乾薑、蔥九支、炙甘草
(D)當歸、芍藥、細辛、桂枝、木通、吳茱萸、薑、棗

74 時痢是痢疾病，可先用「倉廩散」發散，緩解時令之邪氣，方中用下列那些風藥來發散時邪？
(A)荊芥、防風 (B)羌活、獨活 (C)薄荷、連翹 (D)金銀花、連翹

75 水痘出現壯熱不退，煩躁不安，口渴欲飲，面紅目赤，伴有牙齦腫痛、口舌生瘡，疹色紫暗，大便乾結，小便黃赤，苔黃糙而乾、質紅或紅絳，脈象洪數，下列辨證何者最適宜？
(A)風熱犯衛 (B)毒熱重證 (C)衛氣同病 (D)陽明經證

76 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)銀翹散 (B)白虎湯 (C)清胃解毒湯 (D)銀翹白虎湯

77 依《醫宗金鑑》，小兒外感寒邪，脈浮發熱，惡風惡寒，頭疼身痛無汗，此表熱也，治以下列何方最適宜？
(A)麻黃湯 (B)十神湯 (C)杏蘇飲 (D)天水散

78 承上題，兼內熱者，治以下列何方最適宜？
(A)三一承氣湯 (B)調胃承氣湯 (C)涼膈散 (D)雙解通聖湯

79 依《醫宗金鑑．痘疹心法》麻疹見形證治，因熱毒而產生麻疹無法出透稱為熱閉，治以下列何方最適宜？
(A)黃連解毒湯 (B)三黃石膏湯 (C)麻杏石甘湯 (D)柴葛解肌湯

80 下列何者為發燒時，免疫系統細胞所分泌的內源性發熱質（endogenous pyrogens）？①白血球介質-1（interleukin-1） ②白血球介質-2（interleukin-2） ③白血球介質-5（interleukin-5） ④白血球介質-6（interleukin-6）
(A)①② (B)③④ (C)①④ (D)②③