103年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、103年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：中醫師㈡、中醫師
科　　目：中醫臨床醫學㈡（包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學）
考試時間：1小時30分　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 關於肺癆的敘述，下列何者錯誤？
(A)症見咳嗽，潮熱，盜汗，身體逐漸消瘦　(B)是具有傳染性的慢性肺部虛勞疾患
(C)臨床上以肝腎虧損為多見　(D)治療當以補虛培元，治癆殺蟲為原則

2 關於肺癰的敘述，下列何者錯誤？
(A)其證候與西方醫學所稱「肺膿瘍」、「化膿性肺炎」相似
(B)症見形體多虛，咳唾涎沫
(C)病程可分初期，成癰期，潰膿期，恢復期等
(D)治療以祛邪為原則，膿未成可著重清肺消癰，膿已成需排膿解毒

3 22歲女性患者有氣喘病史，1週前開始有咳嗽情況，痰色白稀薄呈現泡沫樣，半夜呼吸時會有哮鳴聲，常覺畏寒，舌苔白，脈浮緊。依中醫治法，下列何者最適宜？
(A)溫肺散寒　(B)宣肺化痰　(C)補肺益腎　(D)瀉肺斂飲

4 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)定喘湯　(B)三子養親湯　(C)小青龍湯　(D)蘇子降氣湯

5 下列有關支氣管哮喘的轉歸敘述，何者錯誤？
(A)冷哮日久或治療中長期過用溫燥，在裏之寒痰濕痰亦有化燥化火的可能
(B)熱哮是冷哮的進一步發展，故熱哮病情較為嚴重
(C)無論冷哮、熱哮，哮喘屢癒屢發，都會使人體正氣日耗，由實證漸次向虛證方向轉化
(D)哮病如反覆發作，見周身悉腫，胸凸背馱，發作時冷汗如油，面色青紫，四肢厥冷，脈按之如游絲者，預後不良

6 下列對心絞痛的敘述何者錯誤？
(A)臨床特徵為當胸悶痛，甚則胸痛徹背，短氣，喘息，不得安臥
(B)其病位在心，但與脾腎有關
(C)病機總屬本虛標實
(D)急性期之治療原則，先從扶正入手，再予祛邪

7 炙甘草湯多用於治療下列何種證型之心律不整？
(A)陰虛火旺　(B)氣陰兩虛　(C)心陽不足　(D)心血瘀阻

8 某60歲男性患者，平時喜食肥肉，體胖，就診時胸悶如窒而痛，氣短痰多，氣促而喘，舌苔濁膩，脈滑。此為下列何證？
(A)陰寒內結　(B)痰濁閉阻　(C)氣陰兩虛　(D)氣虛血瘀

9 承上題，治以下列何方最宜？
(A)桃紅四物湯　(B)生脈散　(C)栝蔞薤白半夏湯　(D)栝蔞薤白白酒湯

10 嘔吐物的性質常反映病變的寒熱虛實及病變臟腑，下列敘述何者錯誤？
(A)嘔吐物酸腐難聞，多為食積內腐
(B)吐酸水綠水，多為肝氣犯胃
(C)吐清水痰涎併頭眩心悸，多為痰飲內阻
(D)時作乾嘔或黏沫量少，多屬脾胃陽虛

11 關於泄瀉及痢疾兩證的敘述，下列何者錯誤？
(A)兩者多發於夏秋季節
(B)兩者病變均在腸胃，皆由外感時邪，內傷飲食而發病
(C)兩者治法皆以止瀉為先
(D)如以症狀嚴重度來區別，泄瀉較輕，痢疾較重

12 患者少腹疼痛嚴重，痛如針刺，痛處不移，舌紫暗，脈細澀，則下列處方何者最宜？
(A)當歸芍藥散
(B)少腹逐瘀湯
(C)金鈴子散
(D)溫經湯

13 有關「胃痛」的敘述，下列何者錯誤？
(A)虛證多為久病，痛勢綿綿，喜按，食後痛甚，痛有定處
(B)在氣者多是新病，以脹痛為主，疼痛不定
(C)拘急而痛，得溫痛減，遇寒痛劇，苔白，脈弦緊，為寒邪
(D)在血者，以刺痛為主，夜間加重

14 32 歲產後婦人，作完月子後面色仍萎黃，身倦懶言，食少納呆，脘腹不舒，坐臥則較舒，噯氣不舒，食後加重。診其舌淡苔白，脈緩弱。治以下列何方最適當？
(A)保和丸
(B)平胃散
(C)補中益氣湯
(D)四物湯

15 45 歲女性患者經西醫胃鏡診斷有消化性潰瘍，因服西藥仍不癒，尋求中醫治療。症見胃脘部隱隱作痛，易吐涎，得食則減，身倦乏力，喜溫飲，舌淡，脈弱。治以下列何方最適當？
(A)保和丸
(B)黃耆建中湯
(C)參苓白朮湯
(D)金鈴子散

16 下列有關鼓脹之敘述，何者錯誤？
(A)鼓脹的病理演變過程，與肺、脾、腎三臟密切相關
(B)鼓脹雖可由積證引起，但並非所有鼓脹皆由積證引起
(C)腹大但脹滿不甚，朝寬暮急，為脾腎陽虛證
(D)腹大脹滿不舒，多形瘦面黧，為肝腎陰虛證

17 膽結石症，若起病急劇，右上腹劇痛，噁心嘔吐，不思食，高熱惡寒，身面目皆黃，右上腹拒按，小便黃濁短少，大便灰白，舌紅苔黃膩，脈弦滑數者，治以下列何方最宜？
(A)膈下逐瘀湯
(B)甘露消毒丹
(C)茵陳蒿湯
(D)茵陳五苓散

18 西醫學中的慢性腎衰竭、尿毒症，與下列中醫的何種病證最為相近？
(A)關格
(B)尿濁
(C)遺尿
(D)淋證

19 某一慢性水腫病人，其驗尿結果如下：蛋白質 300 毫克，白血球 9-10/hpf，紅血球柱 3+，病人有高血壓，其驗血報告，血液尿素氮（Blood urea nitrogen, BUN）：33 mg/dl，肌酐酸（Creatinine, Cr.）：2.5 mg/dl，若見下肢水腫，納差，腹痞悶，腰痠乏力，脈弱、尺微。此乃下列何臟損傷所致？
(A)心腎
(B)肺腎
(C)肝腎
(D)脾腎

20 下列有關腎生理病理的敘述，何者錯誤？
(A)老人呼多吸少，造成吸氣性呼吸困難，此與「腎不納氣」有關
(B)腎上腺之功能與命門之說可能有關
(C)水腫因腎虛引起者，和腎主藏精失常最有關
(D)腎不藏精，會影響骨髓的長養，甚至造成牙齒鬆動早脫

21 50 歲女性患者因排尿困難且澀，而常常有餘瀝致膀胱常滿小便，其病症屬下列何者？
(A)石淋 (B)氣淋 (C)膏淋 (D)勞淋

22 某慢性腎盂腎炎患者，症型為脾腎兩虛，餘濕未清，其主症尿路刺激感，面腳浮腫，納呆腹脹，大便不實，神疲乏力。治以下列何方最宜？
(A)六味地黃丸 (B)豬苓湯 (C)實脾飲 (D)清心蓮子飲

23 患者因患陽痿求診，自陳因業務繁忙，經常工作逾時，飲食不規律，也常陪同客戶至聲色場所，診察見病人外陰部大致正常，但陰囊潮濕，平素小便短赤，小便後餘瀝臊氣，舌紅，苔黃，脈沉滑。下列那一個處方最為合適？
(A)《醫宗金鑑》知柏地黃丸 (B)《證治準繩》五子愆宗丸
(C)《和劑局方》龍膽瀉肝湯 (D)《景岳全書》大補元煎

24 臨床治療痹證的基本治則，除風寒濕熱之餘，若配合相關配套模式，則能發揮更好的療效，並可避免副作用，下列相關敘述何者錯誤？
(A)行痹宜配合補氣 (B)痛痹宜配合溫陽 (C)著痹宜配合健脾 (D)熱痹宜注意養陰

25 某 40 歲女性乾癬（Psoriasis）患者，症見皮損多發於關節屈側和皮膚皺折處，皮損色紅濕爛，低熱，關節紅腫，灼熱疼痛，身倦乏力，納呆，下肢痠脹沉重，陰雨天症狀加重，舌質紅，苔黃膩，脈沉滑數，則下列診斷何者最可能？
(A)風熱血燥 (B)氣陰兩虛 (C)熱毒熾盛 (D)濕熱蘊結

26 承上題，以下列何方治療最適當？
(A)黃連解毒湯 (B)三妙散 (C)生脈散 (D)當歸飲子

27 一位 40 歲業務員，長期吸菸，早晨起床會打噴嚏、流鼻水，自中秋節後反覆咳嗽已三個月，求助於診所使用中西藥月餘皆未改善，來到醫學中心中醫部門，下列何者為暫時不必要之檢驗？
(A)照胸部 X-ray，排除肺癌之可能
(B)抽血檢驗常見之過敏原，衛教病人避開過敏原
(C)抽血檢驗 CD4/CD8、HIV 病毒，排除愛滋病感染造成之免疫低下
(D)轉診至胸腔科安排肺功能檢測，進一步分析氣喘或其它呼吸系統疾病之可能

28 承上題，此患者之咯痰黏濁稠厚，排吐不利，或黃或白，煩悶不安，汗出，面赤，口苦，口渴喜飲，不惡寒，舌質紅，苔黃膩，脈滑數，下列何方加減最適宜？
(A)三拗湯 (B)定喘湯 (C)龍膽瀉肝湯 (D)清心蓮子飲

29 45 歲女性患者近來發現皮膚出現不明的紫癜，並伴隨有口乾、牙齦出血、便秘、便血、血尿等情形。診其舌質紅，苔黃，脈弦數，則該患者之診斷為下列何者最適當？
(A)肺胃陰虛 (B)陰虛火旺 (C)血熱妄行 (D)脾不統血

30 承上題，治療以下列何者加減為最適當？
(A)歸脾湯 (B)地榆散 (C)茜根散 (D)犀角地黃湯

31 下列關於尿崩症的敘述，何者錯誤？
(A)是下視丘分泌的抗利尿激素缺乏所引起的疾病
(B)在中醫學與「消渴」有關
(C)多尿，腰痠，尺脈弱者，可用六味地黃丸加減
(D)多尿之病理機轉和糖尿病相同

32 某 48 歲形體消瘦男性患者，症見口渴，善飢，溲數，便秘，望其舌苔黃燥，診其脈滑實有力。下列診斷證型何者最宜？
(A)胃火消中 (B)腎虛火亢 (C)燥熱傷肺 (D)脾胃氣虛

33 承上題，治以下列何方最宜？
(A)白朮散 (B)知柏八味丸 (C)白虎湯 (D)清燥救肺湯

34 「消渴」臨床上又分上、中、下三消。下列關於下消的敘述，那些是正確的？①病位在腎 ②女子病位在肝 ③以小便頻而量多為主要症狀 ④以尿渾濁如膏脂，或具甜味為主要症狀
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④

35 癭病的主要病機，下列何者最少見？
(A)火熱傷陰 (B)氣鬱化火 (C)痰氣壅結 (D)脾虛生痰

36 關於癭病的預防及護理，下列敘述那些是正確的？①水土因素是癭病的主要病因之一，因此，在容易發生癭病的地區可採用食鹽加碘法來作大規模的預防 ②預防癭病應保持精神愉快，防止情志內傷 ③癭病患者應避免肥膩、香燥、辛辣之品
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③

37 76 歲男性患者，一年前梗塞性中風後引起左側肢體偏廢不仁，患側筋骨痿軟，左足無法背伸，左下肢肌力：1-2 分，上肢：2-3 分，腰膝酸軟，伴見眩暈耳鳴、言語蹇澀，舌質淡紅苔少，脈細稍數，治以下列何方最為適宜？
(A)解語丹 (B)地黃飲子 (C)補陽還五湯 (D)鎮肝熄風湯

38 下列有關治療頭痛引經藥之敘述，何者錯誤？
(A)太陽經頭痛宜藁本、獨活 (B)陽明經頭痛宜白芷、葛根
(C)少陽經頭痛宜柴胡、川芎 (D)厥陰經頭痛宜吳茱萸

39 35 歲男性患者，由家人陪同前來就診，主訴患躁鬱症已 10 年餘，並代述 1 年來已漸少發狂，並有多言善驚，時而煩躁等症。視其精神不佳，形瘦面紅，舌質紅，脈細數，下列何者是最適合的診斷？
(A)痰氣鬱結 (B)心脾兩虛 (C)痰火上擾 (D)火盛傷陰

40 承上題，最適合以下列何方治之？
(A)順氣導痰湯 (B)歸脾湯 (C)生鐵落飲 (D)二陰煎

41 25 歲女性患者，主訴失眠近半年，其症狀有多夢易醒，心悸健忘，頭暈目眩，肢倦神疲，飲食無味，面色少華，舌淡苔薄，脈細弱，下列何者是最適合的診斷？
(A)肝鬱化火 (B)陰虛火旺 (C)心脾兩虛 (D)心膽氣虛

42 承上題，最適合以下列何方治之？
(A)龍膽瀉肝湯 (B)黃連阿膠湯 (C)安神定志丸 (D)歸脾湯

43 耳聾有分虛實，有關虛聾的辨證，下列敘述何者錯誤？
(A)耳聾兼見目眩善恐者，屬肝虛
(B)耳聾兼見心神恍惚驚悸煩躁者，屬心虛
(C)耳聾兼見少氣嗌乾者，屬脾虛
(D)耳聾兼見面頰黧黑者，屬精脫

44 52 歲男性患者，平時好飲咖啡，且喜食精緻甜點。近日發現右上腹部悶痛刺痛皆有，痛都在同一個位置上，感覺有脅肋部位青筋浮現。就診後醫師處方是復元活血湯加三稜、莪朮、地鱉蟲治療。請問醫師的用意為何？
(A)活血補血，理氣止痛，泄熱通便
(B)活血止血，清熱利濕，利膽排石
(C)活血化瘀，理氣止痛，清熱滋陰
(D)活血祛瘀，通經活絡，消堅破瘀

45 鼻咽癌患者經放射線治療，若出現咽喉腫痛，色鮮紅屬於熱毒甚者，治以下列何藥最宜？
(A)丹皮、赤芍、玄參
(B)牛蒡子、射干、山豆根
(C)蘆根、天花粉、桔梗
(D)生地、麥冬、玉竹

46 扶正培本中藥治療惡性腫瘤的作用機理，下列敘述何項錯誤？
(A)提高淋巴細胞增殖及網狀內皮系統活力
(B)調整癌症患者機體環核苷酸系統 cAMP/cGMP 比值，有利於抑制癌細胞的生長
(C)減輕放化療副作用，增強放化療的效果
(D)改善骨髓造血功能，但無保護作用

47 依近代學者研究，當歸龍薈丸能治療慢性顆粒性白血病，方中主要抗癌成分為下列何者？
(A)當歸
(B)蘆薈
(C)青黛
(D)龍膽草

48 對癌病患者而言，下列何治療法最能減輕放射線或化學治療副作用，並可保護脾胃，以增加機體免疫能力？
(A)清熱解毒法
(B)活血化瘀法
(C)扶正培本法
(D)軟堅散結法

49 有關濕邪引起的婦產科疾患，下列敘述何項錯誤？
(A)濕與脾的關係較為密切
(B)濕是有形之邪，屬陽，其性重濁濡滯，困阻氣機
(C)濕熱蘊鬱日久，浸淫組織致成潰腐膿血，則為濕毒
(D)可致白帶增多，或經前泄瀉、經行前後浮腫

50 32 歲吳小姐，已婚，最近因經濟不景氣，工作壓力大，一向月經規則的她，這次月經距上次月經已經 2 個月沒來。最宜優先給予下列何項處置？
(A)考慮壓力大以致月經沒來，建議調暢情緒即可
(B)考慮可能腦部長腫瘤，給予電腦斷層掃描檢查
(C)考慮可能懷孕，先驗孕
(D)考慮月經後期，給予《醫宗金鑑》過期飲加減治療

51 《證治準繩》之先期湯，最宜用來治療下列何種病證？
(A)「月經過多」之血熱證
(B)「月經過少」之血虛證
(C)「月經先後不定期」之肝鬱證
(D)「月經先期」之虛熱證

52 對於痛經，根據其疼痛性質辨證，下列敘述何者錯誤？
(A)喜按屬虛，拒按屬實
(B)得熱則痛減屬熱，得寒則痛減屬寒
(C)脹多於痛，多為氣滯
(D)血瘀或濕熱多會持續作痛

53 一高中女學生，每逢經來則胸脅痞悶，腹絞痛而瀉，瀉後痛減。下列何者為正確的診斷？
(A)脾虛肝鬱 (B)腸風瀉泄 (C)脾腎陽虛 (D)濕濁困脾

54 婦人月經由量少色淡而漸至停閉不行，頭暈目眩、心悸、氣短懶言，脈細弱，其辨證歸屬下列何者最宜？
(A)氣滯血瘀 (B)肝腎不足 (C)陰虛血燥 (D)氣血虛弱

55 承上題，最宜以下列何項治療？
(A)血府逐瘀湯 (B)人參養榮湯 (C)歸腎丸加味 (D)加減一陰煎

56 一婦人主訴婚後已多年未孕，經來後期，經行量少色淡，畏寒喜暖，腹痛綿綿喜按，小腹冷痛，腰酸乏力，診其面色㿠白，舌淡、苔薄，脈沉細無力。下列何項辨證診斷正確？
(A)腎陰不足，虛火偏旺 (B)氣火偏盛，熱鬱血分
(C)陽氣不足，陰寒內盛 (D)肝氣鬱滯，氣鬱化火

57 53 歲患者已停經 2 年，時常感覺陰道乾澀灼熱疼痛，伴有少量黃色水樣分泌物，且反覆發作頻尿、小便灼熱感，舌紅少苔，脈細數，以下列何方治療最適宜？
(A)易黃湯 (B)知柏地黃湯 (C)加味逍遙散 (D)龍膽瀉肝湯

58 關於陰痛之辨證，下列何者正確？
(A)陰道抽痛上連少腹及乳房，伴煩躁易怒，為肝經濕熱之證
(B)外陰灼熱腫脹，伴帶下黃黏量多味臭，為下焦濕熱之證
(C)陰道墜痛，伴身倦頭暈，氣短懶言，為氣陰兩虛之證
(D)陰道乾澀灼熱疼痛，伴隨五心煩熱，腰酸耳鳴，為肝經鬱火之證

59 下列敘述正確的有幾項？①妊娠期小腹反覆疼痛稱為「胞阻」 ②妊娠早期最常見的證候為「子病」 ③妊娠後之噁心嗜酸、擇食，常至六個月後才逐漸消失 ④妊娠期之安胎法以調肝腎為主
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

60 一名 32 歲女性，懷孕三次，皆於懷孕八週至十週間流產。平素月經後期，面色萎黃，頭暈心悸，神疲肢軟，脈細弱。有關此病例之描述，最宜下列何方治療？
(A)壽胎丸 (B)白朮散 (C)泰山磐石散 (D)兩地湯

61 患者產後惡露過期不止，淋漓不斷，且量多，其色淡紅質稀。望其面色白，神倦懶言，舌質淡，脈緩弱。下列何組成最宜治療此一病患？
(A)人參、白朮、黃耆、黃連、半夏、陳皮、茯苓、澤瀉、防風、羌活、獨活、柴胡、白芍、甘草、大棗、生薑
(B)生地、熟地、白芍、山藥、續斷、黃芩、阿膠、旱蓮草、烏賊骨、甘草
(C)人參、白朮、黃耆、升麻、陳皮、當歸、柴胡、鹿角膠、艾葉炭、炙甘草
(D)當歸、川芎、桃仁、炮薑、益母草、炒地榆、炙甘草

62 顏小姐產後鬱乳不散，乳房腫塊逐漸增大，硬結明顯，繼而皮膚微紅。高熱、疼痛持續十餘天不減，並有持續搏動性疼痛，最宜下列何方治療？
(A)《外科正宗》托裡消毒散 (B)《醫宗金鑑》龍膽瀉肝湯
(C)《外科正宗》海藻玉壺湯 (D)《金匱要略》瓜蔞薤白半夏湯

63 下列何者是《傅青主女科》生化湯的組成？
(A)當歸、熟地、桃仁、紅花、炙甘草
(B)當歸、川芎、桃仁、炙甘草、黑薑
(C)人參、當歸、熟地、益母草、桃仁、炙甘草
(D)當歸、阿膠、紅花、川芎、桃仁、黑芥穗、乾薑

64 下列各項敘述，何者正確？
(A)《景岳全書》舉元煎的功效是升提腎中元陽
(B)桃仁、炮薑是《傅青主女科》固本止崩湯的部分組成
(C)《和劑局方》人參養榮湯可用治血虛型經來後期量少色淡者
(D)山藥、菟絲子同為《景岳全書》小營煎與歸腎丸的部分組成

65 依《醫宗金鑑．幼科雜病心法要訣》，下列何者為痘疹欲發之候？
(A)若耳梢冷，尻骨冷，四肢發冷者　(B)單指梢發冷者
(C)大便稠黏，穢氣難聞者　(D)小兒無故皺眉曲腰啼叫

66 3 歲大的小兒，4 天前右足小腿被不知名的昆蟲叮咬，癢甚，不時搔抓至破皮流血。昨天起出現高熱，患部皮膚焮赤疼痛，紅腫形如雲片，心煩，唇燥口乾，神昏亂語，舌絳苔黃，雖已用西藥，效仍未顯，家長急欲中藥配合，治以下列何方最適宜？
(A)水牛角、黃連、金銀花、連翹、赤芍、生地、防風、荊芥，牛蒡子
(B)水牛角、豆豉、金銀花、連翹、黃芩、人中黃、板藍根、生地、玄參、紫草，天花粉、石菖蒲
(C)金銀花、當歸、玄參、連翹、黃耆
(D)金銀花、野菊花、蒲公英、紫花地丁、青天葵、白附子

67 依《醫宗金鑑．幼科雜病心法要訣》，小兒有病，貴乎詳審。下列相關敘述何者錯誤？
(A)發熱、無汗，此邪在表　(B)喜熱惡冷屬陽病
(C)晝若煩熱而夜安靜，其病在陽　(D)若夜煩熱而晝安靜，其病在陰

68 依《醫宗金鑑》，小兒濕痰證，屬痰多者，治以下列何者最適宜？
(A)二陳湯　(B)甘桔二陳湯
(C)杏桔二陳湯　(D)枳桔二陳湯加蒼朮、白朮

69 林小妹 4 歲，由其祖父帶來門診，代訴其近一週來，食慾下降，經診察其腹脹，敲之有鼓音，夜臥不安，大便酸臭，手足心熱，偶而抱怨腹痛，其精神尚可，體重未見下降，則林小妹最有可能的病症為何？
(A)厭食　(B)積滯　(C)疳積　(D)疳氣

70 6 歲男童，感外邪二天後，氣喘發作，症見發熱無汗，呼吸氣急，鼻塞或鼻翼煽動，咳嗽聲重，喉有痰聲，舌質淡紅，苔薄白，脈浮微緊，應以下列何方治療最適宜？
(A)三拗湯　(B)華蓋散　(C)定喘湯　(D)麻杏甘石湯

71 林小妹 3 歲，因腹痛 1 天來求診，起因於戲水後，大吃西瓜，證見腹痛陣發，得溫較舒，面色蒼白，痛甚則額冷汗出，唇色紫暗，舌苔白滑，治療以下列何方最適宜？
(A)養臟散　(B)芍藥甘草湯　(C)桃花湯　(D)木香大安丸

72 某年 9 月有兩歲男童求診，主訴持續發熱已數月，每日午後約至攝氏 40 度。無惡風、頭不痛，亦無神昏驚厥。臨症見口乾膚熱，但肢端涼；多飲多尿，但食納差、消瘦倦怠，舌淡苔黃、脈細數無力。下列診斷何者最不可能？

(A)暑溫　(B)暑熱　(C)陽明經熱　(D)夏季熱

73 王姓孩童 6 歲，因感染急性咽喉炎，引發水腫，並有血尿、高血壓症狀，今來院求診，發現其咳嗽，氣急，心悸，胸悶，煩躁，不能平臥，口唇青紫。下列相關敘述何者錯誤？

(A)該孩童極可能罹患急性鏈球菌感染後腎絲球腎炎（Acute poststreptococcal glomerulonephritis）

(B)該孩童的症狀疑似有肺水腫，鬱血性心臟病等急性腎衰竭狀態

(C)證屬水毒內閉

(D)可選用己椒蘿黃丸合參附湯

74 小兒病小便頻數短赤，尿道灼熱疼痛，尿液淋瀝混濁，小腹痛，伴有發熱，煩躁口渴，頭痛，噁心嘔吐，便秘，舌質紅，苔薄膩微黃，脈數有力。綜其症狀，以下列何方治之最宜？

(A)《和劑局方》八正散　(B)《丹溪心法》萆薢分清飲

(C)《醫學心悟》萆薢分清飲　(D)《三因方》玉鑰匙散

75 某 6 歲男童，因尿床困擾多年來求診，症見遺尿，尿量不多，尿味腥臊，尿色較黃，平時性急，夜間磨牙，唇紅苔薄白，脈數有力，則治以下列何方最適宜？

(A)茯苓、澤瀉、阿膠、豬苓、滑石

(B)生地黃、甘草、柴胡、當歸、車前子、木通、澤瀉、梔子、黃芩、龍膽草

(C)益智仁、川萆薢、石菖蒲、烏藥

(D)蓮鬚、黃連、黃柏、益智仁、砂仁、半夏、茯苓、豬苓、炙甘草

76 依《醫宗金鑑》所述，小兒熱病與溫病之主要不同點，下列敘述何者正確？

(A)不惡寒　(B)不汗出　(C)不身重　(D)不口乾

77 某 9 歲男童，症見鼻塞，流清涕，之後高熱煩躁，口渴飲水，食慾不振，腮部漫腫，脹痛、堅硬拒按，咀嚼困難，咽紅腫痛，舌紅苔黃，脈象滑數，隨後併發少腹痛、睪丸腫痛，下列治療方劑何者最適當？

(A)龍膽草、山梔、黃芩、木通、柴胡、當歸、赤芍、延胡索、川楝子、桃仁

(B)銀花、連翹、竹葉、薄荷、牛蒡子、桔梗、甘草、滑石、荊芥

(C)桑葉、菊花、薄荷、牛蒡子、蟬衣、連翹、黃連、紫花地丁、鮮蘆根、全瓜蔞

(D)黃芩、黃連、玄參、連翹、板藍根、殭蠶、夏枯草、蒲公英

78 三歲孩童高熱不退，四肢欠溫，神志昏迷，躁動不安，頸項強直，四肢抽搐，經腦脊髓液檢查發現有白血球升高現象（pleocytosis），呼吸不利，大便秘結，小便短少而黃，舌苔黃糙，質紅絳，脈洪數。則下列診斷何者正確？

(A)驚風　(B)疰夏　(C)疫毒痢　(D)暑溫

79 依《醫宗金鑑》所述，五硬若因風寒凝滯，致陽氣不得宣通者，下列何者錯誤？

(A)重者以小續命湯疏風　(B)輕者以烏藥順氣散調氣

(C)食少氣弱者，以加味六君子湯治之　(D)面青腹硬者，以溫脾湯緩下硬結

80 依據一般幼兒發展里程表，下列何者最正確？

(A)三個月能仰頭至少 45 度　(B)六個月才會爬行

(C)八個月才會伸手拿東西　(D)十二個月會模仿大人聲調