

Aufgaben für Analysis I

Blatt NUMMER

IHRE NAME

Aufgabe 3.1

8)

$h_n = n^k \cdot x^n$, wobei $|x| < 1$

Es soll durch Induktion gezeigt werden, dass $\forall k \in \mathbb{N} : \exists N \in \mathbb{N} : x^n < \frac{1}{n^k}, \forall n < N$.

Induktionsanfang

Sei $n > k$, Sei n so gewählt, dass $(\frac{n}{n+1})^k > x$.

Sei $x^n > \frac{1}{n^k}$.

Es gilt demnach: $x^n = \frac{1}{n^k} + \varepsilon, \varepsilon \in \mathbb{N}$. Für größere n , kann ε beliebig klein gewählt werden, da sowohl x^n , als auch $\frac{1}{n^k}$ gegen 0 konvergieren.

$$x^{kn} = \left(\frac{1}{n^k} + \varepsilon\right)^k \quad (1)$$

$$= \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \frac{1}{n^{2k-i}} \cdot \varepsilon^i \quad (2)$$

$$< \frac{1}{n^{2k}} \quad (3)$$

$$< \frac{1}{n^k \cdot k^k} \quad (4)$$

$$= \frac{1}{(kn)^k} \quad (5)$$

$$(6)$$

Somit gilt $x^{nk} < \frac{1}{n^k}$.

Induktionsschritt

Die Folge $(\frac{n}{n+1})^k$ konvergiert gegen 1.

Somit konvergiert auch die Folge $(\frac{n}{n+1})^k$.

Sei also n so gewählt, dass $(\frac{n}{n+1})^k > x$. Dies ist möglich, da $x < 1$.

Induktionshypothese: Sei $x^n < \frac{1}{n^k}$.

$$x^{n+1} = x \cdot x^n \quad (7)$$

$$< \left(\frac{n}{n+1}\right)^k \cdot x^n \quad (8)$$

$$\stackrel{IH}{<} \left(\frac{n}{n+1}\right)^k \cdot \frac{1}{n^k} \quad (9)$$

$$= \frac{1}{(n+1)^k} \quad (10)$$

Da gilt $x^n < \frac{1}{n^k}$, gilt auch: $x^n \cdot n^{k-1} < \frac{1}{n}, \forall n < N$.

Nach Beispielaufgabe e7 konvergiert $\frac{1}{n}$ gegen 0. Da $h(n) > 0, \forall n \in \mathbb{N}$ konvergiert die Folge nach Satz 4.8 gegen 0.

Aufgabe 3.2

Sei ein $\varepsilon < 0$.

Sei ein n_0 gewählt, sodass $|a - a_{n_0}| < \varepsilon$

Sei ein k gewählt, sodass $\frac{\max\{a_1, \dots, a_{n_0}, n_0 \cdot a + n_0 \cdot \varepsilon \cdot b\}}{kn_0} < \frac{\varepsilon - |a - a_{n_0}|}{2}$

Sei $N > n_0 \cdot k$

$$\left| \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \right| = \left| \frac{a_1 + \dots + a_{n_0}}{n} + \frac{a_{n_0+1} + \dots + a_{2n_0}}{n} \right| \quad (11)$$