

- SERT KABUKLU MEYVELER FİNAL -

7) Cevizde ası zamanı ve ası metodu nedir?

Uygulanacak ası metodu lobuk asıdır. Cevizlerde lobuk asısı diğer meyve ağaçlarından farklı olarak anaçlar potluktan sonra yapılır. Budan Nisan ayının son haftası ile 10 Mayıs tarihleri arasındadır. Ası lalenleri, gözler uyanmadan Mart ayı sonunda olmalıdır.

3) Tarım ilacı ve gübre kullanımı kontrolsüz ve bilinçsizce yapılması
(Hasat sırasında yaşanan sıkıntılar.

Kalite belgelerinin olmaması

Bahçelerde yetişmiş erkek ağaç eksikliği ve erkek fidanların yetişmemesinin çok zor olması

Üreticinin eğitim ve bilgi eksikliği

Damba sulamanın yetersiz olması

İç pazardaki yüksek fiyatlar


Üretim ve son depolama arası arttığın uygun olmayan koşullarda tutulması

4) Ceviz Sulamanın Önemi

Ceviz ağacının iri yapılı ve yoğun dallama gösterdikleri için geniş bir yaprak yüzeyine sahiptir. Bu nedenle terleme ile su kaybı fazla olan cevizlere yeterli suyun sağlanması önemlidir. Susuzluk durumu büyüme ve gelişmeyi durdular.

Ceviz yetiştirilen toprakta mutlaka yeterli nem bulunmalıdır. Bu 1-1.5 aylık dönemde çok önemlidir. Bu dönemde susuzluktan toprakların olumsuz etkisi ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bol sulamalar bile durumu düzeltmez. Su noksanlığı meyvelerde iç çökmesine ve kararmasına neden olur. Sulama şekli: Ceviz bahçelerinde selma, gillendime, karık, dolma ve alttan yağmurlama gibi sulama yöntemleri vardır. Sulamada en önemli husus suyun etkili bir seviyeye ulaşmasına sağlanmasıdır. Haftada 2 kez sulama yapmak gerekebilir.

Ömer KURT
18170031401



- SERT KABUKLU MEYVELER FINAL -

- 2) Bölgeleri sonbahar, yaz ve ilkbahar donları
Yaz sıcakları
Soğuklama süreleri göz önüne alınarak
Bölgelere uygun serit seçimi ile
Koparma baharlar halinde ve
Mutlaka asılı
İsmine doğru
Sertifikalı fi. da birlle yapılmalıdır.


6) En önemli 2 hastalığı

Ceviz Antraknoz = Anadolu topraklarında genel ormanda görülen hastalıkların en basında gelir. En feksiyon siddetli ise ağaç yaprakları kalır. Küçük noktalar veya daha büyük lekeler halinde görülür. Sonbaharda yere düşen yaprakların toplanarak imha edilmesi, enfeksiyon kaynağını büyük ölçüde azaltır. Bordo bulamaç, veya diğer hazır bokur, pre peratlarla ağacın bütün gövde ve dalları yıkanır. Bokurlu ibeler kullanılır.

Ceviz is kurdu = Bu zararlı genelde ilkenizde 2-3 döl verir. Larvaları meyvede zarar yapar. Sonuçta meyveler düşülür. Mücadele için Azinphos methyl 200g/l, EC 200ml/100 lt suya, carbaryl 200ml 100 lt suya veya Phosalone 200ml/100 lt suya karıştırılarak uygulanır.

Ömer KURT

18170031401



- SERT KABUKLU MEYVELER FINAL -

Antep fıstığı seritleri

5) *Tekin Antep fıstığı = Seleksiyonla elde edilen Tekin seridi, meyve kalite değerleri ve verimlilik yönünden diğer seritlerden üstün özellikler göstermiştir. Tekin seriti, İran ve ABD gibi ülkelerin seritleri ile yarışabilecek pozisyonundadır.

Tekin = Verim (ağac/kg)	Periyodisite katsayısı	Yüz Dane Ağırlığı (g)	Atlama Oranı (%)	Randman (%)
4.42	0.153	135.38	36	43

*Ohadi Antep fıstığı = Antep fıstığı seritleri ile kıyaslandığında oldukça genç olgunlaşan bir serit olduğu söylenebilir. Bu antep fıstığı seridinin D kalitesi, Siirt Antep fıstığına göre daha iyi olabilir. Ancak ağac gelişimi düşüktür. Bundan dolayıda düşük verime sahiptir.

*Barak Yıldızı Antep fıstığı = Antep fıstığı seritleri kıyaslandığında en erken olgunlaşan antep fıstığı seridi denilebilir. Yeşil renktedir ve koyu ipe sahiptir. Genel olarak yaz mevsimlerinin daha kısa sürdüğü ve yağla bölgelerinde yetirir.

Kestane Seritleri

*Marrone: En yüksek kaliteli ve daha iri meyvelerdir. Tohum zarı meyveyi bölmez ve tohumun içine girmez.

*Chataigne: Düşük kalitede ve küçük taneli meyvelerdir. Tohum zarı meyveyi bölmez ve tohumun içine girer.

*Mahmutmolla: Ağaçları meyve açısından verimli, orta kuvvet dikine gelişme gösteren meyveleri orta irilikte olup toze ilen soyulur. Homur yapımına uygundur. Eylül sonuna doğru hasat yapılır.

Ömer KURT

18170031401




-SERT KABUKLU MEYVELER FINAL

5) Badem Seritleri

- * Akbadem: Kuvvetli büyüyen ağaçları vardır. Kendi ile uyumayan, erkenci bir el bademi seritidir. İnce kabukludur. ve iri meyveler oluşturmaz.
 - * Gülcan: Orta kuvvette ağaçlar oluşturmaz. Serici bir serit olup, kendisiyle uyumaz, yabancı tozlanma ister. Verimliliği oldukça iyi olup, badem dol konusuna dayanıklıdır.
 - * Hacı Alibey: Orta kuvvetli ağaçlar oluşturmaz. Çok erkenci bir serittir. Kendisiyle uyumaz, Yabancı tozlanma ister. Verimliliği çok iyidir. Periyodisiteye eğilimi yoktur.
- Fındık Seritleri
- * Yuvarkak Fındıklar: Uzunluk, genişlik ve kalınlıkları hemen hemen aynı olan küresel biçim fındıklardır. Genellikle orta irilikte, yüksek kaliteli seritlerdir. Dışının en üstün nitelikli seritidir.
 - * Sivri Fındıklar: Uzunlukları, genişlik ve kalınlıklarından biraz daha fazla olan seritlerdir. Bu cins kırılma esnasında daha fazla zarar verir. Bu nedenle daha çok kabuklu olarak pazarlanır.
 - * Badem Fındıklar: Uzunlukları, kalınlık ve genişliklerinden oldukça fazla olan seritlerdir. Genellikle iri ve gösterişlidirler. Fakat düşük kalitelidir.

Ömer KURT

18170031401



- SERT KABUKLU MEYVELER FINAL -

5) Ceviz Geritleri

* Maras 18: Orijini K.Maras olup seleksiyon yoluyla ıslah edilmiştir. Kalite verim yönünden üstün özelliğe sahiptir. Meyve kalitesi ile dikkat çekmektedir. Eylülün ilk yarısı hasat edilen gerit taze ve sofralık tüketim için uygundur.
Tozlayıcısı = Bilecik, Sütyemez 1, Chandler

* Sütyemez 1: Orijini K.maras olup, seleksiyon yoluyla ıslah edilmiştir. Çok in. olmasyla dikkat çeker. Yapraklanması ortadur. Dışı aksamleri önce aktif olan gerit tozlayıcı ister. Tozlayıcısı = Sebiri, Maras 18, Yalova 4

* Karman 1: Orijini Karman / Karsehir olup, seleksiyon yoluyla ıslah edilmiştir. Kalite ve verim yönünden önemli özelliğe sahiptir. Eylül ayının ikinci yarısı hasat edilir. Meyve is kalitesi ile de dikkat çekicidir.


* Chandler: Orijini ABD olan serinin Türkiye'ye tescilli TCSM tarafından K.Maras Süteş İman Üni. Ziraat Fakültesi adına 6 Nisan 2010 tarihinde kayıt edildi. Melezleme yoluyla elde edilmiştir. Yapraklanması geçtir. Ekim ayı içinde hasat edilir. Mutboka tozlayıcı ister.

* Fernor: Yarı dallarda verim iyidir. Meyveler salkımlarda 1-4 adet olar. Kabuktan ayrılması kolaydır. Tozlayıcısı Fernettedir.

* Fernette: Kuru ve ıyş şekilde tüketilir. Hasat Eylül ayıdır. Ceviz içi randmanı % 50'dir. Meyve ağırlığı ortalama 15 gr.

Ömer KURT

18140031401



- SERT KABUKLU MEYVELER FİNAL -

2) Antepfıstığı ekonomik ömrü uzun bir meyve türüdür. Uygun anas, serit ve tozlayıcılar seçilmelidir. Anas, yörenin iklim ve toprak şartlarına uygun olmalı, seritle iyi uyumalı, meyve yetme yorını derinmeli, verim ve kaliteyi arttırmalıdır. Buttan anası üzerine siirt seridi asılanarak yapılan yetiştiriciliğin diğer anas ve seritlerden üstün olduğu tespit edilmiştir.

Ömer KURT

(8170031401)

