1 Дискретная теория вероятности

Определение. Множетсво элементарных исходов обозначается Ω . Это множество не более чем счётное в дискретной теории вероятности

Определение. Дискретная вероятностная мера (дискретная плотность вероятности) - отображение $p:\Omega\to\mathbb{R}^+;\omega\mapsto$ вероятность исхода ω .

$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$$

Пример. Честная монета

$$\Omega = \{0,1\}$$
 $p(0) = p(1) = \frac{1}{2}$ $p(\varnothing) = 0$ $p(\{0,1\}) = 1$ — достоверное событие

Пример. Нечестная монета (распределение Бернулли)

$$\Omega = \{0, 1\}$$
 $p(0) = p$ $p(1) = q$ $p + q = 1$

Пример. Честная игральная кость

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad p(1) = p(2) = \dots = p(6) = \frac{1}{6}$$

$$Even := \{2, 4, 6\} \quad Big := \{4, 5, 6\}$$

$$P(Even) = \frac{1}{2} \quad P(Big) = \frac{1}{2}$$

$$VeryBig := \{5, 6\} \quad P(VeryBig) = \frac{1}{3}$$

Пример. Честная колода карт

$$\Omega = \{(r,s) \mid r = 1 \dots 13, s = 1 \dots 4\} \quad p((r,s)) = \frac{1}{52}$$

Пример. Честная монета с ребром

$$\Omega = \{0, 1, \bot\}$$
 $p(0) = p(1) = \frac{1}{2}$ $p(\bot) = 0$

Пример. Очень нечестная монета

$$p = 1$$
 $q = 0$

Определение. Событие — множество элементарных исходов

$$A \subset \Omega$$

$$P: 2^{\Omega} \to \mathbb{R}^+ \quad P(A) = \sum_{\omega \in A} : p(\omega)$$

Определение. A и B — **независимые**, если вероятность их пересечения равна произведению их вероятностей:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(Even\cap Big)=P(\{4,6\})=\frac{1}{3}$$

$$P(Even)\cdot P(Big)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}\Rightarrow Even\ \text{ if }Big\ \text{ не независимы}$$

$$P(Even\cap VeryByg)=P(\{6\})=\frac{1}{6}$$

$$P(Even)\cdot P(VeryBig)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{6}\Rightarrow Even\ \text{ if }VeryBig\ \text{ независимы}$$

$$\sphericalangle\Omega_1,p_1,\Omega_2,p_2\quad \Omega:=\Omega_1\times\Omega_2\quad P(\omega)=p_1(\omega_1)p_2(\omega_2)$$

Определение. События $A_1 \dots A_n$ — независимые в совокупности, если

$$\forall I \subset \{1 \dots n\} \quad P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} P(A_i)$$

Определение. События $A_1 \dots A_n$ — независимые попарно, если

$$\forall i, j \in \{1 \dots n\} \quad P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j)$$

Определение. Условная вероятность — вероятность того, что произойдет A, если произошло B:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(Big|Even) = \frac{P(Big \cap Even)}{P(Even)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$$

]A и B — независимые

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A)$$

$$\sphericalangle A_1, A_2, \dots A_k$$
 — разбиение : $igcap_{i=1}^k A_i = \Omega \quad A_i \cap A_j = \varnothing$

M3137y2019

Теорема 1. Формула полной вероятности:

$$P(B) = \sum_{i=1}^{k} P(B|A_i) \cdot P(A_i)$$

Доказательство.

$$P(B) = \sum_{i=1}^{k} P(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^{k} P(B|A_i) \cdot P(A_i)$$

Теорема 2. Формула Байеса:

$$P(A_j|B) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^{k} P(B|A_i)P(A_i)}$$