1 Повторение

1.1 Пространство ассиметричных ПЛФ

Рассмотрим пространство полилинейных форм Ω_0^p и базис $\{{}^{s_1\dots s_p}W\}$.

$$ {}^{s_1\dots s_p}F := p!\,\mathrm{Asym}\{{}^{s_1\dots s_p}W\} $$

$$ \{{}^{s_1\dots s_p}F | 1 \le s_1 < s_2 < \dots < s_p \le n\} - \text{базис} \Rightarrow \dim = C_n^p $$

- $p = 0 \Rightarrow \dim \Lambda^p = 1 \Rightarrow k$
- $p = 1 \Rightarrow \dim \Lambda^p = n \Rightarrow X^*$
- $p = n \Rightarrow \dim \Lambda^p = 1 \Rightarrow$ псевдоскаляр

  Единственный элемент базиса:

$$ {}^{1\dots n}F(x_1 \dots x_p) = p!\,\mathrm{Asym}({}^{1\dots n}W)(x_1 \dots x_n) = p!\frac{1}{p!}\sum_{(s_1\dots s_n)} (-1)^{[s_1\dots s_n]} {}^{s_1\dots s_n}W(x_{s_1}\dots x_{s_n}) = $$

$$ = \sum_{(s_1\dots s_n} (-1)^{[s_1\dots s_n]} \xi^1_{s_1}\xi^2_{s_2}\dots\xi^n_{s_n} \stackrel{\triangle}{=} \det||\xi^i_j|| $$

$\forall V \subset \Lambda^n \quad V = \alpha^{1\dots n}F$

$C_n^{n-p} = C_n^p \Rightarrow \Lambda^{n-p} \simeq \Lambda^p$

1.2 Внешнее произведение ПЛФ

$$ U \in \Lambda^{p_1}, V \in \Lambda^{p_2} \quad U \cdot V \stackrel{?}{\in} \Lambda^p $$

$$ \lhd Z = U \cdot V \notin \Lambda^{p_1+p_2} $$

$$ Z(x_1 \dots x_{p_1} \dots x_{p_1+p_2}) = U(x_1 \dots x_{p_1}) \cdot V(x_{p_1+1} \dots X_{p_1+p_2}) $$

Обычное произведение ПЛФ не замкнуто, но мы хотим сделать алгебру над ПЛФ $\Rightarrow$ создадим **внешнее произведение**.

$$ \in \Lambda^{p_1}, V \in \Lambda^{p_2} \quad U \wedge V := \frac{(p_1+p_2)!}{p_1!p_2!}\,\mathrm{Asym}(U \cdot V) \in \Lambda^{p_1+p_2} $$

Свойства:

1. $p + q > n \Rightarrow U \wedge V = \Theta$, т.к. пространство $\Lambda^{p_1+p_2}$ есть нуль-пространство.

2. $U \wedge V = (-1)^{pq} V \wedge U$

   Доказательство.

$$U \wedge V(x_1 \dots x_{p+q}) = \frac{(p+q)!}{p!q!} \frac{1}{(p+q)!} \sum_{(i_1 \dots i_{p+q})} U(x_{i_1} \dots x_{i_p}) W(x_{i_{[+1}} \dots x_{i_{p+q}}) (-1)^{[i_1 \dots i_{p+q}]} =$$

$$= (-1)^{pq} V \wedge U$$

□

3. $U \wedge (V \wedge W) = (U \wedge V) \wedge W = U \wedge V \wedge W = \frac{(p+q+s)!}{p!q!s!} \operatorname{Asym}(U \cdot V \cdot W)$

   Доказательство.

$$(U \wedge V) \wedge W = \left(\frac{(p+q)!}{p!q!} \operatorname{Asym}(U \cdot V) \right) \wedge W =$$

$$= \frac{(p+q)!}{p!q!} \frac{(p+q+s)!}{(p+q)!s!} \operatorname{Asym}(\operatorname{Asym}(U \cdot V) \cdot W) = \frac{(p+q+s)!}{p!q!s!} \operatorname{Asym}(U \cdot V \cdot W) =$$

$$= U \wedge V \wedge W$$

□

4. $U \wedge (V + W) = U \wedge V + U \wedge W$
5. $(\alpha U) \wedge V = U \wedge (\alpha V) = \alpha (U \wedge V), \quad \alpha \in K$
6. $U \wedge \Theta = \Theta \wedge V = \Theta$
7. $\{f^i\}_{i=1}^n$ — базис X^*. Тогда ${}^{s_1 \dots s_p}F = f^{s_1} \wedge \dots \wedge f^{s_p}$ — базис Λ^p

   Доказательство.

$${}^{s_1 \dots s_p}W = f^{s_1} \cdot \dots \cdot f^{s_p}$$

$${}^{s_1 \dots s_p}F = p! \operatorname{Asym}(f^{s_1} \cdot f^{s_2} \cdot \dots \cdot f^{s_p}) = p! \frac{2!}{2!} \operatorname{Asym}(f^{s_1} \cdot f^{s_2} \cdot \dots \cdot f^{s_p}) =$$

$$= \operatorname{Asym}\left(\frac{p!}{2!} \frac{(1+1)!}{1!1!} \operatorname{Asym}(f^{s_1} \cdot f^{s_2}) \cdot f^{s_3} \dots f^{s_n} \right) =$$

$$= \operatorname{Asym}\left(\frac{p!}{2!} f^{s_1} \wedge f^{s_2} \cdot f^{s_3} \dots f^{s_n} \right) =$$

$$= \frac{p!}{2!} \operatorname{Asym}\left(f^{s_1} \wedge f^{s_2} \cdot f^{s_3} \dots f^{s_n} \right) =$$

$$= \frac{p!}{3!} \operatorname{Asym}\left(f^{s_1} \wedge f^{s_2} \wedge f^{s_3} \cdot \dots f^{s_n} \right) =$$

$$= f^{s_1} \wedge \dots \wedge f^{s_p}$$

□

2 Определители и их свойства

Определение. $\det\{x_1 \dots x_n\} = {}^{1\dots n}F(x_1 \dots x_n) = f^1 \wedge \dots \wedge f^n(x_1 \dots x_n)$

$x_i = \sum\limits_{j_i=1}^{n} \xi_i^{j_i} e_{j_i}$ – разложение $\Rightarrow \det\{x_1 \dots x_n\} = \sum\limits_{(j_1 \dots j_n)} (-1)^{[j_1 \dots j_n]} \xi_1^{j_1} \dots \xi_n^{j_n}$

$$\lhd C = \begin{bmatrix} \xi_1^1 & \xi_2^1 & \dots & x_n^1 \\ \xi_1^2 & \xi_2^2 & \dots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \xi_1^n & \xi_2^n & \dots & x_n^n \end{bmatrix}$$

Свойства:

1. $\det C = \det C^T$

   Доказательство. $\det C = \sum\limits_{(i_1 \dots i_n)} (-1)^{[i_1 \dots i_n]} \xi_1^{i_1} \xi_2^{i_2} \dots \xi_n^{i_n} = \sum\limits_{(j_1 \dots j_n)} (-1)^{[j_1 \dots j_n]} \xi_{j_1}^1 \xi_{j_2}^2 \dots \xi_{j_n}^n =$ $\det C^T$ □

2. $\det\{x_1 \dots x_s \dots x_t \dots x_n\} = -\det\{x_1 \dots x_t \dots x_s \dots x_n\}$
3. $\{x_i\}_{i=1}^n$ – ЛЗ $\Rightarrow \det\{x_1 \dots x_n\} = 0$
4. $\det\{x_1 \dots x_s + \sum\limits_{i=1}^{n} \alpha_i x_i \dots x_n\} = \det\{x_1 \dots x_n\}$
5. $$\det\{x_1 \dots x_k \dots x_n\} = f^1 \wedge f^2 \wedge \dots f^n(x_1 \dots \sum_{m=1}^{n} \xi_k^m e_m \dots x_n) =$$
   $$= \sum_{m=1}^{n} \xi_k^m f^1 \wedge f^2 \wedge \dots \wedge f^n(x_1 \dots e_m \dots x_n) = \sum_{m=1}^{n} \xi_k^m (-1) = \dots$$

   Примечание. $f^1 \cdot f^2 \cdot \dots \cdot f^n(x_1 \dots x_k \dots x_n) = f^1(x_1) f^1(x_2) \dots f^k(x_k) \dots f^n(x_n)$
   $\lhd \operatorname{Asym}(f^1 \cdot f^2 \cdot \dots \cdot f^n(x_1 \dots x_n)) = \frac{1}{n!} \sum\limits_{(s_1 \dots s_n)} (-1)^{[s_1 \dots s_n]} f^1 \cdot \dots f^n(x_{s_1} \dots x_{x_n}) =$
   $= \frac{1}{n!} \sum\limits_{(s_1 \dots s_n)} (-1)^{[s_1 \dots s_n]} f^{s_1} \cdot \dots f^{s_n}(x_1 \dots x_n)$

   Заметим, что если $m \neq k$, то результат 0. Когда $m = k$, остается n вариантов.

$$\dots = \sum_{m=1}^{n} \xi_k^m (-1)^{|m-k|} f^1 \wedge \dots f^{k-1} \wedge f^{k+1} \wedge \dots \wedge f^n(x_1 \dots x_{k-1}, x_{k+1} \dots x_n) =$$

$$\sum_{m=1}^{n} \xi_k^m (-1)^{|m-k|} M_k^m$$

Определение. **Минор** элемента ξ_k^m — $\det M_k^m$ матрицы, полученной из матрицы C вычеркиванием столбца номер K и строки с номером m.

Определение. **Алгебраическим дополнением** элемента ξ_k^m называется число $(-1)^{m+k} M_k^m$

$$\det C = \sum_{k=1}^{n} \xi_k^m A_k^m$$

$$\det C = \sum_{k=1}^{n} \xi_m^k A_m^k$$

Теорема 1. Лапласа

$$\det C = \sum_{k_1 \dots k_s} (-1)^{m_1+k_1+m_2+k_2+\dots+m_s+k_s} = L_{k_1 \dots k_s}^{m_1 \dots m_s} M_{k_1 \dots k_s}^{m_1 \dots m_s}$$

L — минор порядка s, M — доп. минор порядка $n - s$.

Следствие 1.

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ 0 & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

Теорема 2. Критерий линейной зависимости набора векторов

$\{x_i\}_{i=1}^k$ — ЛЗ $\Leftrightarrow \forall V \in \Lambda^k \quad V(x_1 \dots x_k) = 0$

Доказательство. "$\Leftarrow$" очевидно

"$\Rightarrow$" докажем от противного.

$]\{x_i\}_{i=1}^k$ — ЛНЗ : $\forall V \in \Lambda^k \quad V(x_1 \dots x_k) = 0$

$\lhd\{x_1 \dots x_k, y_1 \dots y_{n-k}\}$ — базис X

$]\{f^1 \dots f^n\}$ — базис X^*

$\lhd\{f^j\}_{j=1}^k \quad f^1 \wedge \dots \wedge f^k(x_1 \dots x_k) = \tilde{C} \neq 0 \Rightarrow$ противоречие. $\square$