

## 1.4 Задача Коши

**Теорема 1** (Пeano (существования)).

- $G \subset \mathbb{R}^2$  — область (открытое связное множество)
- $f \in C(G)$
- $(x_0, y_0) \in G$

Тогда на некоторой окрестности  $(a, b) \ni x_0 \exists$  решение задачи Коши.

*Примечание.* Теорема Пeano — более общая, дан частный случай.

**Теорема 2** (Пикара (единственности)).

- $G \subset \mathbb{R}^2$
- $f \in C(G)$
- $\frac{\partial f}{\partial y} \in C(G)$
- $(x_0, y_0) \in G$
- $\varphi_1, \varphi_2$  — решение задачи Коши на  $(a, b)$

Тогда  $\varphi_1 \equiv \varphi_2$  на  $(a, b)$

*Примечание.* Это тоже частный случай теоремы.

*Примечание.* Здесь и далее  $G$  — область.

*Доказательство.* Будет позже. □

**Определение.** Решение  $\varphi$  задачи Коши называется **особым**, если через каждую точку соответствующей интегральной кривой проходит ещё одна интегральная кривая, не совпадающая с данной в любой окрестности этой точки.

*Пример.* В уравнении  $y' = 3\sqrt[3]{y^2}$  решения имеют вид  $y = (x + C)^3$ . Проверим это:

$$y' = 3(x + C)^2 = 3\sqrt[3]{((x + C)^3)^2}$$

$$\triangleleft f(x, y) = 3\sqrt[3]{y^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 3 \cdot \frac{2}{3} \frac{1}{\sqrt[3]{y}} = \frac{2}{\sqrt[3]{y}}$$

$\frac{\partial f}{\partial y}$  непрерывно на  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0)\}$

$y = 0$  — очевидно решение, при этом в каждой точке  $(x, 0)$  это решение пересекается кривой вида  $y = (x + C)^3$ , поэтому это решение — особое.

## 2 Некоторые уравнения, интегрируемые в квадратурах

Интегрируемые в квадратурах  $\Leftrightarrow$  решения представляются в виде элементарных функций.

### 2.1 Неполные уравнения

2.1.1  $y' = f(x)$

$$\Rightarrow y = \int f(x)dx + C$$

2.1.2  $y' = f(y)$

1.  $f(y) \neq 0 \Rightarrow f > 0$  (для  $f < 0$  аналогично)

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} = f(y) & \quad | : f(y) \\ \frac{dy}{f(y)} = dx & \quad y'_x = \frac{1}{x'_y} \\ x'_y = \frac{1}{f(y)} \\ x(y) = \int \frac{dy}{f(y)} + C \end{aligned}$$

2.  $f(y_0) = 0 \Rightarrow y \equiv y_0$  — решение

Далее область поиска интегральных кривых разбивается на подобласти.

$$y' = y$$

(a)  $y > 0$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} = y \\ \frac{1}{y} = x'_y \\ x = \int \frac{dy}{y} + C = \ln |y| + C \\ x(y) = \ln y + C \\ e^x = e^C y = Ay, \quad A > 0 \\ y = Ce^x, \quad C > 0 \end{aligned}$$

(b)  $y < 0$

$$y = Ce^x, \quad C < 0$$

Ответ:  $y = Ce^x, C \in \mathbb{R}$

$$2.2 \quad p_1(x)q_1(y)dx + p_2(x)q_2(y)dy = 0$$

Попробуем поделить на  $q_1(y)p_2(x)$ :

- Если  $q_1(y_0) = 0 \Rightarrow y \equiv y_0$  — решение
- Если  $p_2(x_0) = 0 \Rightarrow x \equiv x_0$  — решение
- Иначе можем поделить, получаем  $X(x)dx + Y(y)dy = 0$  — уравнение с разделенными переменными

**Теорема 3.**

- $X \in C(a, b)$
- $Y \in C(c, d)$
- $(x_0, y_0) \in (a, b) \times (c, d)$  — не особая точка

Тогда

$$\int_{x_0}^x X(s)ds + \int_{y_0}^y Y(s)ds = 0$$

задает интегральную кривую уравнения  $X(x)dx + Y(y)dy = 0$ , проходящую через  $(x_0, y_0)$

*Доказательство.*  $\nabla Y(y_0) \neq 0 \Rightarrow y' = -\frac{X(x)}{Y(y)}$  — непрерывна в некоторой окрестности  $(x_0, y_0) \xrightarrow{\text{T.1.1}} \exists \varphi$  — решение на  $(\alpha, \beta) \ni x_0$

$$\nabla U(x, y) = \int_{x_0}^x X(s)ds + \int_{y_0}^y Y(s)ds$$

$$\begin{aligned} \frac{dU(x, \varphi(x))}{dx} &= X(x) + Y(\varphi(x))\varphi'(x) = \\ &= \frac{X(x)dx + Y(\varphi(x))\varphi'(x)dx}{dx} \equiv 0 \text{ на } (\alpha, \beta) \text{ т.к. } \varphi \text{ — решение} \end{aligned}$$

$\frac{dU(x, \varphi(x))}{dx} \equiv 0 \Rightarrow U(x, \varphi(x)) = C \quad \forall x \in (\alpha, \beta)$ , но  $U(x_0, y_0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow \forall$  решение, проходящее через  $(x_0, y_0)$  удовлетворяет равенству  $U(x, y) = 0$  □

$\begin{cases} \int X(x)dx = \int_{x_0}^x X(s)ds + C_1 \\ \int Y(y)dy = \int_{y_0}^y Y(s)ds + C_2 \end{cases} \Rightarrow \int X(x)dx + \int Y(y)dy = C$  — общий интеграл уравнения  $X(x)dx + Y(y)dy = 0$

Пример.  $x dx + y dy = 0$

$$\begin{aligned}\int x dx + \int y dy &= C \\ \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} &= C \\ x^2 + y^2 &= A, \quad A > 0\end{aligned}$$

## 2.3 Однородное уравнение

**Определение.** Однородное уравнение - уравнение вида  $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ , если  $P$  и  $Q$  однородные одной степени, т.е.:

$$P(tx, ty) = t^\alpha P(x, y) \quad \forall t$$

$$Q(tx, ty) = t^\alpha Q(x, y) \quad \forall t$$

Пример.

- $x^2 + y^2$
- $x^{\frac{3}{2}} + x\sqrt{y}$
- $\frac{x+y}{3\sqrt{xy}}$

Замена  $z = \frac{y}{x}$  сводит к уравнению с разделенными переменными.

## 2.4 Линейное уравнение

**Определение.**

- **Линейное уравнение** — уравнение вида  $y' = p(x)y + q(x)$
- **Линейное однородное уравнение** — линейное уравнение, где  $q \equiv 0$
- **Линейное неоднородное уравнение** — линейное уравнение, где  $q \not\equiv 0$

**Лемма 1.**  $p \in C(a, b) \Rightarrow y = Ce^{\int p(x)dx}$  — общее решение уравнения  $y' = p(x)y$

*Доказательство.*  $dy = p(x)y dx$

1.  $y = 0$  — решение
2.  $y > 0$

$$\int \frac{dy}{y} = \int p(x) dx \Rightarrow y = Ce^{\int p(x) dx}$$

□