



TG • VLDL • REMNANT CHOLESTEROL • BLOOD PRESSURE

## স্বাস্থ্য উন্নয়নের দৈনিক রুটিন ও খাদ্য পরিকল্পনা

১৫ ঘণ্টা ক্যালরিমুক্ত উপবাস • পরিমিত স্বাস্থ্যকর খাবার • নিরাপদ হাঁটা • শ্বাস-প্রশ্বাস • ঘুম ও পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশি খাবারভিত্তিক

বাস্তবসম্মত

পরিমাপযোগ্য

### এই বইয়ের চারটি মূল লক্ষ্য

- 01 BMI ২৩-২৪-এর দিকে ধীরে অগ্রসর হওয়া
- 02 TG, VLDL ও remnant কমানোর সহায়ক অভ্যাস
- 03 রক্তচাপ ও metabolic risk নিয়ন্ত্রণ
- 04 plaque-এর অগ্রগতি ধীর ও স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা



প্রথমে পড়ুন

#### গুরুত্বপূর্ণ ডিসক্লেইমার

এই বইয়ের তথ্য বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের সাধারণ পরামর্শমাত্র; এটি রোগ নির্ণয় বা চিকিৎসা প্রদান করে না। রুটিনের প্রতিটি অংশ অল্প পরিমাণে শুরু করুন। শরীর স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলে ধীরে ধীরে অনুসরণের মাত্রা বাড়ান। শরীরে ব্যথা, মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্ট, অস্বাভাবিক দুর্বলতা বা অন্য কোনো অস্বস্তি হলে সঙ্গে সঙ্গে থামুন, বিশ্রাম নিন এবং প্রয়োজনে যোগ্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

• এটি চিকিৎসকের বিকল্প নয়।

• নিজেকে জানুন—**Know Yourself / Know Thyself.**

• শরীরের সংকেতকে সম্মান করুন; জোর করে নয়, ধীরে এগোন।

## লক্ষ্য, নীতি ও নিরাপদ শুরু

সংখ্যা শুধু নির্দেশক—চূড়ান্ত লক্ষ্য ব্যক্তিভেদে চিকিৎসক নির্ধারণ করবেন

## 01 ৬-১২ মাসের পরিমাপযোগ্য লক্ষ্য

BMI

২৩-২৪

ঘীরে ও টেকসইভাবে

TG

&lt; ১৫০

mg/dL

HDL

&gt; ৪৫

mg/dL

LDL

ঝুঁকি অনুযায়ী

চিকিৎসকের লক্ষ্য

কোমর

&lt; ৩৬

ইঞ্চি, পুরুষের সাধারণ লক্ষ্য

BP

ব্যক্তিভেদে

চিকিৎসকের লক্ষ্য

## ১ পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ

স্বাস্থ্যকর খাবারও বেশি খেলে ক্যালরি ও TG বাড়তে পারে।

## ২ চিনি কমানো

চিনি, মধু, মিষ্টি পানীয় ও ফলের জুস আপাতত বাদ রাখুন।

## ৩ সঠিক তেল

সরিষা/olive oil অল্প; ghee খুব সীমিত ও দৈনিক নয়।

## ৪ নিয়মিত হাঁটা

দৈনিক ৬০-৯০ মিনিট দিয়ে শুরু; সহনীয় হলে ধীরে বাড়ান।

## ৫ ভালো ঘুম

৭-৮ ঘণ্টা ঘুম ও নিয়মিত সময়সূচি appetite ও BP নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।

## ৬ পর্যবেক্ষণ

লিপিড, BP, BMI ও কোমর একই পদ্ধতিতে নিয়মিত মাপুন।

নিরাপদ অগ্রগতি: সপ্তাহ ১-এ মোট হাঁটা ৬০-৯০ মিনিট; সপ্তাহ ২-৩-এ ৯০-১২০ মিনিট; সম্পূর্ণ স্বস্তি থাকলে ২-৩ ঘণ্টা পর্যন্ত ভাগ করে করা যায়।

## সকালের সময়ভিত্তিক রুটিন

উপবাস ভাঙার আগে পানি, শ্বাস-প্রশ্বাস ও নিরাপদ হাঁটা

৫:৩০



## ঘুম থেকে ওঠা

১-২ গ্লাস পানি পান করুন। লেবু ব্যবহার করলে অল্প; চিনি বা মধু দেবেন না।

৫:৪৫-৬:০০



## শ্বাস-প্রশ্বাস · ১৫ মিনিট

প্রথমে ৬-৩-৯। সম্পূর্ণ স্বস্তি থাকলে ৯-৩-১২। জোর করে দীর্ঘ শ্বাস ধরে রাখবেন না।

৬:০০-৭:০০



## হাঁটা · সেশন ১

দ্বীপ থেকে মাঝারি গতি। ছোট বাক্যে কথা বলতে পারলে intensity সাধারণত সহনীয়।

৭:০০-৯:০০



## উপবাস চলবে

পানি পান করা যাবে। চা/কফি নিলে চিনি, মধু, দুধ বা creamer নয়—সহ্য না হলে বাদ দিন।

৯:০০



## প্রথম খাবার

Plain yogurt + ডিম/ছেলা + শসা + অল্প বাদাম। রুটি চাইলে ১টি ছোট whole-wheat রুটি।

## Fasting ভাঙার সঠিক ক্রম

পানি → শসা/সালাদ → protein → অল্প whole grain। দ্রুত বেশি carbohydrate যাবেন না।

## কখন fasting বন্ধ করবেন

অতিরিক্ত দুর্বলতা, ঘাম, কাঁপুনি, বিভ্রান্তি বা মাথা ঘোরা হলে উপবাস ভেঙে চিকিৎসা পরামর্শ নিন।

## দুপুর থেকে রাতের রুটিন

শেষ খাবার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে; রাতের হাঁটা খাবারের পরে

১০:৩০-১০:৪৫



## ভিটামিন D-এর জন্য রোদ

খোলা আকাশে হাত ও পায়ের কিছু অংশে ৫-১৫ মিনিট রোদ নিন। ত্বক লাল, গরম বা জ্বালা করার আগেই ছায়ায় যান।

১২:৩০



## দুপুরের খাবার

½ প্লেট সবজি/সলাদ + ¼ প্লেট মাছ/ডিম/ডাল + ¼ প্লেট ১-২টি ছোট আটার রুটি।

৩:৩০-৪:৩০



## হাঁটা সেশন ২

৬০ মিনিট। প্রয়োজন হলে ৩০+৩০ মিনিটে ভাগ করুন। পায়ের ব্যথা বাড়লে থামুন।

৫:১৫



## হালকা নাস্তা · শুধু ক্ষুধা থাকলে

শসা, plain yogurt, অল্প সেক্ষ ছেলা অথবা একটি ডিম। বাদাম হলে ছোট portion।

৫:৪৫-৬:০০



## শেষ খাবার ও fasting শুরু

মাছ/ডিম/soybean + সবজি। সন্ধ্যা ৬টার পরে পানি ছাড়া ক্যালরিযুক্ত কিছু নয়।

৭:০০-৮:০০



## হাঁটা সেশন ৩

শেষ খাবারের অন্তত ৩০-৬০ মিনিট পরে ধীর গতিতে। প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা বাধ্যতামূলক নয়।

৯:৩০



## ঘুমের প্রস্তুতি

স্ক্রিন ও আলো কমান, কক্ষ শান্ত রাখুন এবং ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমের সুযোগ রাখুন।

## পরীক্ষা, tracking ও নিরাপত্তা

একই পদ্ধতিতে নিয়মিত মাপলে পরিবর্তন বোঝা সহজ হয়

BMI

মাসে ১ বার

লক্ষ্য ২৩-২৪

কোমর

মাসে ১ বার

নানির সমতলে

BP

৭ দিনের average

সকাল ও সন্ধ্যা

হাঁটা

মিনিট/দিন

ক্রান্তি লিখুন

## ০৭ পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা

| সময়       | যা পরীক্ষা/মাপবেন                                                                               | উদ্দেশ্য                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| শুরুতে     | Fasting lipid profile, non-HDL, glucose/HbA1c, BP, BMI, কোমর; চিকিৎসক প্রয়োজন মনে করলে LFT/TSH | Baseline                |
| ৬-৮ সপ্তাহ | TG, LDL, HDL, non-HDL, BP, BMI                                                                  | প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া   |
| ৩ মাস      | Lipid profile, glucose/HbA1c, BP, BMI; প্রয়োজনমতো অন্যান্য পরীক্ষা                             | কারণ ও নিরাপত্তা যাচাই  |
| ৬ মাস      | সমস্ত ফল চিকিৎসকের সঙ্গে পর্যালোচনা                                                             | পরবর্তী লক্ষ্য নির্ধারণ |

## ০৮ আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

- ডায়াবেটিসের ওষুধ বা insulin ব্যবহার করলে
- কিডনি/লিভার/হৃদরোগ থাকলে
- গর্ভাবস্থা, ঘন ঘন low BP বা অজ্ঞান হওয়ার ইতিহাস
- রক্ত পাতলা করার ওষুধের সঙ্গে বেশি turmeric/ginger supplement নিতে চাইলে

## ! জরুরি লক্ষণ

- বুকব্যথা, চাপ বা শ্বাসকষ্ট
- এক পাশ দুর্বল/অবশ বা কথা জড়িয়ে যাওয়া
- BP বারবার ১৮০/১২০ বা বেশি
- তীব্র মাথাব্যথা, বিভ্রান্তি বা অজ্ঞান হওয়া

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ: ৩ ঘণ্টা হাঁটার চেয়ে নিয়মিত ৬০-৯০ মিনিট হাঁটা, পরিমাণমতো খাবার, BMI ২৩-২৪-এর দিকে অগ্রগতি এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা অধিক টেকসই হতে পারে। কোনো ওষুধ নিজে থেকে বন্ধ বা পরিবর্তন করবেন না।

শুরুর তারিখ: \_\_\_\_\_

পরবর্তী পরীক্ষা: \_\_\_\_\_

চিকিৎসকের নোট: \_\_\_\_\_

# রক্তচাপ, নিরাপত্তা ও জরুরি সংকেত

সঠিকভাবে পরিমাপ করুন, শরীরের সতর্ক সংকেত চিনুন এবং প্রয়োজনমতো দ্রুত সাহায্য নিন

## রক্তচাপ মাপার সঠিক নিয়ম



- মাপার আগে ৫ মিনিট চুপচাপ বসুন।
- পা মেঝেতে, পিঠ সমর্থিত, হাত হৃদযন্ত্রের সমতলে রাখুন।
- সঠিক cuff; ১ মিনিট ব্যবধানে ২টি reading নিন।
- সকাল ও সন্ধ্যায় ৭ দিনের average লিখুন।

হাঁটা থামিয়ে দ্রুত সাহায্য নিন:

বুকব্যথা

অস্বাভাবিক শ্বাসকষ্ট

অজ্ঞান/তীব্র মাথা ঘোরা

হঠাৎ দুর্বলতা

# Protein, dairy, বাদাম ও whole grain

একই দিনে সব খাবার খাওয়ার প্রয়োজন নেই—পরিমাণ ও বৈচিত্র্য গুরুত্বপূর্ণ



**Plain yogurt**  
চিনি ছাড়া ১৫০-২৫০ গ্রাম  
low-fat হলে ভালো



**রুই/কাতলা/অন্যান্য মাছ**  
১০০-২০০ গ্রাম  
ঝোল, grill বা steam



**Egg**  
সাধারণত ১টি/দিন  
সিদ্ধ বা কম তেলে



**Chickpea**  
½-১ কাপ সেদ্ধ  
লবণ ও তেল কম



**Soybean**  
½ কাপ রান্না  
পরিমিত ও কম তেলে



**Almond**  
৫-৭টি  
লবণবিহীন



**Walnut**  
২-৩টি whole kernel  
পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত



**Peanut**  
১৫-২০ গ্রাম  
ভাজা-লবণাক্ত নয়



**Whole-wheat atta**  
১-২টি ছোট রুটি/বেলা  
ঘি/তেল ছাড়া



**Cow meat**  
চবিহীন ৭৫-১০০ গ্রাম  
সপ্তাহে ০-১ বার



**Cucumber**  
প্রতিদিন  
সালাদ বা snack



**সবজি**  
প্রতিদিন ৩-৫ serving  
বিভিন্ন রঙের

একটি সহজ নিয়ম: এক মুঠো বাদাম নয়—ছোট portion

প্রতি main meal-এ protein

সবজি আগে, রুটি পরে

# তেল, মসলা, পানীয় ও সীমাবদ্ধতা

“ভালো তেল” হলেও ক্যালরি বেশি—সব added fat মিলিয়ে পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করুন



**Olive oil**  
সালাদ/হালকা রান্নায়  
১-২ চা-চামচ



**Mustard oil**  
সাধারণ রান্নায়  
১-২ চা-চামচ



**Ghee**  
সর্বোচ্চ ½ চা-চামচ  
প্রতিদিন নয়



**Turmeric**  
রান্নায় স্বাভাবিক  
পরিমাণ  
supplement নিজে থেকে  
নয়



**Ginger**  
রান্না/চায়ে  
স্বাভাবিক পরিমাণ



**Garlic**  
রান্নায়  
অতিরিক্ত কাঁচা নয়



**Onion**  
রান্না/সালাদে  
স্বাভাবিক পরিমাণ



**Lemon**  
পানি বা সালাদে  
চিনি ছাড়া



**Spicy golden milk**  
low-fat milk, চিনি-  
মধু ছাড়া  
fasting-এর বাইরে



**Honey**  
TG বেশি থাকলে  
আপাতত বাদ  
natural হলেও sugar

## কমান বা বাদ দিন

- চিনি, মিষ্টি, soft drink ও packaged juice
- সাদা ভাতের বড় portion, ময়দা, biscuit ও bakery
- Deep-fried খাবার, trans fat ও অতিরিক্ত ghee
- এক বেলায় অনেক বাদাম, তেল বা উচ্চ-ক্যালরি খাবার

# ব্যবহারিক স্বাস্থ্য নির্দেশনা

খাবার, রান্না, নিরাপদ রোদ, শ্বাস ও হাঁটার সহজ প্রয়োগযোগ্য নিয়ম

## ০১ রান্নার ব্যবহারিক নিয়ম

- Olive ও mustard oil মিলিয়ে দৈনিক added oil প্রায় ২-৩ চা-চামচে রাখুন।
- ভাজার বদলে বোলে, সেদ্ধ, grill, steam বা অল্প তেলে air-fry করুন।
- মাছের বোলে অতিরিক্ত তেল ও আলু কমান।
- মোট লবণ দৈনিক প্রায় ৫ গ্রামের কম রাখার চেষ্টা করুন।

## ০২ খাবারের চারটি নিয়ম

- প্রথমে সালাদ/সবজি, এরপর protein, শেষে রুটি বা whole grain।
- ঘীরে ১৫-২০ মিনিটে খাবার শেষ করুন।
- পেট প্রায় ৮০% ভরলে থামুন।
- খাওয়ার পরে সম্ভব হলে ১০-১৫ মিনিট হালকা হাঁটুন।

## ০৩ সুষ্ম খাবারের প্লেট



সুষ্ম প্লেট: ½ সবজি, ¼ প্রোটিন, ¼ পরিমিত শর্করা

## ০৪ ভিটামিন D-এর জন্য নিরাপদ রোদ

### সময়

সকাল ১০:৩০-দুপুর ২টার মধ্যে  
সুবিধাজনক সময়ে

### সময়কাল

সাধারণত ৫-১৫ মিনিট

### কীভাবে

খোলা আকাশে হাত ও পায়ে  
কিছু অংশে সরাসরি রোদ

### সতর্কতা

স্বক লাল, গরম বা জ্বালা করলে  
সঙ্গে সঙ্গে ছায়ায় যান

## ০৫ শ্বাস-প্রশ্বাস - ১৫ মিনিট

### ৬-৩-৯

৬ সেকেন্ড নিন  
৩ সেকেন্ড ধরে রাখুন  
৯ সেকেন্ড ছাড়ুন

### ৯-৩-১২

৯ সেকেন্ড নিন  
৩ সেকেন্ড ধরে রাখুন  
১২ সেকেন্ড ছাড়ুন

মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় বা অস্বস্তি হলে থামুন এবং স্বাভাবিক শ্বাস নিন।

## ০৬ হাঁটার কাঠামো

### সেশন ১

৬০ মিনিট  
সকাল

### সেশন ২

৬০ মিনিট  
বিকাল

### সেশন ৩

৩০-৬০  
মিনিট  
রাতের খাবারের পরে

Talk test: ছোট বাক্য কথা বলতে না পারলে গতি কমান।