

Ponovljeni završni ispit iz Linearne algebre

14. srpnja 2009.

1. [2 boda] Zadana je matrica

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

s elementima iz polja $\mathbb{Z}_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Nađite i ispišite sva netrivialna (različita od 0) rješenja jednadžbe $Ax = 0$ pri čemu je x vektor s komponentama iz \mathbb{Z}_7 .

2. [5 bodova] (a) (1 bod) Definirajte linearni omotač vektora x_1, \dots, x_n .

(b) (3 boda) Neka je $X = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 + \dots + x_n = 0\}$. Pokažite da je X vektorski prostor, odredite neku bazu za njega i izračunajte mu dimenziju.

(c) (1 bod) Nađite neku ortonormiranu bazu za X^\perp (X definiran u (b)) sadržanu u \mathbb{R}^n . (Skalarni produkt na \mathbb{R}^n je standardan).

3. [4 boda] Zadan je linearni operator $A: M_{2,2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^3$ sa

$$A \left(\begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{bmatrix} \right) = (2a_1 + a_2, -6a_1 + 3a_3 + 3a_4, 4a_2 + a_3 + 2a_4).$$

(a) (2 boda) Odredite matricu tog linearnog operatora u paru kanonskih baza od $M_{2,2}(\mathbb{R})$ i \mathbb{R}^3 .

(b) (2 boda) Odredite neku bazu za sliku, te izračunajte defekt tog linearnog operatora.

4. [2 boda] Pokažite da je sa $(A|B) := \text{tr}(B^*A)$ zadan skalarni produkt na prostoru $M_{2,2}(\mathbb{C})$. Izračunajte $(A|B)$ za $A = \begin{bmatrix} i & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ i $B = \begin{bmatrix} 3 & 2i \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$. (Trag matrice se definira kao zbroj njenih dijagonalnih elemenata.)

5. [5 bodova] Zadana je matrica

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -3 & 6 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \end{bmatrix}.$$

(a) (1 bod) Odredite njen spektar.

(b) (1 bod) Za svaku vlastitu vrijednost matrice A odredite pripadni vlastiti potprostor.

(c) (2 boda) Odredite Jordanovu formu matrice A .

(d) (1 bod) Pomoću (c) izračunajte $\sin\left(\frac{\pi}{2}A\right)$.

Okrenite!

6. [**3 boda**] (a) (1 bod) Definirajte ortogonalnu matricu.
 (b) (1 bod) Dokažite da ortogonalna matrica S ima determinantu 1 ili -1 .
 (c) (1 bod) Pokažite da ortogonalna matrica S čuva euklidsku normu, tj. $\|Sx\|_2 = \|x\|_2$ za svaki vektor x .
7. [**5 bodova**] (a) (3 boda) Dokažite da za spektralnu normu vrijedi $\|A\|_2 = \sqrt{r(A^*A)}$, gdje je A kvadratna matrica s kompleksnim koeficijentima.
 (b) (2 boda) Neka je $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$. Rabeći spektralni teorem izračunajte njenu spektralnu normu.
8. [**3 boda**] (a) (2 boda) Opišite Gauss - Seidelovu metodu općenito. Navedite teorem o nužnim i dovoljnim uvjetima za konvergenciju te metode.
 (b) (1 bod) Zadana je matrica

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & -4 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Pokažite da za navedenu matricu Gauss - Seidelova metoda konvergira za svaki $b \in \mathbb{R}^3$.

9. [**6 bodova**] Zadana je matrica

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -4 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}.$$

- (a) (3 boda) Odredite skraćenu singularnu dekompoziciju te matrice.
 (b) (2 boda) Pomoću skraćene singularne dekompozicije matrice A^+ odredite pseudoinverz matrice A .
 (c) (1 bod) Odredite $x \in \mathbb{R}^2$ tako da je za $b = (25, 50, 14)^\top$ vrijednost $\|Ax - b\|_2$ minimalna.
10. [**5 bodova**] Zadan je sustav diferencijalnih jednačji $y'_1 = 4y_1 + y_2 + 1$, $y'_2 = 4y_2 + e^{-4t}$.
 (a) (1 bod) Napišite taj sustav u matičnom obliku.
 (b) (2 boda) Izračunajte e^{At} , gdje je A matrica tog sustava.
 (c) (2 boda) Riješite matični sustav iz (a) uz početni uvjet $y_1(0) = \frac{1}{4}$, $y_2(0) = 0$, te uz pomoć tog rješenja napišite odgovarajuće rješenje sustava.