

Au cours de l'activité musculaire, l'ATP est renouvelé rapidement par la voie de la phosphocréatine.

d


Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 pts)

Exercice 1 (6 pts)

La polykystose rénale est la maladie génétique du rein la plus commune. Elle est caractérisée par le développement progressif de multiples kystes dans les reins, ce qui provoque une insuffisance rénale. Cette maladie est accompagnée par d'autres symptômes comme l'hypertension artérielle, l'apparition du sang dans les urines, la polykystose hépatique ... Afin de déterminer l'origine génétique de cette maladie et son mode de transmission on présente les données suivantes :

• Donnée 1 :

Des études récentes ont montré une relation entre la polykystose rénale et un complexe protéique intégré dans la membrane cytoplasmique des cellules tubulaires du rein. Ce complexe est formé de deux protéines appelées Polycystine 1 (PC1) et Polycystine 2 (PC2). Dans le cas normal le complexe PC1-PC2 permet le passage d'ions calcium (Ca⁺⁺) et la régulation de l'activité d'une voie réactionnelle à l'intérieur des cellules appelée « mTOR ». Toute altération au niveau de ce complexe a un impact sur la croissance et la division cellulaire. Le document 1 montre la relation entre le complexe PC1-PC2 et la multiplication des cellules tubulaires chez une personne saine (figure a) et chez une personne malade (figure b).



1. Comparez les données du document 1 de la personne saine à celles de la personne malade. (1 pt)

· Donnée 2 :

La synthèse de la Polycystine 1 est contrôlée par un gène appelé PKD1. La figure (a) du document 2 montre un fragment du brin transcrit du gène PKD1chez une personne normale et chez une personne atteinte par la polykystose rénale; la figure (b) du même document présente un extrait du tableau du code génétique.

NS32F

الامتمان الوطني المومد للبغالوريا – الحورة العاسية 2018 – الموسوع ﴿ ﴿ عَالَمُ مُا اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ ا - عاسة، علوم المهاة والأرض — هعرة العلوم التجريبية عسلك علوم المهاة والأرض— جيار خريسية

29079 29073 29076 Numéro des triplets: -GCT-GAC-CAC-GAC-GCC-GCC-CCG-Fragment du gène PKD1 chez une personne saine: Fragment du gène PKD1 chez une personne malade: -GCT-GAC-CAC-GCC-GCC-CCG-Sens de lecture Figure (a) CGA GGU CUA GUA UGA CGC GGA CUG GUG UAA Codons CGG GGG UUG GUC UAG GGC UUA GUU CGU Acides aminés Val Arg Gly Leu Stop Figure (b)


2. En utilisant les figures (a) et (b) du document 2, donnez la séquence de l'ARNm et la séquence des acides aminés correspondant aux fragments du gène PKD1 chez la personne saine et la personne malade puis expliquez l'origine génétique de la polykystose rénale. (1.5 pt)

Document 2

. Donnée 3:

Le document 3 présente l'arbre généalogique d'une famille touchée par la polykystose rénale.

- Sachant que cette maladie est liée à un allèle dominant porté par le chromosome 16 :
 - a. Donnez, en justifiant votre réponse, le génotype des individus I₂, II₁ et II₂. (1.5 pt)



b. Déterminez la probabilité pour que le couple II₁ et II₂ donne naissance à un enfant malade, utilisez l'échiquier de croisement. (0.5 pt) (Utilisez les symboles P et \$\phi\$ pour désigner les deux allèles du gêne étudié)

• Donnée 4:

La polykystose rénale touche une personne parmi 1000 individus d'une population donnée. En considérant que cette population obéit à la loi de Hardy-Weinberg :

a. Calculez la fréquence de l'allèle normal et de l'allèle responsable de la maladie.

(1 pt)

b. Calculez la fréquence des personnes hétérozygotes pour le gène étudié.

(0.5 pt)

NB : donnez les résultats avec quatre chiffres après la virgule.

Exercice 2 (3 pts)

Dans le cadre de l'étude de la transmission des caractères héréditaires chez la drosophile, on propose les résultats des croisements suivants :

 Premier croisement: Réalisé entre des drosophiles sauvages aux ailes longues et aux yeux rouges et des drosophiles aux ailes vestigiales et aux yeux bruns. Les individus de la génération F₁ sont tous de phénotype sauvage.


1. Que déduisez-vous à partir des résultats de ce croisement ?

(0.75 pt)

 Deuxième croisement: Réalisé entre des mâles aux ailes vestigiales et aux yeux bruns et des femelles de la génération F₁. Le tableau suivant présente les résultats de la génération F'₂ obtenue:

Phénotypes des drosophiles	ailes longues et	ailes longues et	ailes vestigiales et	ailes vestigiales et
	yeux rouges	yeux bruns	yeux rouges	yeux bruns
Nombre d'individus à la génération F'2	716	296	238	702





+

a. Les deux gènes étudiés sont-ils indépendants ou liés ? Justifiez votre réponse. (0.5 pt)
 b. Donnez, en utilisant l'échiquier de croisement, l'interprétation chromosomique des résultats du deuxième croisement.

Utilisez les symboles suivants : -L et f pour les allèles du gène responsable de la forme des ailes ;
-R et r pour les allèles du gène responsable de la couleur des yeux.


- Troisième croisement: Réalisé entre des femelles double hétérozygotes aux corps clairs et aux yeux rouges et des mâles aux corps noirs et aux yeux bruns. Ce croisement a donné 7.51% d'individus à phénotypes recombinés.
 - a. En vous basant sur les résultats du deuxième et du troisième croisement, réalisez les deux cartes factorielles possibles qui représentent la localisation relative des trois gènes étudiés. (0.5 pt)
 - b. Proposez un croisement qui permet de déterminer la distance entre le gène responsable de la couleur du corps et le gène responsable de la forme des ailes. (0.25 pt)

Utilisez les symboles: N et n pour les allèles du gène responsable de la couleur du corps.

Exercice 3 (3 pts)

La vaccination, qui constitue un enjeu majeur de la santé publique, permet à l'organisme d'acquérir une immunité contre certaines maladies infectieuses. Afin de dégager les mécanismes immunitaires permettant d'expliquer l'effet de la vaccination, on présente les données suivantes:

- Donnée 1: Le document 1
 représente la variation de la
 quantité d'anticorps en fonction
 du temps, après contamination
 par le bacille tétanique, chez une
 personne non vaccinée contre le
 tétanos (figure -a-) et chez une
 autre personne vaccinée contre
 cette maladie (figure -b-).
- Comparez la réaction de
 l'organisme contre le bacille
 tétanique chez la personne
 vaccinée à celle chez la personne
 non vaccinée.
 (1 pt)



 Donnée 2 : Deux lots de souris A et B reçoivent une première in action de globule rouges de mouton (GRM) au jour 0. Après 30 jours, les souris du lot A reçoivent ne seconde injection de GRM, alors que les souris du lot B reçoivent une injection de globules rouges de lapin (GRL). Ces GRM et GRL jouent le rôle d'antigènes pour les souris.

Tous les deux jours on prélève la rate d'une souris de chaque lot pour déterminer le nombre de plasmocytes sécréteurs d'anticorps anti-GRM chez les souris du lot A, ainsi que le nombre de plasmocytes sécréteurs d'anticorps anti-GRL et le nombre de plasmocytes sécréteurs d'anticorps anti-GRM chez les souris du lot B. le document 2 présente les résultats obtenus.

Figure (a)	Souris du lot A	1 ^{ere} injection de GRM		M	2 ^{eme} injection de GRM								
1	Jour de prélèvement de la rate	0	2	4	6	8	30	32	34	36	38	40	42
	Nombre de plasmocytes sécréteurs d'anti-GRM (en milliers)	0	3	15	90	20	1	180	850	500	300	100	70
	Souris du lot B	1ere injection de GRM				injection de GRL							
Figure (b)	Jour de prélèvement de la rate	0	2	4	6	8	30	32	34	36	38	40	42
	Nombre de plasmocytes sécréteurs d'anti-GRL (en milliers)	0	0	0	0	0	0	2	75	95	20	10	3
Document 2	Nombre de plasmocytes sécréteurs d'anti-GRM (en milliers)	0	2	30	92	20	1	1	1	0	0	0	0




NS32F

الامتمان الوطنين المومد للبغالوريا – الدورة العادية 2018 – الموسوع ﴿ ﴿ مُاكَدُ عَلَوْمُ الْمِيَاةُ وَالْأَرْضِ – حَيَارُ خُرَاسِيةً مَسَلَتُ عَلَوْمُ الْمِيَاةُ وَالْأَرْضِ – حَيَارُ خُرَاسِيةً

- Déduisez les deux caractéristiques de la réponse immunitaire mises en évidence à partir des résultats présentés dans le document 2.


 Justifiez votre réponse. (1 pt)
- Donnée 3 : La réponse immunitaire spécifique contre un antigène donné, se déroule au niveau des organes lymphoïdes périphériques. Le document 3 présente les phases de cette réponse immunitaire.
 - 3. En exploitant les données du document 3 expliquez :
 - La réponse immunitaire des souris du lot A (document 2, figure - a-).
 (0.5 pt)
 - b. La réponse immunitaire des souris du lot B (document 2, figure b-). (0.5 pt)



Exercice 4 (3 pts)

La formation d'une chaîne de montagne s'accompagne par le métamorphisme de certaines roches. La composition minéralogique de ces roches donne des informations sur les conditions de leur formation. En effet, ces informations aident à retracer l'histoire géologique de cette chaîne de montagnes.


Le massif d'Agly, Situé dans la partie orientale de la chaîne des Pyrénées, est une unité géologique ancienne, réunissant de nombreuses roches magmatiques et métamorphiques. Le document 1 présente la carte géologique simplifiée de la zone étudiée avec la répartition de certains minéraux index.



+

 A partir des données du document 1, déterminez les changements minéralogiques lorsqu'on passe de la zone Zb à la zone Zd, et lorsqu'on passe de la zone Ze à la zone Zf. (0.5 pt)

Le document 2 présente les domaines de stabilité des minéraux en fonction des conditions de la pression et de la température, avec l'emplacement des points R₁, R₂, R₃ et R₄ qui représentent successivement les conditions dans lesquelles se sont formées les roches prélevées des zones Zb, Zd, Ze et Zf.



- (1) Courbe d'apparition de la biotite
- 2 2 Courbes délimitant les domaines de stabilité de l'andalousite, de la sillimanite et du disthène
- 3 Courbe d'apparition de la cordiérite
- Courbe délimitant le domaine de stabilité de la muscovite et le domaine de stabilité du feldspath potassique
- 5 Courbe de fusion partielle des minéraux
- Les points représentant les conditions de pression et de température dans lesquelles se sont formées les roches R₁, R₂, R₃ et R₄.

2. A partir du document 2, expliquez les changements minéralogiques lorsqu'on passe de la zone Zb (zone de formation de la roche R₁) à la zone Zd (zone de formation de la roche R₂) et lorsqu'on passe de la zone Ze (zone de formation de la roche R₃) à la zone Zf (zone de formation de la roche R₄). (1 pt)

Au cours de la formation d'une chaîne de montagne, différents types de métamorphisme ont lieu selon les conditions de pression et de température. Le document 3 présente ces différents types de métamorphisme.

- 3. a. A partir du document 2, déterminez les valeurs minimales et les valeurs maximales de pression et de température qu'a connue la zone étudiée (lorsqu'on passe de R₁ à R₄). (0.5 pt)
- b. En utilisant le document 3, déduisez le type de métamorphisme subi par les roches de la zone étudiée du massif d'Agly. Justifiez votre réponse.

Profondeur (Km) Pression (GPa) 1,4 50 1 1,2 40 1,0 0,8 0,6 20 0,4 0,2 200 400 600 800 Température Métamorphisme dynamique (°C) Métamorphisme thermodynamique Métamorphisme thermique Document 3

-----§ Fin § -----

(1 pt)