KELAS INTENSIF UTBK PK-PM 2024

Sukses UTBK 2024!!


Materi 2 : Grafik Persamaan Garis Lurus, Parabola, dan Lingkaran

By: @abdan_hafidz

A. Persamaan Garis Lurus

Misalkan kita mempunyai sebuah persamaan linier y = 3x + 1 ini artinya akan ada beragam nilai y karena nilai x yang juga beragam. Hubungan antara nilai y dan x dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik yang Matematis.

Dari persamaan garis y = 3x + 1 kita dapat membuat sebuah hubungan antara x dan y.



Karena selisih perubahan nilai y adalah konstan +3, maka dapat ditemukan jenis grafiknya adalah garis lurus. Visualisasi grafik dapat dilihat pada gambar di atas.

Jika anda ingin menggambar grafik, anda bisa menarik garis lurus dari titik potong terhadap sumbu-x ke titik potong terhadap sumbu-y diteruskan menuju area tak hingga.

Hubungan antara nilai x dan y dapat direpresentasikan dalam bentuk (x,y) di mana bentuk ini kita sebut sebagai titik / point / koordinat / posisi / dsb dalam Matematika.

1. Menentukan persamaan garis lurus dari hubungan dua titik

Tentu sangat mudah jika anda diberikan titik – titik solusi dari sebuah persamaan kemudian anda memvisualisasikannya dalam bentuk grafik. Tapi bagaimana jika informasi yang kita peroleh adalah minimal dua titik – titik yang merupakan area dari grafik suatu persamaan tertentu?

CONTOH 1.1: Suatu garis memotong titik (2,5) dan (1,3) gambarkanlah grafiknya!

Dari informasi di atas kita bisa menerapkan formula, jika suatu garis memotong titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) maka persamaan garisnya adalah :

$$x - x_1 \over x_2 - x_1 = y - y_1 \over y_2 - y_1$$

Untuk menyelesaikan **CONTOH 1.1** di atas kita cukup substitusikan nilai titik pada formula di atas.

$$\frac{x-2}{3-2} = \frac{y-5}{3-5}$$

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y-5}{-2}$$

$$-2(x-2) = y-5$$

$$-2x+4 = y-5$$

$$y = -2x+4+5$$

$$y = -2x+9$$

Diperoleh persamaan garisnya adalah y = -2x + 9

• Titik potong terhadap sumbu-x (y = 0)

$$-2x + 9 = 0$$
$$-2x = -9$$
$$x = \frac{9}{2} = 4.5$$


Titik potongnya adalah (4.5,0)

• Titik potong terhadap sumbu-y (x=0)

$$-2(0) + 9 = y$$
$$y = 9$$

Titik potongnya adalah (0,9)

Sehingga grafiknya adalah:



2. Menentukan persamaan garis jika diketahui gradien (m)

Bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah y = mx + c di mana m adalah gradien / kemiringan garis dan c adalah konstanta. Dari formula sebelumnya

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

Kita dapat tentukan

$$\frac{x-x_1}{\Delta x} = \frac{y-y_1}{\Delta y}$$

Operasikan

$$\frac{y-y_1}{x-x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

(Bisa dibuktikan)

Bahwa

$$\boldsymbol{m} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Sehingga diperoleh

$$\frac{y-y_1}{x-x_1}=m$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

atau

$$y = m(x - x_1) + y_1$$

CONTOH 1.2: Sebuah garis l memotong titik (1,2) dan memiliki kemiringan 2. Gambarkan grafik untuk garis l tersebut!

Dari soal di atas diketahui m=2, $x_1=1$, $y_1=2$. Diperoleh persamaanya adalah :


$$y = m(x - x_1) + y_1$$


$$y = 2(x - 1) + 2$$

$$y = 2x - 2 + 2$$

$$y = 2x$$


Dengan mudah kita mengetahui grafiknya adalah:






Garis Condong ke Kanan

Garis Condong ke Kiri



$$m \; = \; \frac{\Delta y}{\Delta x}$$



$$m = -\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

3. Hubungan antar garis

3.1. Garis saling sejajar (//)

Garis l_1 dan l_2 dikatakan sejajar $(l_1/\!/\,l_2)$ apabila m_1 (Kemiringan garis l_1) dan m_2 (Kemiringan garis l_2) sama

$$m_1 = m_2$$

CONTOH 1.3 : Garis $l_1: 2x + 3y = 1$ dan $l_2: y = (p + 1)x + 3$, diketahui $(l_1 // l_2)$. Tentukan nilai p!

$$l_1: 3y = -2x + 1$$

$$y = -\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$$

$$m_1 = -\frac{2}{3}$$

$$l_2: y = (p+1)x + 3$$

$$m_2 = p + 1$$

Karena sejajar maka $m_1 = m_2$

$$-\frac{2}{3} = p+1$$

$$p = -\frac{2}{3} - 1$$

$$p = -\frac{5}{3}$$


Diperoleh nilai

$$p=-\frac{5}{3}$$

3.2. Garis saling tegak lurus (\perp)

Garis l_1 dan l_2 dikatakan saling tegak lurus $(l_1 \underline{\perp} l_2)$ apabila $m_1.m_2 = -1$

CONTOH 1.4 [PM] : Diketahui dua garis l_1 dan l_2 saling tegak lurus berdasarkan gambar di bawah ini!



Tentukan apakah masing – masing dari pernyataan di bawah ini benar / salah!

1)
$$\frac{1}{m_1} = m_2$$

1)
$$\frac{1}{m_1} = m_2$$

2) $\frac{1}{m_1} = \frac{1}{m_2}$
3) $2m_1 > \frac{1}{m_2}$

3)
$$2m_1 > \frac{1}{m_2}$$

Dari gambar diketahui bahwa l_1 memiliki persamaan $m_1(-)$ karena condong ke kiri dan $m_2(+)$ karena condong ke kanan. Maka $m_1 \cdot m_2 = -1$.

$$m_2 = \frac{-1}{m_1}$$

Untuk $m_1 < 0$, karena itu m_2 selalu positif.

Dari penyelesaian di atas diperoleh bahwa 1 benar, dan 2 salah

3)
$$2m_1 > \frac{1}{m_2} \to 2m_1 > \frac{1}{\frac{1}{m_1}}$$

$$2m_1 > -m_1$$

HATI – HATI : Karena $m_1 < 0$ pernyataan di atas salah !

3.3. Garis berpotongan

Dua garis l_1 dan l_2 saling berpotongan, maka keduanya berpotongan pada saat l_1 dan

CONTOH 1.5: Garis l_1 : y = 3x + 2 dan l_2 : y = 4x + 1 berpotongan pada titik?


Karena l_1 dan l_2 saling berpotongan maka

$$3x + 2 = 4x + 1$$
$$4x - 3x = 2 - 1$$
$$x = 1$$

Substitusikan ke salah satu persamaan y = 3.1 + 2 = 5. Diperoleh titik potong pada (1,5).

B. Grafik Parabola

Bentuk persamaan kuadrat pada umumnya adalah $y = ax^2 + bx + c$ Visualisasi dari grafik persamaan kuadrat pada umumnya adalah parabola.



Sifat umum solusi persamaan kuadrat


Misalkan suatu persamaan kuadrat y = (x - p)(x - q) maka penyelesainnya adalah x = p atau x = q.

Jika dijabarkan akan menjadi

$$y = x^2 - qx - px + pq$$

$$y = x^2 - (p+q)x + pq$$

Sehingga dari persamaan di atas dapat kita peroleh misalkan suatu persamaan kuadrat memiliki penyelesaian p dan q maka $p+q=-\frac{b}{a}$ dan $pq=\frac{c}{a}$. Di bagi dengan a karena persamaan di atas memiliki nilai a=1. Nilai a bisa saja berubah dan akan menjadi penentu model grafik.



Di mana D adalah diskriminan untuk $D = b^2 - 4ac$

Menggambar grafik parabola



Misalkan persamaan kuadrat $y = ax^2 + bx + c$ untuk memodelkan grafiknya

- 1) Jika $D \ge 0$ tentukan titik potong terhadap sumbu-x dengan menyelesaikan persamaan Misalkan penyelesainnya adalah x = p atau x = q, maka titik potong terhadap sumbu-x adalah (p, 0) dan (q, 0).
 - Jika D < 0 anda bisa langsung ke langkah berikutnya
- 2) Tentukan titik puncak yaitu $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$ Kemudian tarik garis melengkung dari titik puncak memotong titik (p, 0) dan (q, 0) [Jika ada] menuju area tak hingga.

CONTOH 2.1 : Gambarkan grafik fungsi $y = x^2 - 3x + 2$

$$y = x^{2} - 3x + 2$$

$$(x - 1)(x - 2) = 0$$

$$x = 1 \text{ atau } x = 2$$

$$a = 1$$

$$b = -3$$

$$c = 2$$

$$D = b^{2} - 4ac$$

$$D = 9 - 4.1.2 = 1$$

- Titik potong terhadap sumbu-x adalah (1,0) dan (2,0)
- Titik puncak adalah $\left(-\frac{-3}{2}, -\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{4}\right) = (1.5, -0.25)$. Karena a > 0 maka kurva terbuka ke-atas.

<u>Hubungan Garis dan Kurva Parabola dibahas di pert – berikutnya setelah materi</u> Kalkulus (Limit, Turunan, Integral) Ya!!! Hubungan mereka baik – baik aja kok

C. Grafik Persamaan Lingkaran

Persamaan lingkaran dengan pusat (a, b) dan jari – jari r adalah :

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

Dalam Matematika umum kita pasti sudah mengerti bahwa:

-2

- Jari jari (r) = jarak dari titik pusat ke salah satu titik pada sisi lingkaran
- Diameter = 2 x jari jari


Sehingga dari pengetahuan dasar di atas kita dapat dengan mudah **menggambarkan grafik** persamaan lingkaran dengan membuat sebuah lingkaran berpusat pada (a,b) dan buat jari – jari yang mudah dengan cara menghubungkan titik pusat ke suatu titik (a+r,b)

CONTOH 3.1 : Gambarkan grafik persamaan lingkaran dengan pusat (1,2) dan jari – jari sebesar 2 satuan!

PENYELESAIAN : Dari soal di peroleh bahwa a=1,b=2 dan r=2 Berarti persamaan lingkarannya adalah $(x-1)^2+(y-2)^2=2^2$

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 4$$

Berarti lingkaran pusatnya pada (1,2) dan jari – jari kita tarik dari (1,2) ke (1+2,2), (1,2) ke (3,2).



Persamaan umum lingkaran di atas bisa dirubah ke bentuk lain yang sering muncul pada soal.

Di mana jika kita jabarkan

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

Bisa menjadi bentuk

$$x^{2} + y^{2} + Ax + By + C = 0$$

 $a = \frac{A}{-2}$, $b = \frac{B}{-2}$
 $r^{2} = a^{2} + b^{2} - c$

Semisal diberi persamaan lingkaran dalam bentuk di atas

CONTOH 3.2 : Persamaan lingkaran $x^2 - 2x + y^2 - 4y + 1 = 0$ berpusat pada titik dan memiliki jari – jari sebesar? $x^2 - 2x + y^2 - 4y + 1 = 0$

$$x^2 - 2x + y^2 - 4y + 1 = 0$$

$$A = -2, B = -4, C = 1$$

$$a = \frac{A}{-2}$$

$$a = \frac{-2}{-2} = 1$$

$$b = \frac{-4}{-2} = 2$$

$$r^{2} = 1 + 4 - 1 = 4 \rightarrow r = 2$$

Sehingga pusat lingkaran di atas adalah (1,2) dan jari – jari r=2 . Persamaan di atas jika dirubah ke bentuk lain adalah:

$$(x-1)^2 + (x-2)^2 = 4$$

HUBUNGAN GARIS DAN LINGKARAN ITU MATEMATIKA SAINTEK YA GUYS

LATIHAN SOAL PK

- 1. Dua buah garis $l_1: y = \frac{k}{3} + 4$ dan $l_2: y = 2k^2x + 2$ memiliki kedudukan saling sejajar. Nilai k untuk k > 0 sama dengan ...
 - a.
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 6
 - e. $\frac{1}{6}$

Pembahasan:

$$m_1 = \frac{k}{3}$$
, $m_2 = 2k^2$

Karena sejajar maka $m_1 = m_2$

$$\frac{k}{3} = 2k^2$$

$$6k^2 = k$$

$$6k = 1$$

$$k = \frac{1}{6}$$

- 2. Garis l_1 memotong titik (3,2) dan (-1,3). Jika garis l_1 berkedudukan tegak lurus dengan garis l_2 : $y = \frac{1}{p}x + 4$ maka nilai p adalah ...
 - a. $\frac{1}{4}$ b. 2

 - c. $\frac{2}{3}$ d. $\frac{3}{2}$
 - e. 1

Pembahasan:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

$$\frac{x-3}{-1-3} = \frac{y-(-1)}{3-2}$$

$$\frac{x-3}{-4} = y+1$$

$$x + 4y = -4 + 3$$

$$l_1: y = -\frac{1}{4}x - \frac{1}{4}$$

Karena l_1 tegak lurus dengan l_2 , maka $m_1 \cdot m_2 = -1$

$$m_2 = \frac{1}{p}$$

$$-\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{p} = -1$$
$$-\frac{1}{4p} = -1$$
$$1 = 4p$$

$$p = \frac{1}{4}$$

3. Sebuah garis memotong titik (2,-5) memiliki kemiringan 5 tentukan apakah pernyataan di bawah ini benar / salah !

ouvan in cenar / Baran .		
Pernyataan	Benar	Salah
Titik potong dengan sumbu <i>x</i> adalah (-15,0)		
Pada garis untuk setiap x yang meningkat sebanyak bilangan rill		
tertentu maka nilai y akan meningkat sebanyak 15		
Jika garis sejajar dengan garis $y = 2p - 1$ maka nilai p adalah 2.5		
Garis tersebut berpotongan dengan garis $y = -\frac{1}{5}$		

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$


$$y - (-5) = 5(x - 2)$$

$$y + 5 = 5x - 10$$

$$y = 5x - 10 - 5$$

$$y = 5x - 15$$

4. Perhatikan gambar di bawah ini!



Dari gambar di atas ada berapa banyak garis yang memiliki kemiringan < 0

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4
- e. 5

JAWABAN D



5. Apakah dua buah garis $l_1: y = px + b$ dan $l_2: y = qx - c$ berkedudukan saling tegak lurus?

Tentukan manakah pernyataan di bawah ini yang cukup untuk menjawab pertanyaan di atas!

- (1) p < 0
- (2) q > 0
- a. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan(2) SAJA tidak cukup
- b. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan(1) SAJA tidak cukup
- c. DUA pernyataan BERSAMA SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup
- d. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup
- e. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan

JAWABAN E

Cukup jelas:

$$m_1 = p$$

$$m_2 = q$$

$$m_1 \cdot m_2 = -1$$


$$pq = -1$$

Hanya terpenuhi saat

$$p = -\frac{1}{q}$$

Saat p < 0 dan q > 0 tidak menjamin persamaan di atas terpenuhi, karena masih ada kemungkinan misalnya p = -1 dan q = 2.

6. Perhatikan gambar di bawah ini!



Dari gambar di atas diketahui ketiga garis berpotongan di suatu titik (x,y). Jika garis berwarna merah adalah y=c Tentukanlah nilai c+2!

- a. 2
- b. 3
- c. 4
- d. 5
- e. 6

Pembahasan:

Garis biru : $6x + 3y = 30 \rightarrow 2x + y = 10 \rightarrow y = -2x + 10$

Garis hijau : $5x + 5y = 25 \rightarrow x + y = 5 \rightarrow y = -x + 5$

Garis biru dan hijau berpotongan pada titik

$$y_{biru} = y_{hijau}$$

$$-2x + 10 = -x + 5$$

$$-2x + x = 5 - 10$$

$$-x = -5$$

$$x = 5$$

Substitusikan ke salah satu persamaan diperoleh berpotongan pada (5,0).


Garis merah tidak memiliki kemiringan (m = 0) dan memotong juga pada titik (5,0). Persamaannya menjadi

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$
$$y - 0 = 0$$
$$y = 0$$

$$0 + 2 = 2$$


JAWABAN A

- 7. Suatu garis memotong titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) jika $x_1 < 0$, $x_2 > 0$ maka ada berapa pernyataan di bawah ini yang menyebabkan kemiringan garis tersebut pasti bernilai positif (+)?
 - 1) $y_1 > 0, y_2 < 0$
 - 2) $y_1 < 0, y_2 < 0$
 - 3) $y_1 > 0, y_2 < 0$
 - 4) $y_1 < 0, y_2 > 0$
 - a. 0
 - b. 1
 - c. 2
 - d. 3
 - e. 4
- 8. Perhatikan gambar di bawah ini!



Gradien garis AB adalah ...

- a. $-\frac{8}{11}$
- b. $-\frac{1}{2}$
- c. $-\frac{2}{3}$
- d. $-\frac{4}{7}$
- e. Tidak dapat ditentukan



Turun (-) sejauh 8 dan kek kanan (+) sejauh 11


$$m = -\frac{8}{11}$$

- 9. Persamaan garis di bawah ini yang paling mendekati, hampir sejajar dengan garis 3y + 2x = 6 adalah ...
 - a. 2x + y = 7
 - b. x + 2y = 5
 - c. 3x + y = 3
 - d. x + 3y = 2
 - e. 3x + 2y = 6

Anda bisa melakukan pengujian pilihan di temukan paling mendekati sejajar dengan kemiringan mendekati $-\frac{2}{3}$ adalah x + 3y dengan kemiringan $-\frac{1}{3}$.

JAWABAN D

10. Grafik garis dengan persamaan $y = \frac{1}{2}x - 2$ adalah ...



Diketahui persamaan garis lurus: $y = \frac{1}{2}x - 2$.

Titik potong garis terhadap sumbu koordinat harus ditentukan dulu.

Titik potong terhadap sumbu-X terjadi saat y=0.

$$0 = \frac{1}{2}x - 2 \Leftrightarrow 2 = \frac{1}{2}x \Leftrightarrow x = 4.$$

Jadi, koordinat titik potongnya adalah (4,0).

Titik potong terhadap sumbu-Y terjadi saat x=0.

$$y = \frac{1}{2}(0) - 2 \Leftrightarrow y = -2$$

Jadi, koordinat titik potongnya adalah (0,-2).

Gambarkan kedua titik tersebut pada sistem koordinat Kartesius, lalu hubungkan kedua titik itu sehingga membentuk garis lurus.

(Jawaban C)

- 11. Suatu grafik parabola memiliki persamaan $y=(p+4)x^2+2px-1$, p>-4. Dari persamaan yang diberikan dapat diketahui karakteristik grafik adalah ...
 - 1) Memotong sumbu-x
 - 2) Menyinggung sumbu-x
 - 3) Memiliki akar akar rill
 - 4) Tidak memotong maupun menyinggung sumbu-x

Pernyataan yang benar adalah

- a. 1,2,3
- b. 1.3
- c. 2,4
- d. 4

e. Semua benar

Dari soal diketahui bahwa $p>-4\to p+4>0$ menunjukkan bahwa a>0 yang artinya kurva terbuka ke atas. Tentukan diskriminannya

$$D = b^2 - 4ac \rightarrow (2p)^2 - 4(p+4)(-1)$$


$$D = 4p^2 - (-4p - 16)$$

$$D = 4p^2 + 4p + 16$$

$$p + 4 > 0$$
 artinya

$$4p + 4 > 0$$
 juga

Karena $4p^2$ definit positif dan 4p+4 juga definit positif maka nilai D>0. Karena D>0 maka



Di mana D adalah diskriminan untuk $D = b^2 - 4ac$

Kurva memotong sumbu-x dan memiliki solusi rill lebih dari 1.

JAWABAN B

12. Suatu persamaan parabola $y = 24ax^2 + 32x^2 + 4ax - 1$ (Untuk *a* bilangan bulat) diketahui memotong sumbu-x. Tentukan hubungan p dan q di bawah ini!

	\mathcal{C} 1
P	Q
Hasil jumlah semua nilai a yang memenuhi	0

- a. P < Q
- b. P > Q
- c. P = Q
- d. Hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan

$$y = 24ax^2 + 32x^2 + 4ax - 1$$
 memotong sumbu-x, artinya $D = 0$

$$D = b^2 - 4ac$$

$$y = 24ax^{2} + 32x^{2} + 4ax - 1 \rightarrow (24a + 32)x^{2} + 4ax - 1 \rightarrow (6a + 8)x^{2} + ax - \frac{1}{4}$$
$$y = (6a + 8)x^{2} + ax - \frac{1}{4}$$
$$D = a^{2} - 4(6a + 8)(-\frac{1}{4})$$

$$D = a^{2} - ((6a + 8)(-1))$$

$$D = a^{2} - (-6a - 8)$$

$$D = a^{2} + 6a + 8$$

$$D = 0$$

$$a^{2} + 6a + 8 = 0$$

$$(a + 2)(a + 4) = 0$$

$$a_{1} = -2, a_{2} = -4$$

$$P = -2 - 4 = -6$$

$$Q = 0$$

$$P < Q$$

JAWABAN A


13. Suatu persamaan parabola $y = ax^2 + bx + c$ tentukan apakah pernyataan di bawah ini benar / salah!

Pernyataan	Benar	Salah
Untuk $a > 0$, $b < 0$, $c > 0$ maka kurva akan memotong sumbu-x		
Untuk $a < 0, b > 0, c < 0$ maka kurva akan menyinggung sumbu-x		
Untuk $c = 0$ dan $b \neq 0$ maka persamaan di atas hanya memiliki satu		
solusi ril		
Jika $4ac > b^2$ dan maka kurva dapat dinyatakan definit negatif atau		
positif		


14. Parabola $f(x) = ax^2 + bx + c$ berpuncak di (2, -4) Apakah parabola tersebut memiliki maksimum ?

Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.

- (1) Parabola tersebut memotong sumbu y negatif
- (2) abc < 0
- a. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan(2) SAJA tidak cukup
- b. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan(1) SAJA tidak cukup
- c. DUA pernyataan BERSAMA SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup
- d. d.Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup
- e. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan



15. Perhatikan gambar di bawah ini!



Sebuah grafik fungsi parabola memotong titik (-a,0) dan (-b,0) serta memiliki titik ekstrim pada (-3,-c). Nilai c dari gambar di atas adalah ...

- a. 6
- b. 2
- c. 3

d.
$$\frac{2}{3}$$

e.
$$\frac{1}{2}$$

JAWABAN D

- 16. Sebuah lingkaran dengan persamaan $x^2 + y^2 4x + 6y 3$ memiliki luas sebesar ... satuan.
 - a. 16π
 - b. 4 π
 - c. 2π
 - d. 3π
 - e. 15π

Diketahui dari soal di atas

$$A = -4, B = 6, C = -3$$

$$a = -\frac{A}{2} \rightarrow -\frac{-4}{2} = 2, b = \frac{-6}{2} = -3$$

$$r^{2} = a^{2} + b^{2} - c = 4 + 9 - (-3)$$

$$r^{2} = 4 + 9 + 3 = 16$$

$$r = \sqrt{16}$$

$$r = 4$$

Luas = 16π .

JAWABAN A

- 17. Manakah di bawah ini garis yang memotong tepat titik pusat dari lingkaran dengan persamaan $(x-2)^2 + (y-3)^2 = r^2$?
 - 1) 3x + y = 4
 - 2) 2x y = 7
 - 3) 4x y = 5
 - 4) 3x y = 3
 - a. 1,2,3
 - b. 1,3
 - c. 2,4
 - d. 4
 - e. Semua benar

JAWABAN D

Dari soal lingkaran berpusat pada (2,3) , anda cukup menguji dengan mensubstitusikan nilai x=2, dan y=3

- 1) $3.2 + 3 \neq 4$ (Salah)
- 2) $2.2 3 \neq 7$ (Salah)

Jika pernyataan (1) salah otomatis A, B, dan E salah , pernyataan (2) salah otomatis C salah. Maka jawaban yang tepat adalah D.

18. Tentukan apakah persamaan di bawah ini benar / salah merupakan sebuah lingkaran!

Pernyataan	Benar	Salah
$2x^2 + 2y^2 + 4x + 2y - 8 = 0$		
$x^2 + y^2 - 3y + 2x - 5 = 0$		
$x^2 + y^2 - y + x + 1 = 0$		
$x^2 + y^2 + 2x - 5y - 2 = 0$		

Ingat

$$r^2 = a^2 + b^2 - c$$

Syarat sebuah lingkaran adalah $r^2 > 0$ atau r > 0.

Dengan menganalisis

$$r^2 = a^2 + b^2 - c$$

 $a^2 + b^2$ definit positif

Yang berarti c menjadi penentu. Syarat c adalah $0 \le c < (a^2 + b^2)$ agar $c^2 > 0$. Dengan menggunakan rumus $a = -\frac{A}{2}$, $b = -\frac{B}{2}$ bisa dibuktikan. Silahkan anda tentukan sendiri nilai a^2 , b^2 , c nya nanti akan ditemukan apakah memenuhi syarat.

Persamaan	\mathbf{a}^2	\mathbf{b}^2	c	Apakah $0 \le c < (a^2 + b^2)$?
$2x^{2} + 2y^{2} + 4x + 2y - 8 = 0 \rightarrow x^{2} + y^{2} + 2x + y - 4$				
$x^2 + y^2 - 3y + 2x - 5 = 0$				
$x^2 + y^2 - y + x + 1 = 0$				
$x^2 + y^2 + 2x - 5y - 2 = 0$				

Pernyataan	Benar	Salah
$2x^2 + 2y^2 + 4x + 2y - 8 = 0$	V	
$x^2 + y^2 - 3y + 2x - 5 = 0$	V	
$x^2 + y^2 - y + x + 1 = 0$		V
$x^2 + y^2 + 2x - 5y - 2 = 0$	V	


19. Diketahui lingkaran dengan persamaan

$$(x+2)^2 + (y+1)^2 = 16$$

Mana diantara titik berikut ini yang terletak pada lingkaran tersebut?

- (1)(2,-1)
- (2)(-1,2)
- (3)(-2,-5)
- (4)(3,1)
- 1,2,3
- b. 1,3
- c. 2,4
- d. 4
- e. Semua benar

20. Perhatikan gambar di bawah ini!



Persamaan lingkaran di atas adalah ...

a.
$$x^2 - 12x + y^2 - 8y + 40 = 0$$

b. $x^2 - 10x + y^2 - 6y + 43 = 0$

$$x^2 - 10x + y^2 - 6y + 43 - 0$$

c.
$$x^2 - 14x + y^2 - 10y + 45 = 0$$

d. $x^2 - 12x + y^2 - 8y + 49 = 0$
e. $x^2 - 12x + y^2 - 8y + 43 = 0$

d.
$$x^2 - 12x + y^2 - 8y + 49 = 0$$

e.
$$x^2 - 12x + y^2 - 8y + 43 = 0$$