


1. Considere uma colisão frontal elástica entre duas partículas de massas m e $m' = 16m$. A partícula de massa m se move inicialmente com velocidade v , enquanto a outra encontra-se em repouso. Qual é a fração de energia cinética transferida de m para m' durante a colisão?

(a)0,58 (b)0,22 (c)0,84 (d)0,00 (e)0,34

2. A figura abaixo mostra um corpo rígido formado por um aro fino (de massa m , raio $R = 0,23$ m e momento de inércia em relação ao diâmetro $mR^2/2$) e uma barra fina radial (de massa m , comprimento $L = 2,00R$ e momento de inércia em relação ao seu CM $mL^2/12$). O conjunto está na vertical, mas se recebe um pequeno empurrão começa a girar em torno de um eixo horizontal no plano do aro e da barra, que passa pela extremidade inferior da barra. Supondo que a energia fornecida ao sistema pelo pequeno empurrão é desprezível, qual é a velocidade angular em rad/s do conjunto quando ele passa pela posição invertida (de cabeça para baixo)?



(a)3,63 (b)9,97 (c)4,98 (d)8,01 (e)6,52

3. Considere um objeto que se move em uma dimensão de acordo com a equação horária $x = v_0 te^{-t/t_0}$, onde t é o tempo, $v_0 = 13,2$ m/s e $t_0 = 1,2$ s. Qual é a distância, em metros, que o objeto se encontra da origem quando para momentaneamente?

(a)4,0 (b)7,5 (c)5,8 (d)11,6 (e)9,7

4. Um rifle, que atira balas a 428 m/s, é apontado para um alvo situado a 165 m de distância. Se o centro do alvo está na mesma altura do rifle, para que altura (em centímetros) acima do alvo o cano do rifle deve ser apontado para que a bala atinja o seu centro?

(a)59,3 (b)104,4 (c)8,0 (d)25,3 (e)74,3

5. Na figura abaixo, um pequeno bloco de 68 g desliza para baixo em uma superfície curva sem atrito a partir de uma altura $h = 20$ cm e depois adere a uma barra uniforme de massa 117 g e comprimento 98 cm. A barra gira em torno do ponto O antes de parar momentaneamente. Determine θ em graus.

(a)37,1 (b)11,4 (c)21,5 (d)26,4 (e)3,7

6. Duas partículas, de massas m_1 e m_2 , são empurradas uma contra a outra, comprimindo uma mola colocada entre elas. Quando são liberadas, a mola as arremessa em sentidos opostos. A relação entre as massas das partículas é $m_2/m_1 = 10$ e a energia armazenada na mola é de 75 J. Suponha que a mola tenha massa desprezível e que toda a energia armazenada seja transferida para as partículas. Após terminada essa transferência, qual é a energia cinética da partícula 1 em J?

(a)68,2 (b)51,2 (c)24,0 (d)16,3 (e)39,3

7. Uma partícula de massa 5,0 kg, lançada sobre um trilho retilíneo com velocidade de 3,3 m/s, está sujeita a uma força $F(x) = -bx$, onde $b = 1,7$ N/m e x é o deslocamento, em m, a partir da origem. Sabendo-se que a partícula para em dois pontos do trilho, a saber, $+x_0$ e $-x_0$, determine x_0 em metros.

(a)2,9 (b)7,1 (c)5,7 (d)1,5 (e)9,5

8. Um metrô percorre uma curva plana de raio 18 m a 24 km/h. Qual o ângulo, em graus, que as alças de mão penduradas no teto fazem com a vertical?

(a)83,7 (b)72,6 (c)61,0 (d)51,0 (e)37,7

9. Considere um corpo de massa m , sob a ação de um campo de forças F conservativo, cuja energia mecânica é $E = K + U$, onde K e U são as energias cinética e potencial. Considerando que o movimento do corpo é restrito a uma dimensão, pode-se afirmar que

(a) se $K < 0$ o sistema atinge o equilíbrio indiferente.

(b) necessariamente $dE/dt = 0$.

(c) se $F = mg$ o sistema encontra-se em repouso ultra-móvel.

(d) quando $U = 0$, tem-se um ponto de equilíbrio instável.

(e) $U > E$ é condição de flutuação mega dissonante.

10. Uma pequena aranha de peso P_a está pendurada na ponta de um fio de teia, no teto de um elevador. Sabendo-se que o fio suporta uma tensão máxima de $7,7P_a$, qual seria a mínima aceleração (em m/s²) de subida do elevador para que o fio se partisse?

(a)67,0 (b)51,1 (c)29,9 (d)83,1 (e)17,1

Fórmulas e Constantes

$$I = \frac{P_s}{4\pi r^2}; \quad E = hf; \quad p = \frac{hf}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

$$hf = K_{\max} + \Phi; \quad \Delta\lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\phi)$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{8\pi^2m}{h^2}[E - U(x)]\psi = 0$$

$$T \approx e^{-2bL}, \text{ onde } b = \sqrt{\frac{8\pi^2m(U_b - E)}{h^2}}$$

$$E_n = \left(\frac{h^2}{8mL^2} \right) n^2, \text{ para } n = 1, 2, 3 \dots$$

$$\psi_n(x) = A \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \text{ para } n = 1, 2, 3 \dots$$

$$\Delta x \Delta p = h/2\pi$$

$$\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{12} \text{ F/m}; \quad \mu_0 = 1,257 \times 10^{-6} \text{ H/m}$$

$$c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}; \quad h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J/s} = 4,14 \times 10^{-15} \text{ eV.s}$$

$$hc = 1240 \text{ eV.nm}$$

$$\text{Eletron: } mc^2 = 511 \text{ keV}$$

NÃO MARCAR										
un	—	—	—	—	—		—	—	—	—
de		—	—	—	—	—	—	—	—	—
GABARITO										
—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a										
b										
c										
d										
e										
MATRÍCULA										
—	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1°										
2°										
3°										
4°										
5°										
6°										
7°										

Por exemplo, se seu número de matrícula for 12.1.3579, temos que

12.1.3579

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

e a tabela deve ser preenchida assim:

xx	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1°										
2°										
3°										
4°										
5°										
6°										
7°										

MATRÍCULA:

NOME:

TURMA: