


Prova 2 – FIS110-73 – 17/06/2022

1. Uma pequena aranha de peso P_a está pendurada na ponta de um fio de teia, no teto de um elevador. Sabendo-se que o fio suporta uma tensão máxima de $2,9P_a$, qual seria a mínima aceleração (em m/s^2) de subida do elevador para que o fio se partisse?

(a)33,8 (b)47,8 (c)65,1 (d)78,9 (e)19,0

2. Na figura abaixo, um pequeno bloco de 92 g desliza para baixo em uma superfície curva sem atrito a partir de uma altura $h = 16$ cm e depois adere a uma barra uniforme de massa 169 g e comprimento 78 cm. A barra gira em torno do ponto O antes de parar momentaneamente. Determine θ em graus.



(a)27,0 (b)11,0 (c)36,5 (d)2,5 (e)21,0

3. Um metrô percorre uma curva plana de raio 16 m a 26 km/h. Qual o ângulo, em graus, que as alças de mão penduradas no teto fazem com a vertical?

(a)28,3 (b)50,3 (c)76,7 (d)66,6 (e)45,6

4. Um rifle, que atira balas a 494 m/s, é apontado para um alvo situado a 140 m de distância. Se o centro do alvo está na mesma altura do rifle, para que altura (em centímetros) acima do alvo o cano do rifle deve ser apontado para que a bala atinja o seu centro?

(a)17,6 (b)78,8 (c)40,2 (d)99,4 (e)63,5

5. Considere um objeto que se move em uma dimensão de acordo com a equação horária $x = v_0 t e^{-t/t_0}$, onde t é o tempo, $v_0 = 18,5$ m/s e $t_0 = 1,4$ s. Qual é a distância, em metros, que o objeto se encontra da origem quando para momentaneamente?

(a)7,0 (b)13,0 (c)9,5 (d)4,2 (e)11,5

6. Uma partícula de massa 1,3 kg, lançada sobre um trilho retilíneo com velocidade de 2,0 m/s, está sujeita a uma força $F(x) = -bx$, onde $b = 1,8$ N/m e x é o deslocamento, em m, a partir da origem. Sabendo-se que a partícula para em dois pontos do trilho, a saber, $+x_0$ e $-x_0$, determine x_0 em metros.

(a)3,8 (b)6,8 (c)1,7 (d)4,8 (e)9,8

7. Duas partículas, de massas m_1 e m_2 , são empurradas uma contra a outra, comprimindo uma mola colocada entre elas. Quando são liberadas, a mola as arremessa em sentidos


opostos. A relação entre as massas das partículas é $m_2/m_1 = 7$ e a energia armazenada na mola é de 76 J. Suponha que a mola tenha massa desprezível e que toda a energia armazenada seja transferida para as partículas. Após terminada essa transferência, qual é a energia cinética da partícula 1 em J?

(a)66,5 (b)26,3 (c)10,1 (d)47,6 (e)34,4

8. Considere uma colisão frontal elástica entre duas partículas de massas m e $m' = 2m$. A partícula de massa m se move inicialmente com velocidade v , enquanto a outra encontra-se em repouso. Qual é a fração de energia cinética transferida de m para m' durante a colisão?

(a)0,89 (b)0,48 (c)0,71 (d)0,03 (e)0,22

9. A figura abaixo mostra um corpo rígido formado por um aro fino (de massa m , raio $R = 0,21$ m e momento de inércia em relação ao diâmetro $mR^2/2$) e uma barra fina radial (de massa m , comprimento $L = 2,00R$ e momento de inércia em relação ao seu CM $mL^2/12$). O conjunto está na vertical, mas se recebe um pequeno empurrão começa a girar em torno de um eixo horizontal no plano do aro e da barra, que passa pela extremidade inferior da barra. Supondo que a energia fornecida ao sistema pelo pequeno empurrão é desprezível, qual é a velocidade angular em rad/s do conjunto quando ele passa pela posição invertida (de cabeça para baixo)?



(a)10,07 (b)5,07 (c)3,57 (d)8,39 (e)7,48

10. Considere um corpo de massa m , sob a ação de um campo de forças F conservativo, cuja energia mecânica é $E = K + U$, onde K e U são as energias cinética e potencial. Considerando que o movimento do corpo é restrito a uma dimensão, pode-se afirmar que

(a) $U > E$ é condição de flutuação mega dissonante.

(b) $F = -dU/dx$.

(c) quando $U = 0$, tem-se um ponto de equilíbrio instável.

(d) se $F = mg$ o sistema encontra-se em repouso ultra-móvel.

(e) se $F = 0$ o sistema é dito anti-conservativo.

Fórmulas e Constantes

$$I = \frac{P_s}{4\pi r^2}; \quad E = hf; \quad p = \frac{hf}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

$$hf = K_{\max} + \Phi; \quad \Delta\lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\phi)$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{8\pi^2m}{h^2}[E - U(x)]\psi = 0$$

$$T \approx e^{-2bL}, \text{ onde } b = \sqrt{\frac{8\pi^2m(U_b - E)}{h^2}}$$

$$E_n = \left(\frac{h^2}{8mL^2}\right)n^2, \text{ para } n = 1, 2, 3 \dots$$

$$\psi_n(x) = A \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \text{ para } n = 1, 2, 3 \dots$$

$$\Delta x \Delta p = h/2\pi$$

$$\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{12} \text{ F/m}; \quad \mu_0 = 1,257 \times 10^{-6} \text{ H/m}$$

$$c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}; \quad h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s} = 4,14 \times 10^{-15} \text{ eV.s}$$

$$hc = 1240 \text{ eV.nm}$$

$$\text{Eletron: } mc^2 = 511 \text{ keV}$$

NÃO MARCAR										
un	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GABARITO										
-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a										
b										
c										
d										
e										
MATRÍCULA										
-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1°										
2°										
3°										
4°										
5°										
6°										
7°										

Por exemplo, se seu número de matrícula for 12.1.3579, temos que

12.1.3579

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

e a tabela deve ser preenchida assim:

xx	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1°										
2°										
3°										
4°										
5°										
6°										
7°										

MATRÍCULA:

NOME:

TURMA: