


HYVAPRESS: HYdrocortisone and VAsopressin in Post-REsuscitation Syndrome.

HYVAPRESS: A l'inclusion → proche (CST) - urgence



CRITERES D'INCLUSION

- 1-Patients ≥ 18 ans
- 2- ACR (intra ou extra hospitalier) avec RACS supérieure à 30 minutes admis vivants en réanimation
- 3- Etat de choc post ressuscitation défini par une hypotension artérielle (PAS < 90mmHg ou PAM < 65 mmHg) persistante après optimisation volémique survenant dans les 24 premières heures après RACS nécessitant une perfusion continue de noradrénaline > 0.2 μ g/kg/min pendant au moins 3 heures.
- 4- Intervalle entre le début de la perfusion de noradrénaline et la randomisation < 9 heures
- 5- Consentement écrit proche ou procédure d'urgence

CRITERES D'EXCLUSION

ACR de cause traumatique ou neurologique
Etat de choc hémorragique
ACR en unités de soins intensifs
Antécédent d'insuffisance surrénalienne
Limitation des thérapeutiques actives
Assistance circulatoire extracorporelle
Corticothérapie en cours, quelle qu'en soit la dose
Hémorragie digestive dans les 6 semaines précédant l'ACR
Grossesse ou allaitement en cours
Inclusion dans un autre essai randomisé portant sur un médicament susceptible d'interagir avec l'un ou l'autre des médicaments interventionnels
Allergie à l'AVP ou ses excipients
Allergie à l'hydrocortisone ou ses excipients
Mesure de protection légale