


RECORDS : Reconnaissance rapide des sEpsis sensibles ou résistants aux CORTicostéroïDeS

RECORDS : A l'inclusion → patient (CST) - proche (CST) - urgence



CRITERES D'INCLUSION

- 1-Obtention du CE écrit
- 2- ≥ 18 ans
- 3- Admis en réanimation pour une infection suspectée ou prouvée
- 4- Sepsis lié à Une pneumonie communautaire acquise
AVEC
Une dépendance aux vasopresseurs (noradrénaline, adrénaline)
OU Un choc septique (Singer 2016 : vasopresseur pour maintenir une PAM > 65 mmHg et lactate > 2 mmol/l)
OU SDRA- Ranieri 2012
 - apparition aiguë, dans la semaine suivant un signe clinique apparent et avec progression du syndrome respiratoire
 - opacités bilatérales sur l'imagerie thoracique non expliquées par d'autres pathologies pulmonaires, par exemple épanchement pleural, atélectasie, nodules, etc
 - pas de preuve d'insuffisance cardiaque ou de surcharge volumique
 - $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 300$ mm Hg, - PEEP ≥ 5 cm H₂O
- 4- Testé pour un ou plusieurs biomarqueurs spécifiques de RECORDS : CIRCI, Endocan, GILZ, MDW, Lymphocytose, Transcriptomique SRS2, Endotype B, PCR-COVID-19, PCR influenza, PCR autre virus respiratoire, autres en cours de développement
- 5- Sujet affilié ou bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale

CRITERES D'EXCLUSION

Femme enceinte OU Femmes en âge de procréer n'utilisant pas de contraception OU Femmes allaitantes
Moribonds (espérance de vie < 48 h)
Hypersensibilité à l'hydrocortisone ou à la fludrocortisone ou à l'un de leurs excipients (RCP)
Vaccination par un virus vivant au cours des 6 derniers mois
Indication formelle aux corticostéroïdes selon les directives internationales les plus récentes