
# <u>ADDICT:</u> Antibiothérapie des infections à souche aeruginosa difficile à traiter

### ADDICT : A l'inclusion → patient (NI) - proche (I



#### **CRITERES D'INCLUSION**

#### Âge ≥ 18 ans ;

Infection invasive à P. aeruginosa DTR nécessitant une antibiothérapie

- après réception de l'antibiogramme, et réévaluation de l'antibiothéral échéant) par IV,
- que cette antibiothérapie définitive soit totalement active (sensibilité in vitro confirmée par l'antibiou partiellement active (sensibilité in vitro diminuée) ou inactive (résistance in vitro);

**Hospitalisation dans un service de réanimation**, de médecine ou de ch participant à l'étude ;

Non-opposition du patient à la participation à l'étude – pour les patients permettra pas une information et le recueil de la non-opposition au moment de l'opposition sera obtenue auprès d'un proche, avec recueil de la non-opposition du

#### **CRITERES D'EXCLUSION**

- Mucoviscidose
- Colonisation à *P. aeruginosa* DTR ou infection à *P. aeruginosa* DTR ne d'antibiothérapie définitive par IV
- Personne protégée (sous tutelle ou sous curatelle)
- Personne sous sauvegarde de justice
- Personnes privées de liberté
- Personne refusant l'utilisation à des fins de recherche observationnell

## e de Pseudomonas



famille

:/ famille estigateur

e définitive

pie probabiliste le cas

ogramme),

irurgie d'un centre

infection index, la nonupatient dès que possible

nécessitant pas

le