


OPTIFLU : Impact pronostique du sous-dosage précoce en oseltamivir carboxylate chez les patients admis en réanimation pour grippe grave

OPTIFLU : A l'inclusion → patient (CST) - proche (CST) - urgence



CRITERES D'INCLUSION

- 1- Patients âgés de plus de 18 ans
- 2- Infection grippale grave confirmée nécessitant une prise en charge en réanimation avec intubation trachéale pour ventilation mécanique
- 3- Oseltamivir administré via une sonde gastrique et débuté depuis moins de 24 heures (soit maximum deux doses administrées)
- 4- Affiliation à un régime de sécurité sociale, bénéficiaire ou ayant droit (hors AME)
- 5- Patient ou personne de confiance ou proche informé et ayant donné son consentement écrit ou inclusion selon les procédures d'urgence.

CRITERES D'EXCLUSION

- Femme enceinte ou allaitante
- Poids inférieur à 40 kg
- Traitement antérieur par Zanamivir ou autre traitement antiviral actif sur le virus de la grippe depuis plus de 24 heures
- Co-infection par un autre virus respiratoire (notamment SARS CoV-2)
- Administration de médicaments par sonde naso-gastrique impossible
- Insuffisance hépatocellulaire sévère (TP<50%) ou cirrhose Child-Pugh C
- Allergie au paracétamol connue
- Participation en cours à un essai thérapeutique interventionnel
- Patient bénéficiant de l'AME (Aide Médicale d'État)
- Patient privé de liberté ou sous protection juridique (tutelle ou curatelle)
- Incapacité, selon l'investigateur, de comprendre ou refus de signer le consentement éclairé de participation à l'étude (patient non francophone).