


NESOI2 : Impact of the non-invasive oxygen-reserve-index versus standard of care on peripheral oxygen saturation during

NESOI-2 : A l'inclusion → patient (CST) - proche (CST) - urgence



CRITERES D'INCLUSION

- 1-Admission en unité de soins intensifs et nécessité d'intubation pour permettre une ventilation mécanique
- 2-Nécessité d'un apport supplémentaire d'oxygène (par n'importe quel dispositif et à n'importe quel débit) pour obtenir une SpO₂>97%
- 3-Patient ou proche parent informé de l'étude et ayant consenti à la participation du patient à l'étude. Si le patient est inapte et qu'aucun proche ne peut être contacté au moment de l'inclusion dans l'étude, l'inclusion dans l'essai sera réalisée par procédure d'urgence par le médecin de l'unité de soins intensifs
- 4- Patients affiliés à un régime de sécurité sociale

CRITERES D'EXCLUSION

Intubation par fibroscopie nécessaire selon le médecin responsable
Contre-indications à la laryngoscopie (par exemple, lésion spinale instable)
Délai insuffisant pour inclure et randomiser le patient (par exemple, en raison d'un arrêt cardiaque)
Âge < 18 ans
Grossesse ou allaitement
Détenue dans un établissement pénitentiaire
Sous tutelle, curatelle ou sous protection de la justice