


**COMBINATION LOCK : Intérêt de l'isolement protecteur et d'une antibiothérapie incluant un aminoside à la phase aiguë d'un sepsis chez le patient neutropénique.**

**COMBINATION LOCK: A l'inclusion → patient (CST) - proche (CST) - urgence**



**CRITERES D'INCLUSION**

- 1- Age  $\geq 18$  ans
- 2- Admission en réanimation
- 3- Sepsis ou choc septique selon la définition SEPSIS3
- Tumeur, greffe de moelle ou maladie hématologique tumorale
- 4- Neutropénie (PNN  $< 500/\text{mm}^3$  ou leucocytes  $< 1000/\text{mm}^3$ ) en lien avec le traitement de sa pathologie cancéreuse
- 5- Consentement du patient, du proche ou inclusion selon un critère d'urgence

**CRITERES D'EXCLUSION**

- Grossesse ou allaitement  
Survie attendue  $< 48\text{h}$   
Participation antérieure à l'étude  
Absence d'affiliation à un régime de sécurité sociale  
Patient majeur protégé ou privé de liberté  
Patient ayant reçu plus d'une injection d'aminoglycosides dans les 3 jours précédents  
Délai entre le début du sepsis et l'inclusion  $> 24\text{ h}$   
Contre-indications aux aminosides
- Hypersensibilité aux aminosides ou à l'un des excipients de l'amikacine
  - Patients présentant une allergie documentée aux aminosides
  - Myasthénie grave
  - Administration concomitante de polymyxine intraveineuse