

BÖLÜNEBİLME KURALLARI

2 İle Bölünebilme: tüm çift sayılar , yani birler basamağı 0,2,4,6,8 olan sayılar 2 ile tam bölünürler.

3 İle Bölünebilme: Rakamlarının toplamı 3 ve 3'ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünürler

*Bir sayının 3 ile bölümünden kalan o sayının rakamları toplamının 3 ile bölümünden kalandır.

4 İle bölünebilme : Sayının son iki basamağı 4'ün katı olan sayılar 4 ile tam bölünürler.

5 İle Bölünebilme: Birler basamağı 0 veya 5 olan sayılar 5 ile tam bölünürler.

6 İle Bölünebilme: 2 ve 3 ile tam bölünen sayılar 6 ile de tam bölünürler.

7 İle Bölünebilme: sayımız abcdefgh olsun;

$$\begin{array}{r} ab \ cde \ fgh \\ \underline{31} \ \underline{231} \ \underline{231} \\ + \quad - \quad + \end{array}$$

$(3a+b)-(2c+3d+e)+(2f+3g+h) = 7k$, $(k \in \mathbb{Z})$ oluyorsa sayı 7 ile tam bölünür (işaretlemeye + veya - ile başlamak sonucu değiştirmez)

8 İle Bölünebilme: Son üç basamağı 8'in katı veya "000" olan sayılar 8 ile tam bölünürler.

9 İle Bölünebilme: Rakamları toplamı 9 veya 9'un katı olan sayılar 9 ile tam bölünürler.

10 İle Bölünebilme: Son rakamı "0" olan sayılar 10 ile tam bölünürler.

11 İle Bölünebilme: sayımız abcdefgh olsun;

$$\begin{array}{cccccccc} a & b & c & d & e & f & g & h \\ - & + & - & + & - & + & - & + \end{array}$$

$$(b+d+f+h)-(a+c+e+g) = 11k \text{ , } (k \in \mathbb{Z})$$

oluyorsa sayı 11 ile tam bölünür.(işaretlemeye sağdan veya soldan, + ile başlamak sonucu değiştirmez) Eğer sayı tam bölünmüyorsa kalanı bulmak için sağdan ve + ile başlamak gerekir.

13 ile Bölünebilme: Sayımız abcdef olsun

$$\left. \begin{array}{cc} a & b & c & d & e & f \\ \begin{array}{ccc} 10 & 1 & 4 \\ \square & \square & \square \\ - & & \end{array} & \begin{array}{ccc} 10 & 1 & 4 \\ \square & \square & \square \\ + & & \end{array} \end{array} \right\} = 13k \text{ ise sayı 13 ile tam}$$

bölünür denir

KURAL: Bir sayı aralarında asal iki sayıyla ayrı ayrı tam bölünebiliyorsa , bu iki sayının çarpımına da tam bölünür.

2 ve 3 ile tam bölünen bir sayı 6 ile,
3 ve 4 ile tam bölünen bir sayı 12 ile,
3 ve 5 ile tam bölünen bir sayı 15 ile,
4 ve 9 ile tam bölünen bir sayı 36 ile,
3,4 ve 5 ile tam bölünen bir sayı 60 ile,
tam bölünür.

❖ 3457 sayısının 2,3,4,5,6,9 ve 11 ile bölümlerinden kalanları bulun.

ÇÖZÜM :

Bölme işleminin kalan bulma kuralları kullanılırsa;

2 ile bölümünden kalan: Son rakama bakılır 7'nin 2'ile bölümünden kalan 1 dir.

3 ile bölümünden kalan: sayının rakamları toplamı: $3+4+5+7=19$ ve 19'un 3 ile bölümünden kalan 1 dir.

4 ile bölümünden kalan: sayının son iki basamağına bakılır. 57'nin 4'e bölümünden kalan 1 dir.

5 ile bölümünden kalan: sayının son basamağına bakılır. 7'nin 5 ile bölümünden kalan 2 dir.

6 ile bölümünden kalan: sayının 2 ve 3 ile bölümünden kalanlara bakılır. Kalanlar eşitse 6 ile bölümünden kalan da o sayı olur. Sayının 2 ve 3'e bölümünden kalanlar eşit ve 1 dir. o halde 6 ile bölümünden kalan da 1 dir.

9 ile bölümünden kalan: sayının rakamları toplamı 19 idi 19'un 9'a bölümünden kalan 1 dir

11 ile bölümünden kalan: kuralı kullanacak olursak

3 4 5 7

- + - +

$-3+4-5+7=3$ o halde kalan 3 olur.

ÖRNEK(1)

23a5 sayısının 3'e tam bölünmesini sağlayan a değerlerinin toplamı nedir?

ÇÖZÜM :

3'e tam bölünmesi için rakamları toplamının 3 ile tam bölünmesi gerekir.

$2+3+a+5=10+a$ eder.

O halde $a=2,5,8$ olabilir. Sayıların toplamı 15 olur.

ÖRNEK(2)

527a4 sayısı 9'a tam bölünüyorsa a'nın alabileceği değerler çarpımı nedir?

ÇÖZÜM :

Sayının rakamlarını toplarsak

$5+2+7+a+4=a+18$ eder. Bu toplamın 9'a tam bölünmesi için $a=0,9$ olabilir. Bu durumda $0.9=0$ bulunur.

ÖRNEK(3)

4a25b sayısı 15 ile bölünebilen çift bir sayıdır. Buna göre a'nın alabileceği değerler toplamı nedir?

ÇÖZÜM :

15 sayısı aralarında asal çarpanlarına ayrılırsa $15=3.5$ olur. o zaman sayı hem 3'e hem da 5'e tam bölünmeli

sayı çift olduğundan $b=0,2,4,6,8$ olabilir. Ancak sayının 5'e tam bölünmesi için $b=0$ olmak zorunda

4a250

şimdi 3'ün kuralı uygulanacak olursa rakamları toplamı $4+a+2+5+0=11+a$ buradan $a=1,4,7$ olur.

Bu değerleri toplarsak $1+4+7=12$ olur.

ÖRNEK(4)

$222^2 + 333^2 + 555^2$ sayısı aşağıdakilerden hangisi ile tam bölünür?

A) 4 B) 5 C) 12 D) 17 E) 37

ÇÖZÜM :

$$\begin{aligned} 222^2 + 333^2 + 555^2 &= 111^2 \cdot 2^2 + 111^2 \cdot 3^2 + 111^2 \cdot 5^2 \\ &= 111^2 (2^2 + 3^2 + 5^2) \\ &= 111^2 (4 + 9 + 25) \\ &= 111^2 \cdot 38 \\ &= 3^2 \cdot 37^2 \cdot 2 \cdot 19 \end{aligned}$$

cevap E şıkkı olur.

ÖRNEK(5)

Birler basamağı 2 olan ve 9 ile tam bölünebilen abc sayılarının kaç tane $c < b < a$ koşulunu sağlar?

ÇÖZÜM :

Birler basamağı $c=2$ ise

$$2 < b < a$$

9 ile bölünebilmesi için rakamlar toplamı 9'un katı olmalı. Buradan

$$\begin{array}{c} 2 < b < a \\ \downarrow \downarrow \\ 3 \ 4 \\ 7 \ 9 \end{array}$$

o halde 234 ve 279 olmak üzere iki sayı vardır.

ÖRNEK(6)

$5a2a$ sayısı 11 ile tam bölünüyorsa 3 ile bölümünden kalan nedir?

ÇÖZÜM :

Önce a bulunmalı. 11'in kuralı uygulanırsa

$$\begin{array}{r} 5 \ a \ 2 \ a \\ - \ + \ - \ + \end{array}$$

$$-5 + a - 2 + a = 11 \text{ kat}$$

$$-7 + 2a = 11 \text{ kat}$$

$$\text{kat}=1 \text{ için } 2a=18 \rightarrow a=9 \text{ bulunur.}$$

sayımız 5929 olur. Sayının rakamları toplamı $5+9+2+9=25$ tir. 25'in 3'e bölümünden kalan ise 1 olur.

ÖRNEK(7)

$14a7b$ beş basamaklı sayısı 5 ile bölündüğünde 3 kalanını veriyor. Bu sayı 6 ile tam bölünüyorsa a'nın alabileceği değerler toplamı nedir?

ÇÖZÜM :

5 ile bölümünden kalan 3 ise $b=3$ veya 8 olur

sayı 6 ile bölündüğüne göre çift olmalı o halde $b=3$ olamaz. Geriye 3'ün kuralı kaldı. O halde

$$\begin{array}{c} 14a78 \\ \downarrow \end{array}$$

1,4,7 değerleri seçilir.

$$1+4+7=12 \text{ bulunur.}$$

ÖRNEK(8)

2ab4 tane ceviz 12 öğrenciye eşit olarak paylaştırılacak her birine en çok kaç ceviz düşer?

ÇÖZÜM :

12 sayısı aralarında asal olan 3 ve 4 sayılarının çarpımından oluşur. O halde sayımız 3 ve 4'e tam bölünmeli

4 için son iki rakama bakılır. Bu durumda $b=0,2,4,6,8$ olabilir.

Daha çok ceviz için a'nın öncelikle büyük olması sağlanmalıdır. Bu yüzden $a=9$ öncelikle düşünülmeli 29b4 sayısında uygun b bulunmaya çalışılır. 3'ün kuralı için rakamları toplarsak $2+9+b+4=b+15$ bu sayının 3'e tam bölünmesi için $b=0,3,6,9$ seçilebilir. Bunlardan sadece $b=6$ uygun olduğundan sayımız 2964 bulunur.

$$2964:12= 247 \text{ bulunur.}$$

ÖRNEK(9)

11 ile bölündüğünde daima 2 kalanını veren iki basamaklı sayıların toplamı kaçtır?

ÇÖZÜM :

Sayımızın formatı $k \in \mathbb{Z}$ olmak üzere $11k+2$ dir. k'ya değerler vererek iki basamaklı sayılar bulunur.

$$K=1 \text{ için } 13$$

$$K=2 \text{ için } 24$$

....

$$K=8 \text{ için } 90$$

Sayılar toplanırsa $13+24+...+90= 412$ bulunur.

ÖRNEK(10)

Üç ile bölünebilen ve farklı rakamlardan oluşan 5ab sayısının 5 ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre a'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı nedir?

ÇÖZÜM :

sayısının 5 ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre $b=4,9$ olabilir. Sayı 3'e de tam bölündüğünden

$$\begin{array}{cc} 5a4 & 5a9 \\ \downarrow & \downarrow \\ 0,3,6,9 & 1,4,7 \end{array}$$

$a=0,1,3,4,6,7,9$ rakamları toplanırsa $0+1+3+4+6+7+9=30$ bulunur.

ÖRNEK(11)

81a5b sayısı 6 ile bölünebilen rakamları farklı bir sayıdır. $b>3$ olduğuna göre kaç farkı a değeri vardır?

ÇÖZÜM :

Sayı 6 ile bölünüyorsa çift olmalıdır. ($6 = 2.3$)

$b=0,2,4,6,8$ olur. Burada b sayısı 0,2 ve 8 olmaz(şartlar gereği). O halde b sayısı 4 ve 6 olur. Şimdi sıra 3'ün kuralına geldi

$$\begin{array}{cc} 81a54 & 81a56 \\ \downarrow & \downarrow \\ 0,3,6,9 & 4,7 \end{array}$$

o halde a, 6 farklı değer alır.

ÖRNEK(12)

a35c sayısının 17 ile bölümünden kalan 7 ise a53c sayısının 17 ile bölümünden kalan kaçtır?

ÇÖZÜM :

$k \in \mathbb{Z}$ olmak üzere

$$a35c = 17k + 7 \text{ olsun}$$

a53c sayısı a35c sayısından 180 sayı fazla olduğundan

$$a53c - a35c = 180$$

$$a53c = a35c + 180$$

$$a53c = 17k + 7 + 180$$

$$a53c = 17k + 187 \text{ olur.}$$

17k zaten 17'nin katıdır. Geriye 187 nin 17 ile bölümünden kalanı bulmak kalıyor.

$$\begin{array}{r|l} 187 & 17 \\ - 187 & 11 \\ \hline 0 & \end{array}$$

o halde kalan 0 olur.

ÖRNEK(13)

35ab sayısı 3 ile tam bölünüyorsa a+b 'nin alabileceği kaç farklı değer vardır?

ÇÖZÜM :

3 ile bölünme kuralı rakamlar toplamı olduğundan;
 $3+5+a+b=3k$ olmalıdır. ($k \in \mathbb{Z}$)

$$a+b=3k - 8$$

burada k'ya değerler verilirse

$$k=3 \text{ için } a+b=1$$

$$k=4 \text{ için } a+b=4$$

$$k=5 \text{ için } a+b=7$$

$$k=6 \text{ için } a+b=10$$

$$k=7 \text{ için } a+b=13$$

$$k=8 \text{ için } a+b=16$$

o halde 6 farklı değer vardır denir.

KURAL: A sayısının x'e bölümünden kalan a, B sayısının x'e bölümünden kalan b olsun

A+B 'nin x'e bölümünden kalan a+b

A-B 'nin x'e bölümünden kalan a-b

A.B 'nin x'e bölümünden kalan a.b

k.A 'nin x'e bölümünden kalan k.a ($k \in \mathbb{Z}$) dir.

ÖRNEK(14)

a sayısının 9'a bölümünden kalan 7, b sayısının 9'a bölümünden kalan 5 ise a+b 'nin 9'a bölümünden kalan ile a.b 'nin 9'a bölümünden kalan toplamı nedir?

ÇÖZÜM :

Kuralı kullanacak olursak;

a yerine 7 ve b yerine 5 kullanırız

a+b'den kalan $7+5=12 \rightarrow 12$ 'nin 9'a bölümünden kalan 3

a.b'den kalan $7.5=35 \rightarrow 35$ 'in 9'a bölümünden kalan 8

$$3+8=11 \text{ olur.}$$

ÖRNEK(15)

Üç basamaklı rakamları farklı en büyük ve en küçük sayma sayılarının çarpımının 9'A bölümünden kalan nedir?

ÇÖZÜM :

Üç basamaklı rakamları farklı en büyük sayı : 987
 Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı : 102
 bu sayıların çarpımının 9'a bölümünden kalan yerine ayrı ayrı kalanların çarpımının 9'a bölümünden kalanı bulmak daha kolaydır.

$$987 \text{'nin } 9 \text{'a bölümünden kalan } 6$$

$$102 \text{'nin } 9 \text{'a bölümünden kalan } 3$$

$$987.102 \text{'nin } 9 \text{'a bölümünden kalan } 6.3=18$$

18 9'dan büyük olduğundan tekrar 9'a bölmek gerekir.

18 sayısı 9'un katıdır. O halde tam bölünür ve kalan 0(sıfır) olur.

ÖRNEK(16)

Rakamları farklı 4 basamaklı 87ab sayısı 3 ile tam bölünüyorsa a+b en fazla kaç olabilir?

ÇÖZÜM :

Sayı 3 ile tam bölünüyorsa $8+7+a+b = 3k$ olmalıdır. ($k \in \mathbb{Z}$)

$$a+b = 3k-15$$

burada $k=11$ seçilirse $a+b=18$ olur . $a=b=9$ olmalı ki toplam 18 olsun.

Buda rakamları farklı kuralına aykırı

$k=10$ seçersek $a+b=15$ olur. Burada $a=9$ ve $b=6$ seçilebilir ki bu da kurallara uygundur.

O halde cevap 15 tir.

ÖRNEK(17)

a,b,c,d sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere $\frac{a.c}{b.d}$ en küçük değerini almasını sağlayan abcd dört basamaklı sayısının 9'a bölümünden kalan nedir?

ÇÖZÜM :

$\frac{a.c}{b.d}$ en küçük değerini almasını sağlamak için a

ve c ye küçük, b ve d ye büyük değer vermeliyiz.

$a=1$, $c=2$ ve $b=9$, $d=8$ seçelim

Sayımız 1928 olur. Rakamları toplamı $1+9+2+8=20$ dir ve 20'nin 9' bölümünden kalan 2 olur.

ÖRNEK(18)

$9!-8!$ sayısı aşağıdakilerden hangisi ile bölünmez?

A) 2 B) 3 C) 6 D) 9 E) 11

ÇÖZÜM :

$8!$ ortak parantezine alırsak

$8!(9-1)=8!.8$ bulunur. Bu çarpımın içinde 11 olmadığından sayımız 11 ile bölünmez cevap E şıkkıdır.

ÖRNEK(19)

$3a4b$ sayısı 36 ile tam bölüyorsa kaç farklı a değeri vardır?

ÇÖZÜM :

36 sayısını aralarında asal olmak üzere 4 ve 9 'un çarpımı şeklinde ayırırsak , $3a4b$ 'nin 4 ve 9'a ayrı ayrı bölünmesini sağlarız.

4'ün kuralı son iki basamağın 4'e tam bölünmesidir. Buradan $4b \rightarrow 40,44,48$ olur.

9'un kuralı rakamların toplamının 9'a bölünmesi idi. Buradan

3a40	3a44	3a48
↓	↓	↓
2	7	3

o halde 3 farklı değer vardır.

ÖRNEK(20)

X < 538 şartını sağlayan sayma sayılarından kaç

- a) 3 ve 5 'e tam bölünür?
- b) 3 veya 5 'e tam bölünür?
- c) 3'e bölünür fakar 5'e bölünmez?

ÇÖZÜM :

a) 3 ve 5'e tam bölünen 15'e tam bölünmelidir.

$$X = \{15, 30, \dots, 525\} \text{ terim sayısı } \frac{525 - 15}{15} + 1 = 35$$

b) 3 ile bölünen $\{3, 6, \dots, 537\}$ terim sayısı

$$\frac{537 - 3}{3} + 1 = 179$$

5 ile bölünen $\{5, 10, \dots, 535\}$ terim sayısı

$$\frac{535 - 5}{5} + 1 = 107$$

3 ve 5'ile bölünen sayıların içinde 15 ile bölünenler ortak olduğundan bunları bir kere çıkarmalıyız

$$179 + 107 - 35 = 251 \text{ bulunur.}$$

c) 3 ile bölünenler 179 tane idi. Bunların içinden 5'e bölünenler aynı zamanda 15'in katı olanlar olduğundan 15'in katı sayıları çıkarmalıyız.

$$\text{Buradan: } 179 - 35 = 144 \text{ olur.}$$

ÖRNEK(21)

ab iki basamaklı sayısının 7 ile bölümünden kalan 5 tir. Buna göre ab62 sayısının 7 ile bölümünden kalan nedir?

ÇÖZÜM :

$k \in \mathbb{Z}$ olsun

$ab = 7k + 5$ yazılabilir. Ab62 sayısını ab cinsinden ifade edelim

$$\begin{aligned} ab62 &= ab00 + 62 \\ &= 100.ab + 62 \\ &= 100.(7k + 5) + 62 \\ &= 700k + 562 \end{aligned}$$

700k zaten 7'nin katıdır. Geriye 562 kalıyor

$$\begin{array}{r|l} 562 & 7 \\ - 56 & 80 \\ \hline 02 & \end{array}$$

kalan 2 olur.

ÖRNEK(22)

Bir a sayısının 11 ile bölümünden kalan 9 ise $a^2 + 5$ 'in 11 ile bölümünden kalan kaçtır?

ÇÖZÜM :

A yerine 9 yazarsak

$$\begin{aligned} a^2 + 5 &= 9^2 + 5 \\ &= 86 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r|l} 86 & 11 \\ - 77 & 7 \\ \hline 9 & \end{array}$$

o halde kalan 9 olur.

ÖRNEK(23)

$5 < a \leq b$ şartı ile aab sayısı 12 ile kalansız bölünüyorsa kaç farklı b değeri vardır?

ÇÖZÜM :

A'nın 6,7 ve 9 değerleri için b bulunamaz
A=8 ve b= 8 olursa sayımız 888 olur. Bu sayı 12'ye tam bölünür.
O halde tek bir b vardır. O da 8 dir.

ÖRNEK(24)

7 tane 23 sayısının yanyana yazılmasıyla elde edilen 14 basamaklı sayının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

ÇÖZÜM :

23232323232323 sayısında 7 tane 2 ve 7 tane 3 vardır. Rakamları toplarsak $7.(2+3)=35$ ve 35'in 9 ile bölümünden kalan 8 dir..

ÖRNEK(25)

Rakamları farklı 3a52b sayısının 5 ile bölümünden kalan 4 tür. Bu sayı 9'a Tam bölünüyorsa a kaçtır?

ÇÖZÜM :

5 ile bölümünden kalan 4 ise b = 4 ve 9 olur.

9 ile bölünme kuralı uygulanırsa

$$\begin{array}{r} 3a524 \\ \downarrow \\ 4 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3a529 \\ \downarrow \\ 8 \end{array}$$

rakamlar farklı dendiğinden a=4 seçilemez o halde cevap 8 dir.

ÖRNEK(26)

a4bc sayısı 45 ile tam bölünüyorsa en büyük a+b kaçtır?

ÇÖZÜM :

45 sayısını aralarında asal sayıları ayırırsak
 $45 = 5.9$ olur. Demek ki 5 ve 9'un kuralları uygulanacak.

5 ile tam bölünebilmesi için c rakamı 0 veya 5 olur
9 ile bölünebilme kuralından
c= 0 için a4b0 $\rightarrow a+b= 5,14$ olur
c=5 için a4b5 $\rightarrow a+b=9,18$ olur.

O halde en büyük 18 olur.

ÖRNEK(27)

A=ab3c4 ve B= ab7c2 sayıları veriliyor. B-A farkının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

ÇÖZÜM :

$$\begin{array}{r} ab7c2 \\ - ab3c4 \\ \hline \end{array}$$

a,b,c aynı hizada olduğundan 0 seçilirse işlem daha kolay olur.

$$\begin{array}{r} 702 \\ - 304 \\ \hline 398 \end{array}$$

$3+9+8=20$ sayısının 9 ile bölümünden kalan 2 olur.

ÖRNEK(28)

Rakamları birbirinden farklı beş basamaklı 28A9B sayısının 9 ile bölümünden kalan 7, aynı sayının 5 ile bölümünden kalan 1 ise $A \neq 0$ olmak üzere $A-B$ kaçtır?

(ÖSS-2001)

ÇÖZÜM :

5 ile bölümünden kalan 1 ise B rakamı 1 veya 6 olabilir.

$$\begin{array}{cc} 28A91 & 28A96 \\ \downarrow & \downarrow \\ 5 & \cancel{0,9} \text{ (kurallara aykırı)} \end{array}$$

o halde $A-B = 5-1 = 4$ bulunur.

ÖRNEK(29)

365 günlük bir yıldaki C.tesi ve Pazar günleri sayısının toplamı en çok kaçtır?

(ÖSS-2001)

ÇÖZÜM :

365 günde 52 hafta ve artık bir gün vardır. O artık günün c.tesi olduğunu kabul edersek $52 \cdot 2 = 104$, $104 + 1 = 105$ elde edilir.

ÖRNEK(30)

Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı 3KM sayısının 3 ve 5 ile kalansız bölünebiliyor. Buna göre K kaç farklı değer alabilir?

(ÖSS-2000)

ÇÖZÜM :

5 ile kalansız bölünüyorsa m rakamı 0 veya 5 olabilir.

Sayının 3 ile tam bölünmesi için rakamları toplamı 3'ün katı olmalıydı..

$$\begin{array}{cc} 3K0 & 3K5 \\ \downarrow & \downarrow \\ \cancel{0,3,6,9} & 1,4,7 \end{array}$$

o halde $K = 1,4,6,7,9$ yani 5 farklı değer alır.

**KONUMUZ BİTTİ. ŞİMDİ TESTLERE
GEÇEBİLİRSİNİZ**

**DİLERSENİZ KONU ANLATIMINI BİR DE
YOUTUBE KANALIMIZDAN VIDEO OLARAK
DA İZLEYEBİLİRSİNİZ**

Youtube kanalımız: **CEBİR HOCAM**

Başarılar diliyorum
İbrahim Halil BABAOĞLU
Matematik Öğretmeni

