

M2 weak-form STLSQ
M2b strong-form STLSQ
M3 ensemble, weak
M3 ensemble, strong
M4 best subset, weak
M4 best subset, strong
M5 EIV best subset (oracle)
M7 PySR
M9 slow manifold (own target)
a
Langmuir, Pe ≈ 94
σ = 2 %, ε = 2 %
P(success)
(fraction of estimation replicates)
log10 Da (Da = k t_stoich, dimensionless)
b
MOF-303-like step, Pe ≈ 94
σ = 2 %, ε = 2 %
P(success)
(fraction of estimation replicates)
log10 Da (Da = k t_stoich, dimensionless)
c
Langmuir
MOF-303-like step
median
log10 Da*disc per slice (dimensionless)
88
96
89
96
60
96
6
M2
M2b
M3 w
M3 s
M4 w
M4 s
M7
method (grey numbers: O1 slices without a crossing)
d
Langmuir
MOF-303-like step
Pe ≈ 470
Pe ≈ 94
Pe ≈ 19
median over slices
18 slice(s) without a shift
EIV shift, Δlog10 Da*disc
(M5 minus best non-EIV, decade)
H2c: no verdict
none of the 18 slices has a discovery
boundary for both M5 and its comparator
factor 2
MDE 0.25
0.5 %
2 %
5 %
isotherm error ε (% of q*), σ = 2 %