

Pe ≈ 470
Pe ≈ 94
Pe ≈ 19
σ 0 %
ε 0 %
σ 0 %
ε 0.5 %
σ 0 %
ε 2 %
σ 0 %
ε 5 %
σ 0.5 %
ε 0 %
σ 0.5 %
ε 0.5 %
σ 0.5 %
ε 2 %
σ 0.5 %
ε 5 %
σ 2 %
ε 0 %
σ 2 %
ε 0.5 %
σ 2 %
ε 2 %
σ 2 %
ε 5 %
σ 5 %
ε 0 %
σ 5 %
ε 0.5 %
σ 5 %
ε 2 %
σ 5 %
ε 5 %
-1.9
-2.1
-2.0
-1.8
-1.7
-1.8
-3.1
-3.4
-1.7
-1.8
-1.6
-2.0
-2.2
-1.9
-2.8
-2.5
-2.4
-2.3
-2.5
-2.4
-2.2
-2.5
-2.4
noise σ, isotherm error ε (rows); P (fraction of estimation replicates, 0 to 1)
log10 Da (Da = k tstoich, dimensionless)
discovery, best method
k identifiable
P = 0.5
discovery fails before identifiability
discovery fails with identifiability
discovery outlives identifiability
no verdict (no boundary for one of the two)